

Neue Pflanzenstandorte aus Baden.

VON HERMANN SLEUMER, Berlin-Dahlem.

In der so überaus reichen Pflanzenwelt der südlichen Rheinebene und des Schwarzwaldes sind trotz der eifrigen floristischen Durchforschung während des letzten Jahrhunderts noch manche Pflanze und mancher pflanzengeographisch wichtige Standort unbemerkt geblieben und neue Arten eingewandert. Die nachstehende Liste gibt einen Ueberblick über die Bereicherung unserer Kenntnis der Pflanzenwelt Badens seit 1929. Beiträge zu dieser Veröffentlichung verdanke ich Herrn Prof. F. HUBER-Bühl, Herrn Prof. Dr. R. LAUTERBORN - Freiburg, Herrn Dr. C. MAYER - Freiburg, Herrn EBERHARD SCHMIDT - Freiburg und Herrn Lehrer E. VEIT - Immeneich (Albtal). Standorte ohne Angabe des Finders gehen auf meine eigenen Beobachtungen zurück.

- Lycopodium complanatum* L. var. *chamaecyparissus* A. Br. Standsteinhügel südöstlich Rittersbach (Huber).
Asplenium ceterach L. Hardtkopf bei Hub (Huber).
Pinus silvestris L. var. *pseudo-uncinata* Issler. Isteiner Klotz, Schloßberg bei Freiburg.
Eriophorum alpinum L. „Ibacher“ und „Horbacher“ Moor, „Brühl“ bei Immeneich (Veit).
Eragrostis minor Host. Seit 1931 am Bahnhof Bühl in Menge (Huber).
Cynosurus echinatus L. Bei Sandweier adventiv (Huber).
Rhynchospora alba Vahl. Horbach (Veit).
Carex distans L. „Faule Waag“ bei Achkarren.
Carex Pairei F. Schultz. Oberhalb St. Valentin am Kybfelsen, Eichenwald, 600 m (C. Mayer).
Gagea pratensis Schult. Auf Aeckern in der Nähe der Spankorfabrik in Bühl (Huber).
Allium schoenoprasum L. var. *sibiricum* Garcke. Im Schluchseemoor bei der alten Spirke; Standort vernichtet.
Allium rotundum L. St. Georgen-Schönberg.
Muscari comosum Mill. Zwischen Rittersbach und Ottersweier (Huber); Bühl (Huber); Dreisamdamm bei Ebnet.
Muscari botryoides Mill. Bei Unterkutterau im oberen Albtal (Veit).
Narcissus poeticus L. ssp. *angustifolius* Curt. Hinterzartener Moor, vielleicht verwildert.
Ophrys aranifera Hudson ssp. *litigiosa* G. Camus. Schönberg bei Freiburg gegen Ebringen hin (bisher einziger Standort in Deutschland).
Orchis pallens L. Immeneich (Veit).
Platanthera montana R. fil. „Gießen“ bei Immeneich, „Dachsberg“ bei Wolpadingen (Veit).
Epigonaphyllus Sw. Zastlertal (Schmidt). Der von Neuberger erwähnte Fund im Zastlertal wird dadurch bestätigt.
Quercus pubescens Willd. Fohrenberg bei Sulzburg.

- Asarum europaeum* L. Auf dem „Gupfen“ bei Baumholz (Veit).
- Silene rupestris* L. Durchs ganze Albtal verbreitet (Veit).
- Stellaria glauca*. With. Gräben bei Hattenweier und Oberweier (Huber).
- Trollius europaeus* L. Steigt im Albtal bis Niedermühle (550 m) herab (Veit).
- Ranunculus Lingua* L. Gräben zwischen Breithurst und Oberweier (Huber).
- Fumaria Vaillantii* Loisl. Bühl (Huber).
- Coronopus didymus* Sm. Bühl (Huber).
- Lepidium virginicum* L. Bahnhof Bühl (Huber).
- Teesdalea nudicaulis* R. Br. Sandige Aecker zwischen Oberweier und Breithurst (Huber).
- Thlaspi alpestre* L. ssp. *silvestre* (Jord.) Gillet et Magne. Posthalde (Schmidt); Albtal (Veit).
- Lunaria rediviva* L. Zerstreut im ganzen Albtal (Veit).
- Erophila maiuscula* (Jord.) Wibiral. Aecker bei Vörstetten.
- Erophila oblongata* (Jord.) Wibiral. Aecker bei Vörstetten.
- Drosera intermedia* Hayne. Horbacher Moor (Veit).
- Sempervivum tectorum* L. Im Albtal ziemlich verbreitet: Niedermühle, Immeneich, Kutterau, Ibach (Veit).
- Saxifraga decipiens* Erh. Ibach, verwildert (Veit).
- Saxifraga aizoon* Jacq. Bei Ibach verwildert (Veit).
- Rubus bifrons* Vest. Schloßberg bei Freiburg.
- Rubus hebecaulis* Sudre ssp. *nanulus* Sudre var. *vogesinus* Sudre. „Burghaldenring“ am Schloßberg bei Freiburg.
- Rubus hirtus* W. et Kit. ssp. *posoniensis* Sabr. Ebenda.
- Rubus purpuratus* Sudre ssp. *brumalis* Sudre. Ebenda.
- Rubus tomentosus* Borkh. Ebenda.
- Rubus vestitus* Weihe et Nees. Ebenda.
- Rubus rivularis* M. et W. Im Hochschwarzwald ziemlich häufig.
- Rubus rivularis* M. et W. ssp. *spinosulus* Sudre var. *rivulariformis* Sudre. Oberes Immental bei Freiburg.
- Potentilla verna* L. var. *longifolia* Th. Wolf. Schönberg bei Ebringen.
- Rosa alpina* L. var. *adjecta* Déségl. und var. *setosa* R. Keller. Feldberg, 1250 m, Zastler Loch.
- Rosa micrantha* Sm. var. *operta* (Puget) Borbás. Rheinauen bei Rothaus unweit Breisach.
- Rosa tomentosa* Sm. var. *cuspidata* God. Ebenda.
- Medicago minima* Bart. Ebenda.
- Lathyrus aphaca* L. Heimbach (an der Verwerfung), Isteiner Klotz.
- Oxalis stricta* L. Breitet sich im Albtal aus (Veit).
- Polygala depressum* Wend. ssp. *collinum* Coss. et Germ. Zastler Loch, 1000 m, im Nardetum.
- Polygala comosum* Schkuhr ssp. *strictum* Dalla Torre et Sarnth. var. *Morisianum* Beck. Innetal bei Ebringen.

- Jlex aquifolium* L. Geht im Albtal bis 650 m hoch hinauf (Veit).
- Viola tricolor* L. ssp. *subalpina* Gaud. Mittelhaslach; in der var. *polychroma* Kerner: Hinterzarten, „Kostgefäll“ am Rohrhardsberg.
- Viola alba* Besser ssp. *virescens* (Jord.) Greml. Schönberg bei Freiburg, „Schwärze“ bei Müllheim; ssp. *scotophylla* (Jord.) Greml. f. *albiflora* Wiesbaur, Grißheim (Lauterborn): Istein.
- Viola hirta* L. f. *rosea* Becker. Ebringen.
- Viola Riviniana* Rchb. var. *nemorosa* Neum. „Kostgefäll“ am Rohrhardsberg.
- Viola permixta* Jord. (*V. odorata* × *V. hirta*). Grißheim (Lauterborn); Kienberg bei Ebringen, Gipfel des Schönbergs bei Freiburg (hier auch *V. hirta*, *V. odorata*), Steinberg bei Oberweiler (hier auch *V. hirta*, *V. odorata*).
- Viola pluricaulis* Borbás (*V. alba* ssp. *virescens* × *V. odorata*). Steinberg bei Oberweiler gegen die „Schwärze“ hin.
- Viola montfortensis* Murr et Poell, forma (*V. alba* × *V. odorata* × *V. hirta*, hier jedenfalls aus *V. permixta* × *V. alba* ssp. *scotophylla* entstanden). Ueber Istein.
- Viola adulterina* Godr. (*V. alba* × *V. hirta*). Steinberg bei Oberweiler.
- Viola intermedia* Rchb. (*V. silvatica* × *V. Riviniana*). Auf dem Schönberg bei Freiburg mehrfach, Steinberg bei Oberweiler, Istein.
- Pirola uniflora* L. Im Albtal zerstreut (Veit); Wehrhalden.
- Trientalis europaea* L. Geht vom Ibacher Moor her fast bis Fröhnd (Veit).
- Gentiana verna* L. Bei Fröhnd in Menge (Veit).
- Gentiana campestris* L. Tiefenhäusern im Albtal (Veit); vor dem Windeck bei Hinterzarten.
- Polemonium caeruleum* L. Bei Hinterzarten verwildert.
- Marrubium vulgare* L. Immeneich (Veit).
- Salvia pratensis* L. Im Albtal selten (Veit).
- Hyssopus officinalis* L. In Immeneich verwildert (Veit).
- Thymus caespitosus* Opiz var. *eu-caespitosus* Ronniger. Rheinebene vor Istein, gegenüber dem elsässischen Vorkommen.
- Mimulus luteus* L. Albtal (Veit).
- Galium verum* ssp. *praecox* (Lang) Petrak. „Faule Waag“ bei Achkarren.
- Phyteuma tenerum* F. Schultz ssp. *anglicum* F. Schultz. „Faule Waag“ bei Achkarren.
- Pyrethrum uliginosum* Waldst. et Kit. Adventiv am Rheindamm bei Sasbach.
- Scorzonera humilis* L. Waldwiesen bei Tiefenhäusern (Veit).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1934-1938

Band/Volume: [NF_3](#)

Autor(en)/Author(s): Sleumer Hermann Otto

Artikel/Article: [Neue Pflanzenstandorte aus Baden. \(1935\) 181-183](#)