Corrigiola littoralis L.

In grosser Uebereinstimmung geben die verschiedenen Floren als Standort der Corrigiola „kiesige Flussufer“ an, und man findet die Pflanze in der That auch häufig an solchen. — Auffallen muss es nun aber, dass fast noch reichlicher und üppiger vegetirend die Pflanze auch auf granitgrusigen Feldern und auf kiesigen Waideplätzen des Gebirges sich findet, von wo die Bäche und Flüsse herabkommen. So beobachte ich seit Jahren die schöne Corrigiola in Höhen von 300—600 m auf Feldern und Waiden [Blechereck, Solberg, (Ottenhöfen) Schwend (Waldulm)] in mächtigen, weitspinnenden Rasen in Gesellschaft von Arnoseris minima Lk., Teesdalea nudicaulis R. Br., Ornithopus perpusillus L. und Hypericum humi fusum L. Und von diesen Höhenzuflüssen speist sich die „Acher“, an deren Ufern bei Ottenhöfen und Oberachern der „Hirschsprung“ ebenfalls gefunden wird. Sollte man nun nicht annehmen dürfen, die, in ihrem ganzen Habitus und mit ihrem deutschen Namen an eine Bergpflanze erinnernde Corrigiola sei in der That eine Bergbewohnerin und lasse sich nur gerne ab und zu einmal von munteren Bergbächen neugierig in die Ebene herabrudern, ähnlich wie dies ja auch ihre Kameraden Teesdalea, Ornithopus etc. thun? Ein umgekehrter Vorgang wenigstens ist schwerer anzunehmen. —

Dr. Winter, Achern

Nachtrag pro 1894

zur „Flora von Achern“ von Dr. Winter.

Valeriana tripteris L. (Allerheiligen, an Felsen),
Mimulus luteus L. (Renchen, am „Plaugelbache“),
Asperugo procumbens L. (Sasb.'-Ried, beim Schulhause),
Serratula tinctoria L. (Memprechtshofen (Leibinger)),
Scheuchzeria palustris L. Am Schurmsee (Leibinger)),
Phalaris canariensis L. (Achern, Wiesenschutt),
Festuca silvatica Vill. (Hornisgrindegebiet in Waldungen),
Chenopodium Vulvaria L. (Achern, Bahnkörper),
Hieracium tridentatum Fr. (Sasb.'-Walden),
— Schmidtii Tausch. (Sasb.'-Walden),
Erigeron acer L. (Sasbach, Mösbach, Lössrain),
Campanula glomerata L. (Oensbach, Lössraine),
Geranium pratense L. (Renchen, Bahnhofwiesen). —

Die folgenden Pflanzen sind jedenfalls durch fremdes Heu im letzten Sommer eingeschleppt worden:

Arabis arenosa Scop. (Achern, Bahnhof),
Trifol. resupinatum L. (Achern, Bahnhof), (Heimat: Istrien),
Salvia verticillata L. (Renchen, Bahnhof),
Nigella arvensis L. (Renchen, Bahnhof). —

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Badischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 1895

Autor(en)/Author(s): Winter

Artikel/Article: Corrigiola littoralis L. 273