

123. ab. *Marschneri* Bryk. Unterer Kubitalfleck und Hinterrandfleck useits weiß gekernt.
124. ab. *Pagenstecheri* Bryk. Zellquerader Hfgl useits zwischen M 1 und M 2 schwarz beschuppt.
125. ab. *sublacrimans* Bryk 1913 (*nexilis-b* Schultz 1905). Die schwarze Umrandung der Subkostalocellen fließt stetigartig in den Wurzelfleck. (Vergl. wegen Nomenklatur Bemerkungen bei ab. *cardinalis* Bryk.)
126. *lacrimans* Marschner 1911 (*lacrimaeformis* [n. c.] Bang-Haas 1915). Das Rot der Subkostalocelle ergießt sich tränenförmig in Basalfleck (Type: Bötzingen Berg bei Biel).
127. ab. *exelsior* Stichel 1899 (*exelsior* [n. c.] Bang-Haas 1915). Basalschwärzung in Feld oberhalb Diskus deutlich rot gekernt.
128. ab. *Felkeli* Stauder. Die schwarzen Schuppen der oseitigen Basalzeichnung auf Hfgl bis über Mitte der Analgegend mit feinen rötlichen Schuppen unregelmäßig bestreut.
130. ab. *esendei* Bryk (nach Stauder). Intensive basale (Stauder sagt wohl irrtümlich „anale“). Schwarzzeichnung setzt sich um den ganzen Diskus herum bis zur Wurzel.
131. ab. *basireducta* ab. n. Die Basalzeichnung ist oseite derart reduziert, daß sie g e n a u mit den useitigen roten Wurzelflecken übereinstimmt. Die weiße Grundfarbe und die Schwarzzeichnung sind sehr scharf abgegrenzt. Type ein ♂ var. *marcianus*, Schwarzwald.
132. ab. *leukophorus* Bryk. Die vier roten Basalflecken sind weiß gekernt.
133. ab. *nordmanniides* Bryk. Basalflecke fehlen useits.

## Die Dipteren des Oberrheins.

Beitrag zu einem Verzeichnis von Professor Dr. Weigand†, Freiburg i. Br.

(Fortsetzung.)

### Gr. IV. Brachycera platygnya

#### Siratiomyidae

##### Pachygastrinae

##### Pachygaster Mg.

- atra* Pz. Str. An Klette, Distel schwärmend — VI.
- Leachii* Curt. Str. Fr. An Klette — VI.
- meromelas* Duf. Fr. Aus Buchenmuhl gezüchtet Schr. — VI.
- minutissima* Z. Koe. Unter Tannenrinde.

##### Clitellariinae

##### Ephippomyia\* Bezzi

- ephippium* Frb. Str. V. An Ameisenestern — VI.

##### Nemotelus Geoffr.

- nigrinus* Fl. Str. R. Fr. R. W. Auf Wasserpflanzen — VI.
- pantherinus* L. Str. R. Fr. R. W. — V. VI.

##### Oxycera Mg.

- pardalina* Mg. Str. Fr. — VI.
- pulchella* Mg. Fr. L. Ltb. — VI.
- pygmaea* Fbr. Str. — VI.
- trilineata* Fbr. Badenweiler J.

### Stratiomyinae

#### Stratiomyia Geoffr.

- chamaeleon* L. Str. Vendenheim. Baar. Schr. — VII.
- furcata* Fbr. Str. R. Kr. J. — VI. IX.
- potamida* Mg. Str. R. — VII. VIII.
- riparia* Mg. L. Ltb.

#### Odontomyia Mg.

- angulata* Pz. Str. R. Fr. Re. — VI.
- argentata* Fbr. Str. R. Fliegt langsam in Bogen, ein Silberfunke, einem Gyrinus der Luft gleich — VI.
- felina* Pz. B. — VIII.
- hydroleon* L. Str. L. Ltb. — VI.
- tigrina* Fbr. Str. Kr. v. G. — VI.

#### Hoplodonta Rond.

- viridula* Fbr. Str. L. Ltb. — VI.

### Sarginae

#### Chrysochroma Will.

- bipunctatum* Scop. Fr. — X. Koe.

#### Sargus Fbr.

- cuparius* L. v. h. — VI bis X. Koe.
- flavipes* Mg. Koe.
- iridatus* Scop. Rippoldsau J. Koe.
- rufipes* Wahlb. Koe.

\* Die Art wurde inzwischen von mir auch in Baden, und zwar am 7. VI. 24. bei Hecklingen gefangen. Schröder.

Chrysomyia Dunc.

formosa Scop. v. h. — VI. VIII. Koe.

Microchrysa Lw.

flavicornis Mg. Koe.

polita L. v. h. — V. VII. VIII. Koe.

BeridinaeBeris Latr.

chalybeata Forst. v. h. — V.

fuscipes Mg. Str. Fr. — VI. VII.

Morrisii Dale h. Fr. Rippoldsau

J. — V. VIII.

vallata Forst. Str. — VI. VII.

Chlorisops Rond.

tribialis Mg. Str. V. Fr. In. — VII.

XylophagidaeXylophagus Mg.

cinctus Deg. Sw. J. Larve u. Kiefernrinde.

Xylomyia Rond.

varia Mg. Str. An Ausfluß von Rüster u. Roßkastanie — V. VI.

CoenomyidaeCoenomyia Latr.

ferruginea Scop. Str. V.

TabanidaePangoninaeChrysops Mg.

caecutiens L. v. h. — V bis VIII.

perspicillaris Lw. Str. Westeuropa — VII.

quadratus Mg. v. h. — VIII.

relictus Mg. h. — VII. VIII.

rufipes Mg. Grötzingen. v. G.

sepulcralis Fbr. Hi. M. — VII.

Pangonia Latr.

micans Mg. K. bisher einziger Fundort in Deutschland. h. — VII bis IX. Sonst Mittelmeerländer.

Silvius Mg.

vitulii Fbr. Lo. E. Sch. Istein. Z. Bodensee. Oldenberg. VII.

TabaninaeHexatoma Mg.

pellucens Fbr. h. Str. R. Fr. Kr.

v. G. — VII. VIII.

Haematopota Mg.

italica Mg. b. Str. K. Kr. — VI. bis VIII.

pluvialis L. v. h. — VI. bis IX.

Tabanus L.

ater Rossi Sulzfeld v. G.

aterrimus Mg. Sw. Rippoldsau J. — VI.

autumnalis L. Str. Fr. — VI.

borealis Lw. Fr. — V.

bovinus Lw. v. h. — VI. bis VIII.

bromius L. v. h. — VI. bis IX.

var. glaucescens Schin. Sw. J.

cordiger Mg. Sw. J. L. Ltb. Larve.

tulvus Mg. Sw. J. Re. Sm. — VI.

gigas Herbst Str. R. W. — V. VI.

glaucopis Mg. Str. Fr. Sw. — VIII.

lateralis Mg. Str. — VII.

luridus Fll. v. h. — VI.

maculicornis Z. h. — VI.

micans Mg. Vg. Sw. Doch auch

Re. u. Vs. Ltb. — VI.

plebejus Fu. Hi. — VII.

quatuornotatus Mg. V. Vs. — VI.

rusticus L. Str. R. Kniebis v. G.

— VIII.

solstitialis Schi. Str. Fr. — V.

spodopterus Mg. Str. Fr. — VI.

sudeticus Zll. Sw. Rippoldsau J.

Sulzfeld v. G. Hi.

Schr. VIII.

tergestinus Egg. Str.

tropicus Pz. v. h. — V. VI.

LeptidaeLeptidinaeAtherix Mg.

crassipes Mg. Str. — VI.

ibis Fbr. Str. Kr. v. G. Rau-

münzach v. G. Pfalz Ltb.

marginata Fbr. Str. Fr. D. Istein

v. G. — VII. VIII.

Leptis Fbr.

annulata Deg. Str.

conspicua Mg. Str. Fr. — VIII.

immaculata Mg. v. h. — VII. VIII.

lineola Fbr. v. h. D. — VI bis IX.

maculata Deg. Fr. Sw. — VII.

notata Mg. Str.

scolopacea L. v. h. — VI.

strigosa Mg. h. Str. Fr. — VI.

tringaria L. v. h. — VI bis VIII.

vitripennis Mg. v. h. — V. VI.

ChrysopilinaeChrysopilus Mcq.

auratus Fbr. v. h. — V bis VIII.

aureus Mg. h. — V bis VIII.

flaveolus Mg. Str.

Symphoromyia Fr.

crassicornis Pz. Vg. Fr. Geismäßle

Höllental — VI. VII.

obscura Fll. Fr. Sw. — VII.

AcroceridaeOncodes Latr.

gibbosus L. Str. V. R. W. Fr. Liehl.

Lo. Sch. — VII.

AsilidaeDasypogoninaeLeptogaster Mg.

cylindrica Deg. Str. Fr. — VI. VIII.

guttiventris Z. Str. Fr. — VII.

Dioctria Mg.

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <u>africapilla</u> Mg.  | Str. Lo. Sch. — V.                   |
| <u>bicincta</u> Mg.     | Fr. K. — VII.                        |
| <u>flavipes</u> Mg.     | Str. — VII.                          |
| <u>hyalipennis</u> Fbr. | Fr. K. — VII.                        |
| <u>lateralis</u> Mg.    | Str.                                 |
| <u>linearis</u> Fbr.    | Str.                                 |
| <u>longicornis</u> Mg.  | Str.                                 |
| <u>oelandica</u> L.     | Str. K. Sm. — V.                     |
| <u>Reinhardi</u> Wied.  | Str.                                 |
| <u>rufipes</u> Deg.     | Lo. Str. Fr. Sm. L.<br>Ltb. — V. VI. |

Dasypogon Mg.

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <u>teutonius</u> L. | Str. V. K. Sm. Istein.<br>L. Ltb. — VI. |
|---------------------|-----------------------------------------|

Leptarthrus Steph.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <u>brevirostris</u> Mg. | Str. Fr. Hi. — VI. |
|-------------------------|--------------------|

Holopogon Lw.

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <u>fumipennis</u> Mg.  | Fr. K. An Lösswänden — VII. VIII. |
| <u>nigripennis</u> Mg. | K. An Lösswänden — V. VII.        |
| <u>venustus</u> Rossi  | Fr. D. — VI.                      |

Lasipogon Lw.

|                     |      |
|---------------------|------|
| <u>cinctus</u> Fbr. | Str. |
|---------------------|------|

Cyrtopogon Lw.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <u>lateralis</u> Fll. | Fr. D. — VI. |
|-----------------------|--------------|

LaphriinaeLaphria Mg.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <u>dioctriaeformis</u> Mg. | Fr. D. Istein — VII.        |
| <u>fimbriata</u> Mg.       | Str.                        |
| <u>flava</u> L.            | h. Str. Fr. Sw. — VI. VIII. |
| <u>fuliginosa</u> Pz.      | E. Saarunion. Sch. — VIII.  |
| <u>fulva</u> Mg.           | Str.                        |
| <u>igneae</u> Mg.          | B.                          |
| <u>marginata</u> L.        | Str. Fr. K. D. — VII.       |
| <u>Andrenosoma</u> Rd.     |                             |
| <u>atrum</u> L.            | E. Sch. L. Ltb. — VII.      |

AsilinaePamponerus Lw.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <u>germanicus</u> L. | Str. K. Sm. Si. Ltb. Jn. |
|----------------------|--------------------------|

Asilus L.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <u>crabroniformis</u> L. | E. Sch. — X. |
|--------------------------|--------------|

Protophanes Lw.

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <u>punctipennis</u> Mg. | Str. |
|-------------------------|------|

Dysmachus Lw.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <u>forcipula</u> Zll. | Hi. Sm. — VI. |
|-----------------------|---------------|

Eutolmus Lw.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <u>rufibarbis</u> Mg. | Str. — VII. |
|-----------------------|-------------|

Machimus Lw.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <u>africapillus</u> Fll. | Str. Vg. Fr. — VIII. |
| <u>lacinulatus</u> Lw.   | Str. Fr. — VII.      |

Nevitamus O.-S.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <u>cothurnatus</u> Mg. | Str. L. Ltb. |
| <u>cyanurus</u> Lw.    | Str. — VI.   |

Heligmoneura Big.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <u>pallipes</u> Mg.      | Fr. — VI. X.     |
| <u>Epitriptus</u> Lw.    |                  |
| <u>cingulatus</u> Fbr.   | Str.             |
| <u>Stilpnogaster</u> Lw. |                  |
| <u>aemulus</u> Mg.       | v. h. — VIII. X. |

**Bombyliidae**AnthracinaeAngyromoeba\* Schin.

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <u>anthrax</u> Schr.   | h. V. Vs. K. — V bis VII. |
| <u>binotata</u> Mg.    | Si. Ltb. — V.             |
| <u>trifasciata</u> Mg. | V. Vs. Fr. — VII. VIII.   |

Hemipenthes Lw.

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>morio</u> L. | v. h. Auch aus Panzeria rudis (in Panolis griseo-variegata) gezogen. — F. Z. J. II bis IV. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Anthrax Fbr.

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <u>fenestratus</u> Fll. | Str.                                                                 |
| <u>hoffentottus</u> L.  | v. h. — VII. bis IX. Auch aus Panzeria rudis. Siehe 6. Ham. moris L. |
| <u>maurus</u> L.        | Str. V. Fr. Vs. K. — VI bis VIII. Aus Panzeria rudis. F. Z. J. IV.   |
| <u>paniscus</u> Rossi   | Str. Fr. — VII. Auch aus Panzeria rudis. F. Z. J. IV.                |
| <u>velutinus</u> Mg.    | Str.                                                                 |

LomatiinaeLomatia Mg.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <u>lateralis</u> Mg. | Si. Ltb. — VII. |
|----------------------|-----------------|

BombyliinaeBombylius L.

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>ater</u> Scop.        | Str. — V.                           |
| <u>canescens</u> Mikan   | Kr. v. G.                           |
| <u>cinerascens</u> Mikan | Str.                                |
| <u>discolor</u> Mikan    | v. h. Str. Fr. V. Vs. K. — III. IV. |
| <u>fimbriatus</u> Mg.    | Str.                                |
| <u>fugax</u> Wied.       | v. h. — VI bis IX.                  |
| <u>fulvenscens</u> Mg.   | Fr. — IX.                           |
| <u>major</u> L.          | v. h. — III bis V.                  |
| <u>venosus</u> Mikan     | v. — V bis VII.                     |

Anastoechus O.-S.

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <u>nitidulus</u> Fbr. | Str. |
|-----------------------|------|

Phthiria Mg.

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <u>canescens</u> Lw.   | Str. Auf Leontodon hastilis — V. VI.   |
| <u>pulicaria</u> Mikan | Str. Fr. Auf Hieracium silvaticum — V. |

Ploas Latr.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <u>virescens</u> Fbr. | Str. R. — V. |
|-----------------------|--------------|

\* *Exoprosopa capucina* Fabr. wurde inzwischen in zwei Exemplaren auf alten Kiesbänken im Rheinvorland gefangen und zwar von mir bei Istein-Efringen am 19. VI. 24. und von Herrn Prof. Dr. Röttle bei Griesheim am 12. VII. 24. Schröder.

**Therevidae****Thereva** Latr.

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| alpina Egg.     | Vg.                     |
| analis L.       | Str. Fr. Sw. — V.       |
| annulata Fbr.   | Str.                    |
| arcuata Lw.     | Str.                    |
| brevicornis Lw. | Fr Sw. — VII.           |
| fulva Mg.       | Str. Fr. In. — VI. VII. |
| fuscipennis Mg. | B. Kr. v. G.            |
| nobilifata Fbr. | Str.                    |
| plebeja L.      | Str. Kr. v. G.          |
| valida Lw.      | Str. — VII.             |

**Psilocephala** Z.

|            |                |
|------------|----------------|
| ardea Frb. | Str. Kr. v. G. |
|------------|----------------|

**Scenopinidae****Scenopinus** Latr.

|                |              |
|----------------|--------------|
| fenestralis L. | v. h. — VII. |
|----------------|--------------|

**Gr. V. Brachycera Orthogenya****Empididae****Hybotinae****Meghyperus** Lw.

|               |    |
|---------------|----|
| sudeticus Lw. | V. |
|---------------|----|

**Hybos** Mg

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| culiciformis Fbr. | Str. Fr. — VII. |
| femoratus Mü.     | Fr. — VII.      |
| fumipennis Mg.    | Fr. — VI.       |
| grossipes L.      | v. h. — VII.    |

**Synedra** Walk.

|                |              |
|----------------|--------------|
| muscarius Fbr. | v. h. — VII. |
|----------------|--------------|

**Bicellaria** Mcq.

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| nigra Mg. | v. h. Beim Verzehren von<br>Mycetophiliden beob. —<br>V. IX. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| simplicipes Z. | Fr. — VI.          |
| spuria Fl.     | v. h. — Vbis VIII. |

**Empidinae****Rhamphomyia** Mg.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| albipennis Fl.      | Str. — V.       |
| atra Mg.            | Str.            |
| cinerascens Mg.     | Str.            |
| erythrophthalma Mg. | Fr. — VIII.     |
| flava Fl.           | Fr. — VI.       |
| gibba Fl.           | v. — VI.        |
| hybotina Z.         | Fr. — VII.      |
| latipennis Mg.      | Str.            |
| lugubrina Z.        | Str. — V.       |
| nigripes Fbr.       | v. — V.         |
| platyptera Pz.      | Str. V. Ma. Pz. |
| plumifera Z.        | Fr. — VI.       |
| spinipes Fl.        | Str.            |
| spissirostris Fl.   | Fr. — IV.       |
| sulcata Mg.         | v. h. — IV.     |
| tenuirostris Fl.    | v. — V.         |
| tephraea Mg.        | Sir.            |
| tibialis Mg.        | Str. — V.       |
| umbripennis Mg.     | v. — IV.        |

**Empis** L.

|               |              |
|---------------|--------------|
| bifincta Lw.  | Fr. Sw. — V. |
| bistortae Mg. | v. — VI.     |

**borealis** L.H. Weibchen tanzen  
in der Luft. — VI.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| chioptera Fl.    | v. — IV.            |
| ciliata Fbr.     | Fr. — IV.           |
| cognata Egg.     | Str. — IX.          |
| decora Mg.       | v. — VI.            |
| discolor Lw.     | Kr. v. G.           |
| femorata Fbr.    | Str.                |
| livida L.        | v. — VI.            |
| lutea Mg.        | v. h. — VIII.       |
| maculata Fbr.    | v. — IV.            |
| meridionalis Mg. | Fr. — V.            |
| modesta Mg.      | Str.                |
| nigricans Mg.    | v. — VI.            |
| opaca Mg.        | Str. Kr. v. G.      |
| pennaria Fl.     | Str.                |
| pennipes L.      | v. — V.             |
| pteropoda Egg.   | Str.                |
| punctata Mg.     | Fr. Kr. v. G. — VI. |
| pusio Egg.       | v. — V.             |
| stercorea L.     | v. h. — V.          |
| tesselata Fbr.   | v. h. — IV. V.      |
| testacea Fbr.    | Fr. Schönberg v. G. |
| trigramma Mg.    | v. h. — IV. V.      |
| vernalis Mg.     | Fr. — IV.           |
| vitripennis Mg.  | Fr. — IV.           |

**Hilara** Mg.

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| abdominalis Z.    | Fr. — IV.           |
| chorica Fl.       | v. h. — V.          |
| clypeata Mg.      | Str. — V. Fr. — IX. |
| flava Schin       | v. — VI.            |
| flavipes Mg.      | Fr. — VIII.         |
| litorea Fl.       | v. — IV.            |
| manicata Mg.      | Fr. — IX.           |
| maura Fbr.        | v. h. — IV. V.      |
| nigrina Fl.       | v. — V.             |
| pilosa Z.         | v. — V. VII.        |
| pinetorum Z.      | Fr. Kr. v. G. — V.  |
| pruinosa Mg.      | Fr. — V.            |
| quadrivittata Mg. | Str.                |
| tenella Fl.       | v. — V.             |

**Ocydrominae****Trichina** Mg.

|              |         |
|--------------|---------|
| flavipes Mg. | v. — X. |
|--------------|---------|

**Microphorus** Mcq.

|                |         |
|----------------|---------|
| anomalus Mg.   | Str.    |
| velutinus Mcq. | v. — V. |

**Oedalea** Mg.

|               |          |
|---------------|----------|
| iristis Scho. | Fr. — V. |
|---------------|----------|

**Ocydromia** Mg.

|                |                |
|----------------|----------------|
| glabricula Fl. | v. h. — IV. V. |
|----------------|----------------|

**Leptopeza** Mcq.

|              |           |
|--------------|-----------|
| flavipes Mg. | Kr. v. G. |
|--------------|-----------|

**Euthyneura** Mcq.

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Gyllenhali Z. | Hochfirst b. Titi-<br>see — VI. |
|---------------|---------------------------------|

**Hemerodromiinae****Clinocera** Mg.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| fontinalis Hal. | Str.              |
| stagnalis Hal.  | Str. Fr. — VII.   |
| Wesmaelii Mcq.  | Fr. M. Sw. — III. |

**Hemerodromia** Mg.

- albicornis Mg. Str. — VI.  
 melanocephala Hal. Fr. — VII.  
 stigmatica Schin. Fr. M. — IX.

**Dolichocephala** Mcq.

- irrorata Fil. v. h. — V.

**Chelipoda** Mcq.

- melanocephala Fbr. Str.

**Phyllodromia** Z.

- albiseta Z. Str.

**Sciudromia** Hal.

- immaculata Hal. Fr. D. — V.

**Tachydromiinae****Drapetis** Mg.

- assimilis Fil. Str.

- exilis Mg. Str.

**Tachista** Lw.

- annulimana Mg. Fr. — X.

- arrogans L. v. h. — VIII bis X.

- connexa Mg. Str. — VII.

**Tachydromia** Mg.

- albocapillata Fil. Str.

- annulipes Mg. Str.

- calceata Mg. Fr. — VI.

- candicans Fil. Fr. — VIII.

- ciliaris Fil. Fr. — VII.

- cursitans Fbr. v. — VIII.

- exigua Mg. Fr. — VI.

- fasciata Mg. v. — VI.

- fascipes Mg. v. — V.

- flavipes Fbr. Fr. — V.

- infuscata Mg. Fr. D. — V.

- lutea Mg. Fr. D. — V.

- maculipes Mg. Str.

- major Z. Fr. — V.

- minuta Mg. v. — V.

- nigra Mg. Fr.

- nigrina Mg. v. — VI.

- nigritarsis Fil. Hi. — VI.

- pallidiventris Mg. Fr. M. — V.

- pallipes Fil. Str.

- rufipes Mg. Fr. — V.

- varia Walk. Fr. — V.

**Dolichopodidae****Dolichopodinae****Sciapus** Zll.

- confricans Wied. Str. Fr. — VI.

- nervosus Lehm. Fr. — VII.

- platypterus Fbr. Str. Fr. — VII.

**Neurigona** Rond.

- Erichsonii Z. Fr. — VIII.

- pallida Fil. v. — X.

- quadrifasciata Fbr. v. — V.

**Dolichopus** Latr.

- atratus Mg. Fr. — VI.

- atripes Mg. Str. Fr. Kr. v. G. — VII.

- claviger Stann. Str.

- discifer Stann. Fr. — VI.

- festivus Hal. Fr. — V.

- griseipennis Stann. Str.

- longicornis Stann. Str.

- Meigenii Lw. Fr. — V.

- nifidus Fil. Fr. — VI.

- picipes Mg. Str.

- plumipes Scop. Fr. — VIII.

- plumitarsis Fil. Fr. — VII.

- signatus Mg. Fr. — V.

- simplex Mg. Fr. — Kr. v. G. — V.

- ungulatus L. v. h. — VI.

- urbanus Stann. Hagnau v. G.

**Hercostomus** Lw.

- fugax Lw. Fr. — VI.

**Syristroma** Mg.

- nodicornis Mg. Str.

**Gymnopternus** Lw.

- celer Mg. Fr. — V.

**Diaphorinae****Chrysotus** Mg.

- gramineus Fil. Str. Fr.

- laesus Wied. Str.

- neglectus Wied. Str. Fr. — VIII.

- suavis Lw. Str.

**Asyndetus** Lw.

- latifrons Lw. Fr. An Klette — VI.

**Diaphorus** Mg.

- Hoffmannseggei Mg. Fr. K. — VII.

- oculatus Fil. Fr. K. — VII.

**Argyra** Mcq.

- argentina Mg. Fr. — VI.

- confinis Z. Str. Fr. — VII.

- leucocephala Mg. Str. Fr. — VI.

**Rhaphinae****Rhaphium** Mg.

- longicorne Fil. Fr. — VI.

**Porphyrops** Mg.

- spinicoxa Lw. Str.

**Syntormon** Lw.

- pallipes Fbr. Str.

**Xiphandrium** Lw.

- appendiculatum Z. Fr. — VI.

- caliginosum Mg. Fr. — VII.

- fissum Lw. Fr. — VI.

- monotrichum Lw. Str.

**Hydrophorinae****Medeterus** Fisch.

- ambiguus Z. Str. Koe. Unter

Tannenrinde.

- diadema L. Str. Fr. — VI.

- jaculus Fil. Str.

- plumbellus Mg. Str. Fr. — X.

- truncorum Mg. Fr. An Bäumen u.

Mauern am Rand

von Gewässern.

**Hydrophorus** Fil.

- bipunctatus Lehm. Schluchsee — VIII.

- praecox Lehm. Str.

Liancalus Lw.

virens Scop. Vg. Fr. Selbst bei Frost-  
wetter an überrieselten  
Steinen. VIII. XI bis III.

Campsicnemus Walk

curvipes Fl. Str. Fr. — IX.

lumbatus Lw. Str. Fr.

scambus Fl. Fr. — IV.

Sympycnus Lw.

annulipes Mg. Fr. — V.

Chrysotimus Lw.

molliculus Fl. Fr. — VII.

Xanthochlorus Lw.

ornatus Hal. Str. Fr. Sw. — VI.

tenellus Wied. v. — VIII. IX.

**Lonchopteridae**Lonchoptera Mg.

lucustris Mg. Str.

v. h. — III bis X.

lutea Pz. Str.

punctum Mg. v. h. — III bis X.

tristis Mg.

v. h. — III bis X.

**U. O. II. Cyclorrhapha****Gr. VI. Aschiza****Syrphidae****Syrphinae**Paragus Latr.

bicolor Fbr. v. — V. VI.

var. lacerus Lw. Fr. Kr. v. G. — VI.

tibialis Fl. v. — VI. VII.

Triglyphus Lw.

primus Lw. Str. Fr. — V.

Pipizella Rond.

flavitaris Mg. v. — IV bis VIII.

virens Fbr. v. — IV bis VIII.

Pipiza Fl.

bimaculata Mg. Fr. — V.

fasciata Mg. Kr. v. G.

festiva Mg. Str. Kr. v. G. — VIII.

lugubris Fbr. v. — VIII.

noctiluca L. v. — V.

notata Mg. Str.

Cnemodon Egg.

vitripennis Mg. Str.

Psiloia Mg.

anthracina Mg. v. — VI.

Chrysogaster**A. Orthoneura** Mcq.

frontalis Lw. Fr. — VII.

nobilis Fl. Fr. — VI.

**B. Liogaster** Rond.

metallina Fbr. Fr. — V.

splendida Mg. Fr. — VIII.

**C. Chrysogaster s. str.** Rond.

aerosa Lw. Fr. — VI.

chalybeata Mg. Fr. — VII.

Macquarti Mg. Fr. — V.

solstitialis Fl.

v. — VIII.

viduata L.

v. — V.

Chilosia Mg.

albipila Mg.

v. — III.

albitarsis Mg.

v. — IV.

antiqua Mg.

Str.

barbata Lw.

v. — VIII.

brachysoma Egg.

v. — IX.

canicularis Pz.

Fr. Sw. — VII

carbonaria Egg.

v. — IV.

chloris Mg.

v. — IV.

chrysocoma Mg.

v. — V.

cynocephala Lw.

Str.

fasciata Schin.

Str.

grossa Fl.

v. — III. VIII.

illustrata Harr.

v. V. Vs. — VII.

bis IX.

impressa Lw.

Str. Fr. Kr. —

VII bis IX.

intonsa Lw.

Fr. — VII.

maculata Fl.

v. — V.

melanopa Z.

Str. Hi. — V.

montana Egg

Str. — IV.

mutabilis Fl.

Str.

pagana Mg.

v. — VIII.

personata Lw.

Fr. — VI.

pictipennis Egg.

Str.

pubera Z.

Fr. — VI.

rhyngops Egg.

Str.

ruralis Mg.

v. — IV.

scutellata Fl.

v. — VII.

soror Z.

v. — VIII.

variabilis Pz.

v. — VII. VIII.

velutina Lw.

v. — IV. V.

vernalis Fl.

Str. — V.

vulpina Mg.

Fr. — IV. VII.

Platyichirus St. F.

albimanus Fbr.

Str.

fulviventris Mcq.

Str.

manicatus Mg.

Fr. — VI.

peltatus Mg.

v. — VII.

scutatus Mg.

v. — VII.

Pyrophaena Schin.

rosarum Fbr.

Str.

Melangyna Verr.

quadrinaculata Verr.

Str.

Melanostoma Schin.

ambiguum Fl.

Fr. — V.

dubium Z.

Fr. — V.

melinum L.

v. h. — VII bis IX.

scafare Fbr.

Fr. — VI.

Xanthandrus Verr.

comtus Harr.

v. — IX.

Leucozona Schin.

lucorum L.

v. h. — VIII.

Eriozona Schin.

syrphoides Fl.

Vg.

Ischyrosyrphus Big.

gaucius L.

v. — IX.

laternarius O. F. Müll.

Fr. Sw. — VII.

bis IX.

Didea Mcq.

- alneti Fl. v. — V. VIII.  
fasciata Mcq. v. — IX.

Lasiophthalmus Rond.

- pyrastris L. v. h. — IV. — VIII. IX.  
seleniticus Mg. v. — VI bis IX.

Syrphus Fbr.

- albos riatu Fl. v. — IX.  
annulipes Z. v. — V.  
arcuatus Fl. v. — VII.  
auricollis Mg. Fr. — V bis VII.  
balteatus Deg. v. h. — II bis X.  
barbifrons Fl. Fr.  
bifasciatus Fbr. v. — IV.  
cinctellus Z. v. h. — III bis VIII.  
cinctus Fl. Fr. — VIII.  
corollae Fbr. v. — VIII.  
diaphanus Z. Fr. — VIII.  
grossulariae Mg. v. — V bis X.  
lasiophthalmus Z. Fr. — V.  
lineola Z. Fr. — VI.  
lunulatus Mg. Str. Fr. — VI.  
macularis Z. Fr. — V.  
nitidicollis Mg. Str.  
ochrostoma Z. Str.  
ribesii L. v. — VI.  
torvus O.-S. v. — V.  
tricinctus Fl. v. — III. IX.  
umbellatarum Fbr. v. — VII.  
venustus Mg. Fr. — V.  
vittiger Z. v. — VII.

Sphaerophoria St. F.

- flavicauda Z. Str.  
var. nitidicollis Z. Str.  
menihastri L. v. h. — VI bis VIII.  
var. picta Mg. v. h. — VIII.  
scripta L. v. h. — VI bis VIII.  
var. dispar Lw. v. h. — VI.  
var. strigata Staeg. v. h. — VI.

Xanthogramma Schin.

- citrofasciatum Deg. v. — IV.  
ornatum Mg. v. — IV bis VIII.

Doros Mg.

- conopeus Zeller. Wutach. Leininger.  
Nat. V. Kr. 28.

Baccha Fbr.

- elongata Fbr. v. — V bis IX.

Sphegina Mg.

- clunipes Fl. h. Sw. — V bis VII.

Nevascia Will.

- dispar Mg. Fr. — V.  
floralis Mg. Fr. — VII.  
podagrica Fbr. v. h. — VI bis VIII.

Brachyopa Mg.

- bicolor Fl. h. Str. Ausfluß von  
Aesculus hipp. — V.  
B.-Baden. v. G.  
dorsata Z.

Rhingia Scop.

- campestris Mg. Fr. — V.  
rostrata L. v. — VI. VIII.

VolucellinaeVolucella Geoff.

- bombylans L. v. — V bis VII.  
inanis L. v. h. — VIII.  
inflata Fbr. Str. An Ausfluß von  
Quercus. Fr. — V.  
pellucens L. v. h. — VI bis VIII.  
zonaria Poda. Str. Fr. Sulzfeld  
v. G. — VIII. IX.

EristalinaeEristalis Latr.C. Eristalinus Rond.

- sepulchralis L. v. — VII. VIII.

D. Lathyrophthalmus Mik.

- aeneus Scop. v. — IV. V. IX.

F. Eristalomyia Rond.

- cryptarum Fbr. Vg. Sw. Rinken.  
Moor — VII.  
tenax L. v. h. — VII bis XI.

G. Eristalis s. str. Rond.

- arbustorum L. v. h. — VIII bis X.  
horticola Deg. Str.  
intricarius L. v. — VII.  
jugorum Egg. Vg. Sw. — VI bis IX.  
nemorum L. v. — VII.  
nigritarsis Mcq. Str.  
pertinax Scop. v. h. — VIII. IX.  
pratensis Mg. Str.  
rupium Fbr. h. Vg. Sw. — VII  
bis IX.

Helophilus Mg.

- B. pendulus L. v. — IX.  
trivittatus Fbr. v. — IX.  
C. frutetorum Fbr. Str. R. — VIII.  
D. lineata Fbr. L. Ltb.

Myiatropa Rond.

- floreola L. v. h. — VIII. IX.  
var. nigrotarsata Schin. Fr. Kr. v. G.  
— VIII. IX.

Mallota Mg.

- fuciformis Fbr. Str. Fr. Auf Cra-  
taegus — IV.

Merodon Mg.

- armipes Rond. Str.  
aquestris Fbr. Str. Fr. Sm. — VI.  
nigritarsis Rond. Str.  
rutilus Mg. Fr. — VII.  
spinipes Fbr. Str.

MilesiinaeTropidia Mg.

- fasciata Mg. Str.  
scita Harr. Kr. v. G.

Myiolepta Newm.

- luteola Gmel. Str.

Criorrhina Mg.

- asilica Fl. Str. Auf Cratae-  
gus — V.  
berberina Fbr. v. — VIII.

- oxyacanthae Mg. v. Str. Fr. L. Li  
— VI. VIII.  
Fr. Re. Sm. — III.
- ranunculi Pz. Fr. Re. Sm. — III.
- Cynorrhina Mg.  
tallax L. Vg. Sw. — VII.
- Brachypalpus Mcq.  
chrysites Egg. Fr. D. B.-Baden  
v. G. — VI.  
v. — III bis V.
- valgus Pz.
- Xylota Mg.  
abiens Mg. Str.  
curvipes Lw. Str. Fr. — VI.  
femorata L. Str. Fr. Sw. — VII  
v. — VII.  
florum Fbr. v. — VI.  
ignava Pz. Str.  
lenta Mg. v. — V. bis VII.  
nemorum Fbr. v. h. — VII bis X.  
segnis L. v. — VII. VIII.  
silvarum L. Str.  
tarda Mg.
- Syriffa St. F.  
pipiens L. v. h. — VI bis IX.
- Eumerus Mg.  
ruficornis Mg. Str.  
strigatus Fll. v. h. — VII bis IX.  
tarsalis Lw. Str.  
tricolor Mg. v. V. Vs. — VII.
- Ferdinandea Rond.  
cuprea Scop. v. Ausfluß von  
Quercus — VIII.  
v. — V. VII.
- var. nigrifrons Egg.
- Arctophila Schin.  
bombiformis Fll. V. Vs. Sw. Hi. —  
VI. VII.  
mussifans Fbr. V. Vs. Sw. m. —  
VIII. IX.
- Sericomyia Mg.  
borealis Fll. V. Vg. Fr. Sw. m.  
— VIII. IX.  
lappona L. Vg. Sw. Hi. —  
VI bis VIII.
- Spilomyia Mg.  
saltuum Fbr. Vg.
- Temnostoma St. F.  
apiforme Fbr. V. Sulzfeld v. G.  
bombylans Fbr. Str. Rw. — V. VI.  
An Baumstöcken.  
rüttelnd.  
vespiforme L. Str. Rw. Fr. D. —  
V bis VII. An Eichen-  
stöcken.
- Calliprobola Rond.  
speciosa Rossi. Str. Rw. Fr. D. —  
V bis VII.
- Chrysotoxinae**  
Chrysotoxum Mg.  
arcuatum L. v. h. — VI. VII.  
bicinctum L. v. — VII. VIII.
- cautum Harr. Fr. Re. — VI.  
elegans Lw. Str. V. Fr. K. —  
VIII. IX.  
fasciolatum Deg. v. — VII bis X.  
festivum L. v. — VI. VII.  
intermedium Mg. v. — V.  
octomaculatum Curt. v. — IX.  
vernale Lw. E. Sch.
- Callicera Pz.  
aenea Fbr. Vg. — VI.
- Microdontinae**  
Microdon Mg.  
devius L. v. Str. Fr. m. Rw.  
— V. VI.  
Hi. — VI.  
latifrons Lw.
- Ceriinae**  
Cerioïdes Rond.  
conopoïdes L. Str. In Griesheim  
— VI. An Ausfluß.  
subsessilis Fll. Str. — V. An Aus-  
fluß von Aesculus  
hipp.
- Pipunculidae**  
Pipunculus Latr.  
campestris Latr. Fr. — VI.  
geniculatus Mg. v. — VII. VIII. X.  
modestus Hal. Str. Fr. — V.  
pratorum Fll. v. — V.  
rufipes Mg. Str.  
ruralis Mg. Fr. — VII.  
silvaticus Mg. v. — VI.  
zonatus Z. Str.
- Chalarus Walk.  
spurius Fll. v. — VI.
- Verrallia Mik.  
aucta Fll. v. — VII.
- Phoridae**  
Phora Latr.  
abbreviata Ros. Str.  
caliginosa Mg. Str.  
concinna Mg. Str.  
crassicornis Mg. v. — VIII.  
maculata Mg. Str.  
nigricornis Egg. Str.  
opaca Mg. Str.
- Hypocera Lioy  
mordellaria Fll. Str.
- Aphiochaeta Brues.  
lutea Mg. Fr. — VIII.  
pulicaria Fll. v. — III.  
rufipes Mg. v. h. — I bis XII. Koe.
- Trineura Mg.  
aeterrima Fbr. v. h. — IV. Tänze  
an Buschwerk.  
Schineri Bck. Fr. — IX. Tänze  
an Buschwerk.

|                         |                                          |  |                      |                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>Gymnophora</u> Mcq.  |                                          |  | <u>Platypeza</u> Mg. |                                                              |
| arcuata Mg.             | v. — IV.                                 |  | atra Mg.             | V. Vs. Sw. — VIII.<br>Rennt auf Blättern<br>im Kreise umher. |
| <b>Platypezidae</b>     |                                          |  |                      | Str. — X. Siehe<br>bei fasciata.                             |
| <u>Opetia</u> Mg.       |                                          |  | boletina Fll.        | Fr. — X.                                                     |
| nigra Mg.               | Str. Rw. — X. Auf<br>Blättern a. Wasser. |  | dorsalis Mg.         | v. h. — Auf Blät-<br>tern in Nahe von<br>Wasser.             |
| <u>Callimyia</u> Mg.    |                                          |  | fasciata Mg.         | Str. — X. Siehe<br>bei fasciata.                             |
| amoena Mg.              | Str. V. — VII.                           |  |                      | (Forts. folgt.)                                              |
| elegans Mg.             | Str. V.                                  |  | rufa Mg.             |                                                              |
| leptiformis Fll.        | Str. V.                                  |  |                      |                                                              |
| <u>Agathomyia</u> Verr. |                                          |  |                      |                                                              |
| antennata Z.            | Fr. m. — V.                              |  |                      |                                                              |

## Hymenopterologische Beiträge zur Fauna Badens.

Von Hermann Leininger, Karlsruhe.

(Schluß.)

### Prosopis F.

Friese (95) gibt für die Gegend von Oppenau folgende Arten an: *P. signata* Pz. (= *bipunctata* F.); *P. communis* Nyl. (= *annulata* F.); *P. dilatata* K. und *hyalinata* Sm.; ich habe außer diesen im Gebiet noch folgende feststellen können:

- P. variegata* F. Wenckheim (Kneucker coll.), Waldkirch. (Fr.)  
*P. clypearis* Schenck. K.: Karlsruhe, Michaelsberg b. Bruchsal.  
*P. confusa* Nyl. An Löswänden bei Mengen bei Freiburg in großer Zahl fliegend (Juni 1922).  
*P. punctulatissima* Sm. im Juli d. J. auf Blüten von *Allium porrum*. Karlsruhe.

### Colletes Latr.

Im ersten Frühjahr findet sich in den Rheinwäldern bei Karlsruhe *C. cunicularia* häufig; auf sandigen Wegen sieht man die ♀ an den Nistplätzen fliegen; beide Geschlechter sind leicht auf blühenden Weiden zu erbeuten. Ebenso häufig in der Gegend von Straßburg (Friese 95), gehört zu den charakteristischen Formen dieser Sandgegenden.

- C. daviesiana* Sm. nistet nach Friese in Löswänden bei Achenheim (Elsaß); ich fand ihre Bauten im Molassesandstein bei Staad a. Bodensee und besitze sie vom Kaiserstuhl: Riegel (Fr.) und Ihringen (Fr.).  
*C. fodiens* K. dagegen nur von Waldkirch (Fr.).

### Andrena F.

- A. cetii* Schrk. K. Rheindämme b. Eggenstein.  
*A. schencki* Mor. Diese schöne Biene traf ich im Mai 1922 in großer Zahl an Inkarnatklée bei Eggenstein. F.: Elztal (Fr.). Lauterborn (2) gibt sie für die Pfalz an.  
*A. tscheki* Mor. war in diesem Frühjahr in der Umgebung Karlsruhes vielfach anzutreffen; sie besuchte mit Vorliebe die Blüten des Wiesen-schaumkrauts.  
*A. lapponica* Zett. Nur in den höheren Lagen des Nordschwarzwaldes an blühenden Heidelbeeren: Schurmsee; Moor b. Kaltenbronn.  
Für  
*A. florea* F. gibt Friese (95) keinen badischen Fundort an. In großer Anzahl an *Bryonia*: Tuniberg (Munzingen, Tiengen), Kaiserstuhl (Riegel) (Fr.).  
*A. austriaca* Pz. Nach Friese 1 ♀ bei Oppenau. K.: Eggenstein, Durlach. F.: Waldkirch.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1923-1924

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die Dipteren des Oberrheins 108-116](#)