

vorkommen, stets den gleichen Namen tragen sollten, bis heute noch nicht durchgerungen.

Von seinen Publikationen seien nur folgende erwähnt, die in chronologischer Reihenfolge wie folgt erschienen sind:

1907 „Über Zeichnungs-Aberrationen bei *Lycaeniden*“.

1911 „Entdeckungsreisen und kritische Spaziergänge ins Land der *Lycaeniden*“.

1914 „Zur Synonymie des Genus *Lycaena*“.

1916 „Über Männchenschuppen bei *Lycaeniden*“.

1917 „Über Nebenformen, Rassen und Zwischenformen bei *Lycaeniden*“.

Wer sich je in diese Literatur vertieft hat, der weiß, mit welcher Genauigkeit und Gründlichkeit der Forscher seine Lieblinge behandelt und mit welcher überzeugender Klarheit er seinen Standpunkt zu verteidigen weiß.

Die von Courvoisier angelegte und seiner Vaterstadt geschenkte Sammlung enthält 16 000 Exemplare in 1370 Arten und unzählige Nebenformen in Färbung und Zeichnung. In seiner Art und Genauigkeit steht sie allein da, denn selbst das gewaltige Britische Museum birgt meines Wissens keine *Lycaeniden*-sammlung, die so vielseitig ausgearbeitet ist, und somit einen Vergleich mit dieser aushalten könnte. So läßt sich in Kürze das Werk des Meisters umschreiben. Leider weilt er nicht mehr unter uns; am 8. April 1918 ist er einer Lungenentzündung erlegen. —

Bevor ich schließe, gestatte ich mir noch einige ergänzende Bemerkungen zur Sammlung selbst:

Courvoisier bezeichnet die Arten seiner Sammlung, mit den von ihm als erstberechtigt erkannten Namen; der richtige Namen steht jeweils oben im Sammlungskasten, ihm folgen dann die im Laufe der Zeit erteilten Synonyme. Als Standortetiketten werden verschiedenfarbige Papiere verwendet je nach der Herkunft des Tieres, z. B. dunkelgrün für Europa, rosa für Asien, grau für Afrika usw. Wo es möglich war, hat Courvoisier charakteristische Zeichnungen der *Androconien* angefertigt, die er in den Sammlungskästen neben dem Namen der betreffenden Art angebracht hat. In ähnlicher Weise hat er noch seine Aberrationensammlung mit Zeichnungen bereichert.

Am Schlusse meiner Ausführungen angelangt, schließe ich mit den Worten des Schweizer Dichters:

„Trink o Auge, was die Wimper hält,
Von dem goldenen Überfluß der Welt!“

Die Dipteren des Oberrheins.

Beitrag zu einem Verzeichnis von Professor Dr. Weigand†, Freiburg i. Br.
(Schluß.)

Gr. VIII. *Schizophora holometopa*

Scatophomyzidae

Cordylurinae

Cordylura Fll.

<i>ciliata</i> Mg.	v. — VII.
<i>pubera</i> L.	v. — IV bis VI.
<i>pudica</i> Mg.	Str.
<i>rufimana</i> Mg.	v. — IV.

Parallelomma Bck.

<i>albipes</i> Fll.	v. — IV bis VIII.
---------------------	-------------------

Phrosia R.-D.

<i>albilabris</i> Fbr.	v. h. — IV bis VI.
------------------------	--------------------

Cnemopogon Rond.

apicalis Wied.

v. Auch aus Liparaschilf — III — VI.

Orthocheta Bck.

pilosa Z.

Str. — V.

Amaurosoma Bck.

fasciatum Mg.

v. — IV.

flavipes Fll.

v. — IV. VIII.

tibiellum Z.

v. — V. VI.

Scatophaginae

Scatophaga Mg.

analis Mg.

Str.

inquinata Mg.	v. - VII.
lateralis Mg.	Str.
lutaria Fbr.	v. - VIII.
merdaria Fbr.	v. h. - III bis X.
squalida Mg.	v. - IV bis VII.
stercoraria L.	v. h. - III bis X. Koe.
suilla Fbr.	Str.

Norellinae

Norellia R.-D.

spinimana Fll.	Str.
----------------	------

Hydromyzinae

Hydromyza Fll.

livens Fbr.	Sw. Schluchsee - VIII.
-------------	------------------------

Tricopalpus Rond.

fraternus Mg.	Str.
punctipes Mg.	v. - IX.

Spathiophora Rond.

hydromyzina Fll.	Str.
------------------	------

Thyreophorinae

Thyreophora Mg.

cynophila Pz.	Ma. Pz. Zns. Germ.
---------------	--------------------

Borboridae

Borborus Mg.

equinus Fll.	v. - III bis V.
glabifrons Mg.	Fr. - XI.
niger Mg.	v. - IV.
nitidus Mg.	v. - XI.
vitripennis Mg.	v. - XI. Auch auf Schnee.

Olina R.-D.

geniculata Mcq.	v. - I bis XII. Koe.
-----------------	----------------------

Sphaerocera Latr.

pusilla Fll.	Str.
subsultans Fbr.	v. h. - III bis X. Koe.

Limosina Mcq.

bifrons Stenh.	Str.
ferruginata Stenh.	Koe.
fontinalis Fll.	v. - III bis VI.
limosa Fll.	v. - I bis XII.
litoralis Stenh.	Str.
lutosa Stenh.	v. - I bis XII.
ochripes Mg.	v. - III bis X.
oelandica Stenh.	v. - II bis IV. X.
pullula Z.	Str.
pumilio Mg.	v. - II bis X. Koe.
pusio Z.	Str.
scutellaris Hal.	Koe.
silvatica Mg.	v. - III bis X.

Dryomyzidae

Dryomyza Fll.

anilis Fll.	v. - VII.
flaveola Fbr.	v. - VII.
var. Zawadskii Schum.	v. - X. XI. II.

Heteroneuridae

Heteroneura Fll.

albimana Mg.	Fr. - IX.
pictipes Z.	Str. - V.

Trigonometopinae

Trigonometopus Mcq.

frontalis Mg.	Str. Rw. Fr. Re. Auf Schilf über Wasser. - X. - III.
---------------	--

Helomyzidae

Helomyza Fll.

flava Mg.	Fr. - VI. VII.
gigantea Mg.	Str.
maxima Schin.	Fr. - V.
olens Mg.	v. - III. VIII. X.
rufa Fll.	v. - V. VI.
similis Mg.	v. h. - V bis X.
usulata Mg.	v. - VI bis VIII.
variegata Lw.	Fr. - VII.

Allophyla Lw.

atricornis Mg.	Str.
----------------	------

Scoliocentra Lw.

villosa Mg.	Fr.
-------------	-----

Eccoptomera Lw.

longiseta Mg.	Fr. - V.
microps Mg.	Fr. - III.

Oeciothea Hal.

fenestralis Fll.	Str.
------------------	------

Blepharoptera Mcq.

caesia Mg.	v. - V. XI.
modesta Mg.	v. - III. VI.
serrata L.	v. - III.

Heteromyza Fll.

atricornis Mg.	v. - III.
----------------	-----------

Tephrochlamis Lw.

canescens Mg.	Koe.
flavipes Z.	v. - IV.

Thelida R.-D.

oculata Fll.	Fr. - II.
--------------	-----------

Sciomyzidae

Sciomyzinae

Pelidnotoptera Rond.

nigripennis Fbr.	Str.
------------------	------

Phaeomyia Schin.

fuscipennis Mg.	v. - V.
-----------------	---------

Sciomyza Fll.

albocostata Fll.	v. - VI. VII.
annulipes Z.	v. - III. X.
austera Mg.	Str.
dorsata Z.	v. - VI.
dubia Fll.	v. - VII.
griseola Fll.	v. - IX.
nana Fll.	Str. Fr. - VIII.
obtusa Fll.	Str.
sordida Hend.	v. - III. VI.
ventralis Fll.	Fr. - III.

Graphomyzina Mcq.

limbata Mg.	Str. - V.
-------------	-----------

Dichrochira Mg.

nigrimana Mg.	Str.
---------------	------

Tetanura Fll.

pallidiventrif Fll.	Str.
---------------------	------

Ditaenia Hd.

- cinerella Fil. v. - V. VI. X.
Schönherri Fil. v. - III. IV. VIII. X.

TetanocerinaeTetanocera Dum.

- elata Fbr. v. - VII.
ferruginea Fil. v. - IV bis VI.
 var. robusta Lw. v. - VI. VIII.
laevifrons Lw. Fr. - VIII.
silvatica Mg. v. - IX.

Lunigara Hd.

- chaerophylli Fbr. Fr. - VII. IX.
Dictya Mg.

- umbrarum L. v. - VII.

Tryptoptera Hd.

- punctulata Scop. v. h. - VII. VIII.

Pherbina R.-D.

- coryleti Scop. Fr. - VI.
punctata Fbr. v. - IV.
vittigera Schin. Fr. - X.

Hedroneura Hd.

- cularia L. Str. - V.
rufa Pz. Str. - VI.

Elgiva Meg.

- albisetia Scop. v. - VI. X.
lineata Fil. Fr. - X.

Hydromyia R.-D.

- dorsalis Fbr. v. - III. V. IX. XI.

Limnia R.-D.

- fumigata Scop. Str.
recta Lw. Fr. - VI.
unguicornis Scop. v. h. - V bis VIII.

Coremacera Rond.

- catenata Lw. Str.
cincta Fbr. Gauchach. Schr. - VI.
marginata Fbr. v. h. - VI bis X.

Sepedon Latr.

- sphegeus Fbr. v. h. - IV bis X.
spinipes Scop. v. h. - IV bis VI.

Dichetophora Rond.

- obliterata Fbr. v. - VIII bis X.

SapromyzidaeSapromyza Fil.

- albiceps Fil. Str. - VI.
anisodactyla Lw. Str.
apicalis Lw. v. - V. IX.
decumpunctata Fil. v. h. - V.
decipiens Lw. v. - V bis VIII.
difformis Lw. Fr. - V.
fasciata Fil. v. - V.
illota Lw. Fr. - VI.
longipennis Fbr. v. h. - V bis VIII.
lupulina Fbr. v. - VI.
obscuripennis Lw. v. - VII.
pallidiventrif Fil. v. - VIII.
plumicornis Fil. v. - V bis VII.
praeusta Fil. v. h. - VI bis VIII.
quadripunctata L. v. h. - VI bis VIII.
rorida Fil. v. h. - VI bis X.
sempunctata Mg. v. - VI bis IX.

Peplomyza Hal.

- litura Mg. v. - V. VIII. X.

Lauxania Latr.

- aenea Fil. v. h. - V bis X.
cylindricornis Fbr. v. - V. VI.
Elisae Mg. Str.
nitens Lw. v. - V. VIII.

LonchaeidaeLonchaea Fil.

- chorea Fbr. v. - IX.
dasyops Mg. Str.
hirticeps Z. Fr. - IV.
lucidiventrif Bck. Koe.
parvicornis Mg. Fr. - V.
tarsata Fil. Fr. - V.

Palloptera Fil.

- arcuata Fbr. v. - V. bis IX.
parallela Lw. Fr. Sw. - VIII.
saltuum L. Feldberg. Sw. - VIII.
trimacula Mg. Fr. - VI.
umbellatarum Fbr. v. - VII. VIII.
ustulata Fil. In. - VII.

OrtaliidaeOrtaliniaeHeramyia R.-D.

- bucephala Mg. Str. R. W. Sch. - IV.

Ptilonota Lw.

- centralis Fbr. v. R. W. M. - IV.
guttata Mg. v. R. W. M. - IV.

Ortalis Fil.

- formosa Pz. Str. V.
ruficeps Fbr. Str. V. K. Sm. - V.

Herina R.-D.

- afflicta Mg. v. - VIII.
frondescens L. v. h. - VI.
nigrina Mg. v. - VI.
palustris Mg. v. - VI.

Meliera R.-D.

- crassipennis Fbr. Str. R. Kr. v. G. - VI.
omissa Mg. v. R. M. - VI.

CephalinaTanypeza Fil.

- longimana Fil. Fr. M. - VII.

PlatystominaPlatystoma Mg.

- seminationis L. v. - VI.

Rivellia R.-D.

- syngenesiae Fbr. v. - VI. VII.

UlidiinaeMyodina R.-D.

- vibrans L. Str.

Ulidia Mg.

- erythrophthalma Mg. v. - VI. VII.
nigripennis L. Str.

Chrysomya Fil.

- demandata Fbr. Str. Fr. - VIII.

TrypetidaePlatyparea Lw.

- discoidea Fbr. Str. Fr. Sw. - V.
poeciloptera Schrk. Str. An Sparge.
schädlich. -
V. bis VI.

Anomoea Walk.

- antica Wied. Str. Auf Weiß-
dorn - VII.

Acidia R-D.

- caesio Harr. Fr. D. - VII.
cognata Wied. Fr. Sw. - VIII.
heraclei L. v. - V. VII. XI
lucida Fll. Str. - VII.

Spilographa Lw.

- hamifera Lw. Fr. D. - VIII.
Zoë Mg. Fr. M. - V.

Rhagoletis Lw.

- cerasi L. h. Str. Fr. Auf
Lonicera xylos-
teum - VI. VII.

Orellia R-D.

- Wiedemanni Mg. Str. Auf Bryonia
dioeca - VI. VII.

Trypeta Mg.

- colon Mg. Str. Auf Cent.
scabiosa - VII.
cylindrica R-D. v. h. Auf Cirs.
palustre - VI. VII.
falcata Scop. v. Auf Bocksbart
- V. bis VII.
florescentiae L. v. Auf Cirs.
palustre - VI. VII.
jaceae R-D. Fr. - VII. IX.
tussilaginis Fbr. Str. V. Fr. Auf
Klette - VII. VIII.
Winthemi Mg. Fr. M. Auf Cirs.
palustre - VII.
VIII.

Ensina R-D.

- sonchi L. v. h. - IV. VI.

Urophora R-D.

- cardui L. v. h. - VI.
quadrifasciata Mg. v. h. Auf Cent.
aurea scabiosa
- VII.
solstitialis L. Str. Fr. Auf Card.
crispus, nutans
- VI. VII.
stylata Fbr. Str. Fr. Auf Cirs.
lanceolatum -
VI. bis VIII.

Sphenella R-D.

- marginata Fll. v. - VII. VIII.

Carphotricha Lw.

- pupillata Fll. Fr. Auf Hier-
acium - V. VI.

Oxyphora R-D.

- flava Geoffr. v. h. Auf Cirsien
- VI. bis VIII.

Schefferi Frauenf.
Westermanni Mg.
Oxyna R-D.

- doronici Lw. Fr. Hi. - VI.
elongatula Lw. Fr. M. - IX.
flavipennis Lw. v. h. - VII. VIII.
parietina L. v. - VI.
proboscidea Lw. Str. - VII.
producta Lw. Str.
tessellata Lw. Fr. - V. VI.

Tephritis Latr.

- arnicae L. Fr. Sw. An
Arnica montana
v. Auf Klette -
VII.
bardanae Schrk. v. - III. bis VI.
conjuncta Lw. Fr. - VII.
conura Lw. v. - V. bis VII.
dilacerata Lw. Fr. D. - V.
Eggeri Frauenf. Sw. Baar. Schr.
hyoscyami L. Auf Card. deflo-
ratus - VI.

leontodontis Deg.

- nigricauda Lw. v. h. - I. II. IV.
ruralis Lw. v. Auch auf
Schnee - III. V. XI.
vespertina Lw. v. h. - V. VI. XII.
Zelleri Lw. Fr. D. - VII.
Str. Auf Pul.
dysenterica

Urellia R-D.

- eluta Mg. v. Auf Cent. sca-
biosa - IX.
stellata Fuessly Str. Fr. Auf Sene-
cio, Gnaphalium
- VIII.

SepsidaeSepsis

- cynipsea L. v. h. - III. bis
VIII. Koe.
punctum Fbr. Str. Fr. - IV.
violacea Mg. Fr. - VI.

Enicita Ww.

- annulipes Mg. Str.

Themira R-D.

- putris L. v. - IV.

Nemopoda R-D.

- cylindrica Fbr. v. h. - V. - IX.
stercoraria R-D. Str. Koe.

Saltella R-D.

- scutellaris Fll. Str. Fr. - VI.

Piophila Fll.

- casei L. v. - VI.

Mycetaulus Lw.

- bipunctatus Fll. Str.

MicropezidaeCalobata Mg.

- calceata Fll. Str. - VI.
cibaria L. v. - V. bis VIII.
cothurnata Pz. Str.

ephippium Fbr.	v. — VII.
petronella L.	Fr. Hi. — VII.
<u>Micropeza</u> Mg.	
<i>corrigiolata</i> L.	v. — VI.
<i>lateralis</i> Mg.	v. — VII.

Psilidae

<u>Psila</u> Mg.	
<i>abdominalis</i> Schum.	Fr. — VIII.
<i>atra</i> Mg.	Hi. — V.
<i>bicolor</i> Mg.	v. — VIII.
<i>finetaria</i> L.	v. — V. bis VIII.
<i>gracilis</i> Mg.	v. — VI.
<i>morio</i> Z.	Fr. — IV.
<i>rosae</i> Fbr.	Fr. — V. VI.

Platystyla Mcq.

<i>Hoffmannseggii</i> Mg.	Kr. Ltb.
---------------------------	----------

Chyliza Fil.

<i>scutellata</i> Fabr.	v. — VI.
<i>vittata</i> Mg.	Str.
<u>Megachetum</u> Rond.	
<i>atrifeta</i> Mg.	Str. Fr. Landeck — V.

Loxocera Mg.

<i>elongata</i> Mg.	v. Rw. M. — X.
<i>ichneumonea</i> L.	Str. — VIII.
<i>silvatica</i> Mg.	Fr. — V.

Chloropidae

Chloropinae

<u>Centor</u> Lw.	
<i>cereris</i> Fil.	v. h. — VI. VII.
<u>Anthrachophaga</u> Lw.	
<i>frontosa</i> Mg.	Str.
<i>strigula</i> Fbr.	Str.
<u>Haplegis</u> Lw.	
<i>flavifarsis</i> Mg.	Fr. — IV.
<i>tarsata</i> Fil.	v. — VI. bis VIII.
<u>Meromyza</u> Mg.	
<i>nigriventris</i> Mcq.	v. — V.
<i>pratorum</i> Mg.	v. — VII. VIII.
<i>saltatrix</i> L.	v. — VI. VII.
<i>variegata</i> Mg.	v. — VI. VII.

Chlorops Mg.

<i>geminata</i> Mg.	v. — VIII.
<i>gracilis</i> Mg.	Str.
<i>hypostigma</i> Mg.	v. — VII. VIII.
<i>laeta</i> Mg.	Str.
<i>lineata</i> Fbr.	v. — V.
<i>longula</i> Mg.	Fr. — VI.
<i>nasuta</i> Schrk.	v. — IV. IX.
<i>notata</i> Mg.	v. — III.
<i>pulchra</i> Schin.	Str.
<i>scalaris</i> Mg.	Str.
<i>serena</i> Lw.	v. h. — III. VI.
<i>taeniopa</i> Mg.	v. — VII. IX.

Chloropisca Lw.

<i>circumdata</i> Mg.	Str.
<i>glabra</i> Mg.	v. — IV. bis VI.
<u>Camarota</u> Mg.	
<i>flavifarsis</i> Mg.	Fr. — IV. XI.

Platycephala Fil.

<i>planifrons</i> Fbr.	v. — VI. bis VIII.
<i>umbraculata</i> Fbr.	v. — VI. VIII.

Eurina Mg.

<i>calva</i> Egg.	Str. An Carex stricta — III. bis V.
<i>pubescens</i> Mg.	v. An Carex stricta — III.

Homalura Mg.

<i>tarsata</i> Mg.	v. Aus Schilf ge- zogen — V.
--------------------	---------------------------------

Oscininae

Siphonella Mcq.

<i>flavella</i> Z.	Str.
<i>laevigata</i> Fil.	v. — VIII. XII.
<i>pumilionis</i> Bjerk.	v. — VI. VII.

Oscinis Latr.

<i>albiseta</i> Mg.	v. — VI.
<i>atra</i> Mg.	Str.
<i>cognata</i> Mg.	v. — IX.
<i>frit</i> L.	v. — VI.
<i>frontella</i> Fil.	Str. — VIII.
<i>glaberrima</i> Mg.	Fr. — VIII.
<i>maura</i> Fil.	v. — V.
<i>pratensis</i> Mg.	v. — VII.
<i>pusilla</i> Mg.	v. — IX.
<i>ruficeps</i> Mg.	Str.
<i>rufipes</i> Mg.	Fr. — VI

Notonaulax Bck.

<i>cincta</i> Mg.	v. — III. VI.
<i>lineella</i> Fil.	Str.

Lipara Mg.

<i>lucens</i> Mg.	v. h. Aus Schilf gezogen — V
<i>rufitarsis</i> Lw.	v. Aus Schilf ge- zogen — V.
<i>similis</i> Schin.	Fr. Rw. Aus Schilf gezogen — V.

Gampsocera Schin.

<i>numerata</i> Heegec.	Fr. — X. 23. Schr.
-------------------------	--------------------

Crassisefta v. R.

<i>cornuta</i> Fil.	v. — IV. VII. bis XI.
---------------------	-----------------------

Ephydridae

Notiphilinae

Notiphila Fil.

<i>annulipes</i> Stenh.	Str.
<i>cinerea</i> Fil.	v. — VI.
<i>nigricornis</i> Stenh.	Str.
<i>riparia</i> Mg.	Str.

Dichaeta Mg.

<i>caudata</i> Fil.	Str.
---------------------	------

Trimerina Mcq.

<i>madizans</i> Fil.	v. — IV.
----------------------	----------

Gymnopa Fil.

<i>subsultans</i> Fbr.	v. — V. X. bis II.
------------------------	--------------------

Discomyza Mg.

<i>incurva</i> Fil.	v. — VII. IX.
---------------------	---------------

Jlythea Hal.

<i>spilota</i> Curt.	Fr. — VI.
----------------------	-----------

Ephygrobia Schin.

nigritella Stenh.	v. - IV.
nitidula Fll.	Str. - XI.
Roederi Gi.	Hi. - V.

Clasiopa Stenh.

calceata Mg.	Str.
plumosa Fll.	Str.

HydrellinaeHydrellia R-D.

caesia Stenh.	Fr. Läuft auf dem Wasser - IV.
chrysostoma Mg.	Str.
griseola Fll.	v. h. - IV. V. IX. bis XI.
mutata Z.	Str.
nigripes L.	Str.
ranunculi Hal.	Str.

Philygria Stenh.

flavipes Fll.	Str.
picta Fll.	Fr. - XI.
stictica Mg.	Str.

Hyadina Hal.

guttata Fll.	v. - III. IV.
--------------	---------------

EphydrinaeOchtera Latr.

mantis Deg.	Sw. Schluchsee - VII.
-------------	-----------------------

Parydra Stenh.

aquila Fll.	v. - VII.
coarctata Fll.	v. - IX.
fossarum Hal.	v. - IV. bis VII.
litoralis Mg.	v. - III. IV. VI. VIII.
nubecula Bck.	Fr. - VIII.
pusilla Mg.	Str.
quadripunctata Mg.	Fr. M. - IX.

Ephydra Fll.

breviventris Lw.	v. - IV. IX.
micans Hal.	Str. L. Lth.
riparia Fll.	Str.

Scatella R-D.

dichaeta Lw.	Fr. - IV.
lufosa Hal.	Str.
paludum Mg.	v. - IV.
quadrata Fll.	Fr. - IV.
sibilans Hal.	v. - V.
silacea Lw.	Fr. - X.
stagnalis Fll.	v. - III. bis VII.
Stenhammari Z.	Fr. - XI. XII. II.
subguttata Mg.	Str.

Scatophila Bck.

caviceps Stenh.	Fr. - X.
cribrata Stenh.	v. - X.

Caenia R-D.

fumosa Stenh.	Str. Rw. An Blüten v. Carex stricta - II. III.
palustris Fll.	Str. Rw. An Blüten v. Carex stricta - II. III.

Tichomyza Mcq.

fusca Mcq.	Str. Früher an Aborten gemein, verschwindet durch Spülung
------------	---

DrosophilinaeAulacigaster Mcq.

rufitarsis Mcq.	Str. Fr. An Ausfluß von Robkassanie, Ahorn - V. VI.
-----------------	---

Periscelis Lw.

annulata Fll.	Str. Fr. Ausfluß von Ahorn - VI. Str.
---------------	---------------------------------------

Winnertzi Egg.Phortica Schin.

variegata Fll.	v. h. Lästig in Wäldern, fliegt vor dem Gesicht umher, oft in die Augen. V. bis VIII.
----------------	---

Stegana Mg.

curvipennis Fll.	Str.
------------------	------

Asteia Mg.

concinna Mg.	Str. - VII.
--------------	-------------

Leucophenga Mik.

maculata Ruf.	v. - VII.
---------------	-----------

Drosophila Fll.

confusa Steag.	Str.
fasciata Mg.	Fr. - VII.
fenestrarum Fll.	v. h. - VI. bis X.
funebis Fbr.	v. - VI.
melanogaster Mg.	v. h. - VIII.
obscura Fll.	v. - II.
phalerata Mg.	v. - IV. VIII.
rubrostriata Bck.	Fr. Traß in Freiburg 1922 in den 3 Enden d. Stadt in gr. Mengen auf VII. - X. zeigte sich IX. 1923 wieder, 1906 zuerst beschrieben von den Banaren, 19 in Paris beob.

transversa Fll.	v. - X.
tristis Fll.	Str.

Scaptomyza Hardy

flaveola Mg.	v. h. - VI. bis VIII. X. bis I.
griseola Z.	v. - VI.

Camilla Hal.

glabra Fll.	Fr. - VI.
-------------	-----------

GeomyzinaeDiastata Mg.

costata Mg.	v. - VIII.
-------------	------------

Geomyza Fll.

marginella Fll.	Str.
-----------------	------

Tryptochaeta Rond.

obscuripennis Mg. K. — IV.
punctum Mg. Str.

Opomyza Fll.

florum Fbr. v. — VIII.
germinationis L. v. h. — VI. bis IX.

Balioptera Lw.

bimaculata Mg. Fr. — X.
combinata L. v. h. — III. bis VIII.
tripunctata Fll. v. — III. VI. bis VIII.
venusta Mg. v. — VIII.

Anthomyza Fll.

albimana Mg. Fr. — VII.
gracilis Fll. Str.
sordidella Z. Str.

OchthiphilinaeOchthiphila Fll.

aridella Fll. v. — VII.
geniculata Z. Str.
juncorum Fll. v. — IV.
polystigma Mg. v. — VI.

Acrometopia Schin.

Wahlbergi Z. Str.

MilichinaePhyllomyza Fll.

securicornis Fll. Fr. — VI.

Desmometopa Lw.

M. atrum Mg. Str.
M. nigrum Mg. Koe.
sordidum Fll. Koe.

Meoneura Rond.

obscuralla Fll. Str.

Madiza Fll.

glabra Fll. Fr. — X. bis II.

AgromyzinaeAgromyza Fll.

abiens Z. Fr. — VIII.
aeneiventris Fll. Str.
atra Mg. Str.
carbonaria Z. v. — VII.
cirsi Rond. Str.
errans Mg. Str.
geniculata Fll. v. — IV. XII.
gyrans Fll. Str.
lutea Mg. Fr. — VII.
maura Mg. Str.
morionella Z. v. — VI.
pectinata Mg. v. — IX.
pusilla Mg. v. — IV.
reptans Fll. v. — VI.
Schineri Gi. Str.
scutellata Fll. Str.
signata Mg. Str.
vagans Fll. v. — IV.

Domomyza Rond.

nigripes Schin. v. — V.

Ceratomyza Schin.

acuticornis Mg. v. — VIII.
denticornis Schin. v. — VII.

Selachops Wahlb.

flavocincta Wahlb. v. Rw. M. — IV. V.

PhytomyzinaePhytomyza Fll.

affinis Fll. v. — VII.
albiceps Mg. Fr. — VI.
annulipes Mg. Fr. — III.
elegans Mg. Str.
flava Fll. v. — X.
flavicornis Fll. Str.
flavoscutellata Fll. v. — V.
geniculata Mcq. v. — VI.
lateralis Fll. v. — IX.
maculipes Z. v. — X.
nigripennis Fll. v. — IV.
obscurella Fll. v. — III.
praecox Mg. Str.
pullula Z. v. — V.

ConopidaeConopinaeConops L.

flavipes L. v. — VII. bis IX.
quadrifasciata Deg. v. — VII. VIII.
scutellata Mg. v. — VII bis IX.
strigata Wied. v. — VII. VIII.
vesicularis L. Str. Rüppur v. G.

Physocephala Schin.

nigra Mg. Allerheiligen v. G.
rufipes Fbr. Griesbach im
Rendtal v. G.
vittata Fbr. v. — VI. bis IX.

Brachyglossum Rond.

capitatum Lw. v. — VIII. IX.
coronatum Rond. v. — VI. bis IX.

Conopilla Rond.

ceriaeformis Mg. Vg. Sw. — VIII. IX.

MyopinaeMyopa Fbr.

buccata L. v. — III. bis V.
dorsalis Fbr. Maxau v. G.
fasciata Mg. Fr. Re. — VIII.
occulta Wied. Fr. Re. — VII.
picta Pz. Fr. — V.
stigma Mg. Fr. — V.
testacea Pz. v. — III. bis VI.

Occemyia

atra Fbr. v. — VI. VII.
distincta Wied. Str. — VI.
pusilla Mg. v. — VII.
Sundewalti Z. v. — VI.

Zodion Latr.

cinereum Fbr. v. — VI.

Sicus Scop.

ferrugineus Mg. v. h. — VI. bis IX.

Dalmanina R-D.

flavescens Mg. Fr. Aus Halictus-
bauten gezogen
Legewie — V.
punctata Fbr. E. Kr. v. G.

Gr. IX. Schizophora pupipara
Hippoboscidae
Hippobosca L.

equina L.

v.

Ornithomyia Latr.

avicularia L.

v. Von Nestkuk — VI.

Lipoptena Ni.

cervi L.

v. h. Fliegt ins

Crataerrhina v. Olf.

pallida Latr.

Braulidae
Braula Ni.

Coeca Ni.

Gesicht, verbirgt sich im Haar — IX. X.

Fr. An Apus Apus gefangen.

v.

Insekten der badischen Fauna.

I. Beitrag.

Von Karl Stroh m., Freiburg i. Br.

Das primäre Ziel, welches sich die Bad. Ent. Vereinigung gesteckt hat, ist bekannt und durch den Untertitel der „Mitteilungen“ besonders hervorgehoben: die Erforschung der Insektenfauna des Oberrheins und der angrenzenden Gebiete. Die unter obigem Titel hier folgenden Beobachtungen betreffen unser engeres Heimatland und stellen einen bescheidenen Beitrag zu diesem Ziele dar. Neben der Aufnahme der Orthopteren und Odonaten habe ich mich in letzter Zeit besonders mit Apiden befaßt und nebenher auch anderen Hautflüglern einige Aufmerksamkeit geschenkt. In Verfolgung des oben bezeichneten Zieles beschränke ich mich nun nicht darauf, lediglich die bemerkenswerten Arten anzuführen, sondern nehme auch die gemeineren in das Verzeichnis auf, wenigstens bei jenen Insektengruppen, deren Bearbeitung noch keinen vorläufigen Abschluß gefunden hat.

Dieser „erste Beitrag“ ist im wesentlichen ein hymenopterologischer, und innerhalb dieses Gebietes waren es in erster Linie die Apiden, mit welchen ich mich vorwiegend beschäftigte; es hat sich dabei erneut gezeigt, daß unser Badener Land über einen außerordentlichen Reichtum an Bienen verfügt, und daß sich bei längerer, aufmerksamer Sammeltätigkeit noch manches entdecken läßt, trotzdem sich manche Biene infolge ihrer Seltenheit oder der verborgenen Lebensweise leicht den Blicken des Beobachters entziehen kann. Unter den aufgefundenen neuen Arten befinden sich wieder eine ganze Anzahl von Tieren, welche als fremdländische Gäste aus dem Süden oder Südosten Europas angesprochen werden dürfen. Zum Teil sind dieselben — soweit ich aus der Literatur darüber unterrichtet bin — aus Deutschland noch nicht bekannt. Folgende Arten verdienen aus diesen Gründen besonders hervorgehoben zu werden: *Prosopis styriaca* Först., *Prosopis Dukei* Alfken, *Prosopis clypearis* Schck., *Andrena franconica* Stöckhert, *Andrena decipiens* Schck., *Andrena sparsiciliata* Alfken, *Macrocera ruficornis* Fabr., *Osmia tridentata* Duf. et Pér., *Osmia versicolor* Lep., *Osmia andrenoides* M. Spin., *Megachile apicalis* M. Spin., *Megachile pilidens* Alfken, *Megachile melanopyga* Costa, *Psithyrus bohemicus* Seidl., *Stelis nasuta* Ltr., *Coelioxys mandibularis* Nyl., *Coelioxys acuminata* Nyl. Abgesehen davon, weist die jetzige Bienenliste eine Anzahl weiterer für Baden neue Art auf. Gerade in diesem Jahre lernte ich erfahren, wieviel Geduld und auch Zeit dazu gehört, um nur über die Verteilung der einzelnen Bienenarten in unserem Gebiet ein einigermaßen vollständiges Bild zu gewinnen.

Im Verhältnis zu diesem erwähnten Verzeichnis der Apiden sehen die übrigen Listen über Hautflügler in diesem Beitrag zum Teil noch recht mager aus; es bedarf eben einer besonderen Konzentration nach einer bestimmten Richtung und der Kenntnis der Lebensweise der einzelnen Arten,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Badischen Entomologischen Vereinigung Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1923-1924

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Die Dipteren des Oberrheins 197-204](#)