

Oberoligozäne Gliridae (Rodentia, Mammalia) aus der süddeutschen Faltenmolasse

Von THEODOR VOLLMAYR, Memmingen¹⁾

Mit 1 Abbildung, 1 Tabelle und Tafeln 7—9

Zusammenfassung

Es wird über die Gliridae aus zwölf oberoligozänen Fundstellen in der Faltenmolasse des Allgäus und des westlichen Oberbayern berichtet. Von den verschiedenen Resten des Genus *Gliravus*, welche besonders aus dem tieferen Teil des Chattiums geborgen wurden, verdient *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB Interesse, weil hier zum Typusschädel passende untere Zähne gefunden wurden. Verschiedene ursprünglichere *Gliravus*-Arten sind noch ungenügend belegt. Verhältnismäßig häufig kommen ein kleinerer und ein größerer Verwandter des *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG) besonders im mittleren und oberen Teil des Chattiums vor. Ein hoch im Oberoligozän gelegener Fundpunkt lieferte Reste von *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN.

Summary

Gliridae are reported from twelve Upper Oligocene (= Chattium) localities in the region of the folded Molasse of Allgäu and Western Oberbayern. *Gliravus* had been washed out especially of the lower parts of the Chattium; *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB is interesting, because lower molars can be described which fit in size and structure to the upper molars of the type skull. Some more primitive species of *Gliravus* are still insufficiently represented. In the middle and upper part of the Chattium, a smaller and a bigger relative of *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG) are not rare. A locality of the uppermost Chattium procured remains of *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN.

Inhalt

Vorwort	66
A. Arbeitsmethoden	66

¹⁾ Dr. TH. VOLLMAYR, Gewerkschaft Elwerath, Geol. Büro, 894 Memmingen, Zangmeisterstraße 24.

B. Fundpunkte	67
I. Bemerkungen zur stratigraphischen Zuordnung	67
II. Textabkürzungen und Bemerkungen	69
III. Einzelbeschreibung der Fundpunkte	69
C. Paläontologischer Teil	73
I. Bezeichnungen bei der Beschreibung der Stücke	73
II. Vorbemerkung zur Nomenklatur	73
III. Genus <i>Gliravus</i>	74
IV. Genus <i>Peridyromys</i>	83
V. Genus <i>Microdyromys</i>	100
VI. Genus inc.	103
Literaturverzeichnis	104
Tafelerläuterungen	106

Vorwort

Durch eine Anregung von Herrn Dr. Zöbelein wurde ich während meiner Kartierungsarbeiten in der Allgäuer Faltenmolasse in den Jahren 1951—1953 auf verschiedene Säugetierfundpunkte aufmerksam. Herr Dr. Breyer und Herr Dr. Roll ermöglichten mir durch die finanzielle Unterstützung der Erdölgesellschaften Preußag und Gewerkschaft Elwerath, die meisten dieser Fundpunkte auszubeuten. Das Rohmaterial wurde der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie in München überlassen und dort z. T. unter Aufsicht von Herrn Dr. Zöbelein, z. T. von mir geschlämmt und ausgelesen. Ein zweiter Teil des bearbeiteten Materials wurde von Herrn Dr. Zöbelein im Allgäu und in Oberbayern an der Ammer gesammelt und für die Bearbeitung vorbereitet.

Bei der Bearbeitung der Funde durfte ich stets den Rat und die Hilfe von Herrn Professor Dr. Dehm erfahren. Herr Dr. Hürzeler hat mir die vielen Materialien des Naturhistorischen Museums in Basel zum Vergleich zugänglich gemacht. In Lyon konnte ich dank der Hilfe von Herrn Professor Dr. Mein und von Frau Huguency die für diese Arbeit erforderlichen Vergleichstücke einsehen. Herr Professor Dr. Lavocat gestattete mir in Paris liegende Stücke aus St. Gérand zu fotografieren. Herr Professor Dr. Heller zeigte mir in Erlangen Originalien aus dem Altpleistozän. Herrn Dr. Fahlbusch verdanke ich Diskussionsanregungen und sonstige Hilfe. Es liegt mir sehr daran, mich für die viele Hilfe, die ich erfahren durfte, herzlichst zu bedanken. Insbesondere bin ich Herrn Professor Dr. Dehm und Herrn Dr. Zöbelein sehr zu Dank verpflichtet, da mir gestattet wurde, außer über die Gliridae meiner Aufsammlungen auch über diejenigen der von Herrn Dr. Zöbelein vorbereiteten Fundorte zu berichten.

A. Arbeitsmethoden

Die Menge der einzelnen Proben betrug jeweils zwischen etwa 50 und 400 kg und war abhängig z. T. von der Ausdehnung der fossilführenden Linsen, meist jedoch nur vom Grad der zu überwindenden Schwierigkeiten. Das Roh-

material, meist grauer Mergelstein, wurde in München getrocknet und in zwei Fraktionen geschlämmt. Dabei wurde eine grobe Fraktion durch vorsichtiges Auf- und Abschütteln in einem teilweise wassererfüllten Schaff abgetrennt. Der dabei erhaltene Feinrückstand wurde unter leicht aufgedrehter Wasserbrause durch ein feines Sieb geschlämmt. Dieser Vorgang des Trocknens und Schlämmens wurde mehrfach wiederholt, bis die Rückstände genügend klein geworden waren, um ausgelesen zu werden.

Die Abbildungen der beigegebenen Tafeln sind z. T. retuschierte halb-belichtete Fotos, zum anderen Teil Stereopaare. Außer Taf. 8, Fig. 4, 9 und 12 sind alle Fotos durch ein Zeiss-Jena-Stereomikroskop mit Objektiv $2,5\times$ und Projektiv $4\times$ aufgenommen, die retuschierten Einzelaufnahmen durch den linken Einblick. Als Kamera diente bei den Stereopaaren eine Praktina II A, bei den Einzelfotos eine Exacta Varex. Die Vergrößerung auf 20fach wurde bei den Stereopaaren mittels eines links-rechts orientierten Objektmikrometers durch einen Liesegang-Vergrößerungsapparat Unirax II mit Objektiv Corygon ($F = 7,5$ cm), bei den Einzelaufnahmen durch einen Adjutar-Vergrößerer mit Helioplan-Objektiv durchgeführt. Die Stereopaare dürften mit weitgehender Genauigkeit in ihrer Vergrößerung übereinstimmen. Bei den Einzelaufnahmen sind Unterschiede bis zu 2% möglich. Fig. 4, 9 und 12 der Taf. 8 wurden mit einem Zeiss-Stereomikroskop II aufgenommen und mit dem Liesegang-Vergrößerungsapparat vergrößert.

Die angegebenen Maße wurden mit einem Leitz-Stereomikroskop durch Okularmikrometer im rechten Einblick entnommen. Gemessen wurde die größte Kronenlänge und -breite. Die Angaben sind in Millimetern gegeben, und zwar zuerst die Länge, dann die Breite. Bei der Beschreibung wurden die nur in Einzelbildern dargestellten Stücke besonders eingehend berücksichtigt.

Das gesamte hier behandelte Material befindet sich in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie in München.

B. Fundpunkte

I. Bemerkungen zur stratigraphischen Zuordnung

In dieser Arbeit wird der von ZÖBELEIN (1952 a u. b, 1955 und 1958) auf Grund von Landschneckenbestimmungen als chattisch angegebene Teil der Unteren Süßwassermolasse behandelt. Die Obergrenze ist durch die nach Landschnecken bestimmte Grenze zwischen Chattium und Aquitanium definiert und wird übernommen. Dabei kann zu dieser Grenze zunächst hier kaum ein säugetierpaläontologischer Diskussionsbeitrag geliefert werden. Im Allgäu ist die Chatt/Aquitane-Grenze in der Horn- und Salmaserschuppe erschlossen. Dagegen führt die Steineberg- bzw. Murnauer Mulde an ihrer Basis die Bausteinschichten und damit die Untergrenze des hier betrachteten tieferen Teils der Unteren Süßwassermolasse. Die stratigraphische Verknüpfung von Steinebergmulde und Hornschuppe ist im Allgäu sehr schwierig durchzuführen. Sie stützt sich bis-

her nur auf einige Indizien, den Farbumschlag der Mergelsteine von unten vorherrschendem Braunrot zu oben vorherrschendem Grüngrau sowie das Einsetzen von *Ferussina tricarinata* M. BRAUN (ZÖBELEIN 1958). Der Verfasser neigt jetzt dazu, diese Grenze zwischen Alt- und Jungchatt in der Steinebergmulde höher anzunehmen als 1958 (VOLLMAYR 1958).

Die hier behandelten Fundpunkte des Ammerprofils lassen sich dagegen leicht gegenseitig stratigraphisch zuordnen (ZÖBELEIN 1952 a u. b). Die Verknüpfung der Grenze zwischen Alt- und Jungchatt vom Westallgäu zum Ammerprofil ist nicht gesichert.

Nach ZÖBELEIN 1952 a (Lageplan) werden alle behandelten Fundpunkte zunächst als chattisch betrachtet. Allerdings lieferten zwei Zähne (Nr. 1949 XXV

Tab. 1: Schema der stratigraphischen Zuordnung der Fundpunkte oberoligozäner Gliridae in der süddeutschen Faltenmolasse (z. T. nach ZÖBELEIN 1952a, Lageplan).

Aquitanium	Allgäu				Oberbayern		Ammer (Rottenbucher Mulde)				
	Allgäu	Sal- mase- schuppe	Horn- schuppe	Steine- berg- mulde	versch. Fund- punkte	Rotten- bucher Mulde		Mur- nauer Mulde			
Jungchattium	Untere Süßwassermolasse, unterer Teil (einschl. Konglomeratzone)	Weißbachschichten	Pfarr- Alpe	Tal- Holz	Gschwender T. II Gschwender T. I	(Zuordnung schwierig; jetzt bevorzugte Lösung:)	Fall- Tobel	Rotten- buch	Schin- del- wies- graben	Bereich brak- kischer und mariner Ein- schaltungen	Obere Bunte Molasse z. T.
Rupelium ~ Althattium	Untere Meeress- molasse								Schleif- mühle II	rötliche	
									Schleif- mühle I		Untere Meeres- molasse

1 u. 2; in vorliegender Arbeit nicht abgebildet) eines *Suevosciurus* sp. aus dem Echelsbacher Flöz an der Rottenbacher Ammerbrücke den Hinweis, daß wohl auch die höheren Bausteinschichten (ZÖBELEIN 1962, 262) und mindestens ihr unmittelbar Hangendes ins Rupelium (oder tiefer) eingestuft werden müssen.

II. Textabkürzungen und Bemerkungen

- Grbl. 8426 (855) = Gradabteilungsblatt 1:25 000 Nr. 8426
(Positionsblatt 1:25 000 Nr. 855)
Rw. = Rechtswert des Gauß-Krüger-Netzes
Hw. = Hochwert des Gauß-Krüger-Netzes
Fp. = Fundpunkt
(SGP 11 = SP 44) = (Alte Fundpunktbezeichnung, Feldbuchbezeichnung)
MH = Meereshöhe

Einschlägige Gradabteilungsblätter:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 8327 Buchenberg | 8231 Peiting |
| 8426 Oberstaufen | 8331 Bayersoien |
| 8427 Immenstadt | |

Die Fundpunkte Fall-Tobel, Schleifmühle I und II, Schindelwies-Graben und Rottenbuch wurden von Herrn Dr. ZÖBELEIN aufgefunden, ausgebeutet und zur Bearbeitung vorbereitet. Der Fundpunkt Pfarr-Alpe ist durch den Verfasser aufgesammelt, geschlämmt und ausgelesen worden. Die Fundpunkte Gschwender Tobel I und II, Steine-Berg I, II und III und Tal-Holz wurden im Gelände vom Verfasser, im Institut von Herrn Dr. ZÖBELEIN zur Bearbeitung vorbereitet.

III. Einzelbeschreibung der Fundpunkte

a) Tal-Holz

Grbl. 8426 (855); Rw. 3580.675; Hw. 5268.015. — Südlich Knechtenhofen, Bach westlich „H“ von „Tal-Holz“, 930 m MH, linke Bachseite, unten; ca. 60 m bergrecht unter der ersten Nagelfluhbank. — (SGP 11 = SP 44). — Hornschuppe; oberste Weißbachschichten. —

Fp. 33 bei ZÖBELEIN in VOLLMAYR 1958 (S. 49).

Gliravus majori STEHLIN & SCHAUB: M^{1/2} re. (1952 XII 17); M^{1/2}, wohl M¹ re., Außenrand abgebrochen (1952 XII 18); M₃ li. (1952 XII 14); M₃ li. (1952 XII 15); M_{2/3}, wohl M₃ re., beschädigt (1952 XII 16).

Gliridae, spec. inc. subfam. (vermutlich: *Gliravus* cf. *priscus* STEHLIN & SCHAUB): M_{1/2}, wohl re. (1952 XII 13).

b) Gschwender Tobel I

Grbl. 8427 (855); Rw. 3588.355; Hw. 5270.045. — Gschwender Tobel, 885 m HM, linker Hang auf halber Höhe; ca. 30 m bergrecht über der vierten

Nägelfluhbank über dem Weg zum Gschwender Hof. Stumpfgraue Mergel. — (SGP 3 = SP 15). — Hornschuppe, Steigbachschichten.

Fp. 26 bei ZÖBELEIN in VOLLMAYR 1958 (S. 48).

Peridyromys? praemurinus nov. subsp. A: $M_{1/2}$, wohl M_1 re. (1952 XII 23); $M_{1/2}$, wohl M_2 re. (1952 XII 25); P^4 li., etwas beschädigt (1952 XII 21).

Peridyromys? spec. indet.: $M_{1/2}$ re., Kronenbruchstück (1952 XII 26); $M^{1/2}$ re., Außenteil abgebrochen (1952 XII 22).

Gliridae, spec. inc. subfam.; M^1 oder P^4 re., wohl P^4 re. (1952 XII 20).

Peridyromys? spec. indet.: M_3 li. (1952 XII 24).

Peridyromys? spec. indet.: oberer Backenzahn, wohl P^4 li. (1952 XII 19).

c) Gschwender Tobel II

Grbl. 8427 (855); Rw. 3588.110; Hw. 5270.070. — Linker Nebenbach des Gschwender Tobels, ca. 900 m MH; unmittelbar unter Moräne. — (SGP 4 = SP 20). — Hornschuppe, Steigbachschichten.

Fp. 23 bei ZÖBELEIN in VOLLMAYR 1958 (S. 47 u. 48).

Gliravus nov. spec. aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB?: P^4 li. (1952 XII 28).

Peridyromys? nov. spec. B: $M^{1/2}$ li., labial abgebrochen (1952 XII 27).

d) Pfarr-Alpe

Grbl. 8426 (855); Rw. 3585.500; Hw. 5272.120. — Thaler Höhe, von P. 1093,3 nach Norden fließender Bach; linke Bachseite. Ca. 10 cm mächtige Lage blaugrauer Mergel zwischen ockerfarbenen Mergeln. — (SP 111). — Salmaser-schuppe, obere Steigbachschichten.

Peridyromys? spec. indet.: $M^{1/2}$, wohl M^2 li., Hinterrand abgebrochen (1952 XII 35); $M_{1/2}$, wohl M_2 li., innen stark abgekaut (1952 XII 29); $M^{1/2}$, wohl M^1 li., stark abgekaut (1952 XII 34); P^4 oder M^1 , wohl P^4 re., stark abgekaut (1952 XII 30); M^3 re. (1952 XII 38).

Microdyromys koenigswaldi DE BRUIJN: $M^{1/2}$ re., wohl M^1 re. (1952 XII 33); M^2 re. (1952 XII 31); $M^{1/2}$, wohl M^2 re. (1952 XII 32).

Microdyromys koenigswaldi DE BRUIJN?: P^4 re. (1952 XII 36); M^3 li. oder P^4 re., vermutlich M^3 li. (1952 XII 37).

e) Steine-Berg I

Grbl. 8427 (856); Rw. 3589.145; Hw. 5266.275. — Steine-Berg, Nordwestgrat, 1410 m MH., ca. 100 m östlich des Grates; ca. 3 m unter der hangenden Nägelfluhbank. Graublauer Mergel. — (SGP 16 = SP 50). — Steinbergmulde, Nordflügel, Weißbachschichten.

Fp. 46 bei ZÖBELEIN in VOLLMAYR 1958 (S. 52).

Gliravus spec. indet.: M^{1/2} oder P⁴ re. (1952 XII 2); oberer Backenzahn, vermutlich M³ re. (1952 XII 4).

Gliravus spec. indet.: M^{1/2} re. oder P⁴ li., vermutlich P⁴ li. (1952 XII 5).

Peridyromys? praemurinus nov. subsp. A?: M² li. (1952 XII 3).

f) Steine-Berg II

Grbl. 8427 (856); Rw. 3589.220; Hw. 5266.230. — Steine-Berg, Nordwestgrat, 1475 m MH; Mitte des zweiten Mergelbandes über Steine-Berg I. Graue Mergel. — (SGP 17 = SP 45). — Steinebergmulde, Nordflügel; vermutlich hohe Weißbachschichten.

Fp. 45 bei ZÖBELEIN in VOLLMAYR 1958 (S. 52).

Gliravus nov. spec. aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB?: P⁴ li. (1952 XII 7).

Peridyromys? praemurinus (FREUDENBERG); M₁ re. (1952 XII 6).

g) Steine-Berg III

Grbl. 8427 (856); Rw. 3589.330; Hw. 5266.195. — Steine-Berg, Nordwestgrat, 1500 m MH., ca. 100 m östlich des Grates; viertes Mergelband über Steine-Berg I; ca. 1 m unter der hangenden Nagelfluh. Kohlige Lage mit Knochensplittern. — (SGP 18 = SP 49). — Steinebergmulde, Nordflügel, vermutlich hohe Weißbachschichten.

Fp. 44 bei ZÖBELEIN in VOLLMAYR 1958 (S. 51 f.).

Es sei hier darauf hingewiesen, daß dieser Fundpunkt in VOLLMAYR 1958 Taf. 1 versehentlich falsch eingetragen wurde und ca. 1 mm südöstlich des dortigen Fundpunktes 45 einzutragen wäre.

Gliravus spec. indet.: M³ re. (1952 XII 11).

Gliravus majori STEHLIN & SCHAUB?: M^{1/2} li., Kronenbruchstück (1952 XII 12).

h) Fall-Tobel

Grbl. 8327 (828); Rw. 3591.750; Hw. 5276.790. — Fall-Tobel westlich Niedersonthofen, 785 m MH, rechtes Ufer. Sandiger grüngrauer Mergel mit Landschnecken. — (ZÖBELEIN A 24 a). — Hauchenbergmulde, gestörter Südflügel; Steigbachschichten, wahrscheinlich tiefes Niveau.

Nr. 23 in ZÖBELEIN 1955, S. 389.

Gliravus nov. spec. aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB: M^{1/2} re. 1951 XXIV 1).

Peridyromys? praemurinus nov. subsp. A: M₂ re. (1951 XXIV 4); M^{1/2} re (1951 XXIV 3); M³ re (1951 XXIV 2).

i) Schleifmühle I

Grbl. 8231 (806); Rw. 4422.440; Hw. 5285.430. — Ammer, linkes Ufer, 30 m nördlich des Grabens, der von Kälberschwaig kommend 150 m nördlich

Schleifmühle mündet. Dunkles Mergelband südlich einer Sandsteinfolge. — (ZÖBELEIN 113 d). — Murnauer Mulde, Nordflügel; Untere Bunte Molasse, rötliche Abteilung. Recht tiefes Unterchatt.

Peridyromys? nov. spec. B; M₃ re (1951 XXIII 1).

j) Schleifmühle II

Grbl. 8231 (806); Rw. 4422.440; Hw. 5285.370. — Ammer, linkes Ufer; 5 m südlich des Grabens, der von Kälberschwaig kommend 150 m nördlich Schleifmühle mündet. Aus grüngrauem, 1–2 m über dem Ammerspiegel gelegenen Mergel mit Landschnecken und Schneckenbruchstücken. — (ZÖBELEIN 112 c). — Murnauer Mulde, Nordflügel; Untere Bunte Molasse, rötliche Abteilung. Recht tiefes Unterchatt.

Gliravus cf. *priscus* STEHLIN & SCHAUB; M₃ re, stark beschädigt (1951 XXIII 4).

Gliravus nov. spec. aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB?; M_{1/2}, wohl M₂ li, sehr stark beschädigt (1951 XXIII 3).

k) Schindelwies-Graben

Grbl. 8331 (834); Rw. 4424.370; Hw. 5282.200. — Ammer, rechtes Ufer, gleich südlich des Schindelwies-Grabens. Aus dunklen Mergelbändern mit Land- und Süßwasserschnecken. — (ZÖBELEIN 50 b). — Murnauer Mulde, Südflügel; Untere Bunte Molasse, Grenze zwischen rötlicher und grüngrauer Abteilung (= Grenze Altchatt/Jungchatt).

Gliravus cf. *robiacensis* HARTENBERGER: M₁ li (1951 XXIII 7); wohl P⁴ re, beschädigt (1951 XXIII 10).

Peridyromys? *praemurinus* (FREUDENBERG): M₁ li (1951 XXIII 11).

Peridyromys? nov. spec. B: M_{1/2} li (1951 XXIII 12); M₃ re (1951 XXIII 5); P₄ li (1951 XXIII 9); M^{1/2}, wohl M¹ re (1951 XXIII 8).

Peridyromys? nov. spec. B? : M^{1/2} li, Vorderteil abgebrochen (1951 XXIII 6).
Gliridae, spec. inc. subfam.: M_{1/2} re, Innenteil abgebrochen (1951 XXIII 13).

l) Rottenbuch

Grbl. 8231 (806); Rw. 4422.500; Hw. 5289.650. — Ammer, linker Steilhänge östlich Moos bzw. 550 m nordnordwestlich der Kirche von Rottenbuch (Fundpunkt 20 in ZÖBELEIN 1952 a, Lageplan).

Aus einer damals 0,5 m breiten Nische (Ruschelzone) in grüngrauen Mergeln. — Rottenbucher Mulde, Nordflügel; tiefste Obere Bunte Molasse. Höchstes Jungchatt.

Peridyromys? *praemurinus* nov. subsp. A: M₁ re (1949 XXV 4).

C. Paläontologischer Teil

I. Bezeichnungen bei der Beschreibung der Stücke

Die Bezeichnung der Grate und Höcker wurde von STEHLIN & SCHAUB 1951 übernommen und nach DE BRUIJN 1966 ergänzt.




Abb. 1: Bezeichnung der Grate und Höcker bei Gliriden-Molaren.

Bezeichnungen wie „innen“, „außen“ oder „vorne“ beziehen sich auf die Orientierung im Tierkörper. Davon weicht nur die Bezeichnung „hoch aufragend“ bzw. „tief eingeschnitten“ bei den oberen Zähnen ab, welche sich auf das Relief, also auf das im Mikroskop zu beobachtende Kronenbild bezieht.

Die Orientierung erfolgt bei den Figuren so, daß vorne, soweit bekannt, nach oben gerichtet ist.

Die Stücke werden durch ihre Inventar-Nummern der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie München bezeichnet.

II. Vorbemerkung zur Nomenklatur

Über die oligozänen Gliridae wurde bisher in der Literatur wenig bekannt. Das unveröffentlichte Material des Naturhistorischen Museums in Basel, welches dem Verfasser durch das großzügige Entgegenkommen von Herrn Dr. Hürzeler zum Vergleich zur Verfügung stand, lehrt, daß ein großer Teil der Stammlinien

des Miozäns im Chattium bereits bestand und daß im Chattium bereits mit einem großen Formenreichtum gerechnet werden muß. Der Wert der hier beschriebenen Fundpunkte besteht darin, daß sie aus dem stratifizierten Bereich stammen. Ein Nachteil ist ihre Fossilarmut, welche bei hohem Materialdurchsatz verhältnismäßig wenig Ausbeute liefert. Aus Spaltenfüllungen darf man sich wohl mit Recht reichere Funde und vollständiger erhaltene Exemplare erhoffen. Mit der Benennung der neuen Arten sollte daher gewartet werden, bis geeignete vollständigere Stücke oder allermindestens bis durch große Individuenzahl gesicherte Kenntnisse vorhanden sind.

III. Genus *Gliravus* STEHLIN & SCHAUB

a) *Gliravus* cf. *robiacensis* HARTENBERGER

Taf. 8, Fig. 6 (Stereo), 7 (Stereo)

cf. 1966. *Gliravus robiacensis* nov. sp. — HARTENBERGER 1966, 327, Abb. 1 u. 2.

Fundpunkt Schindelwies-Graben

Nr. 1951 XXIII 7 (Taf. 8, Fig. 7 Stereo):

1,09 × 1,18 mm; M₁ li. Bewurzelung nur sehr undeutlich erkennbar. Beschädigte Ansätze vermutlich zweier quergestreckter hintereinander gelegener Wurzeln. Kronenoberfläche stark bis mäßig konkav. Gerundet trapezoidischer, vorne verschmälertes Umriß. Das Labialende des Paraconid-Grats ist verbreitert und vom Protoconid durch eine Furche getrennt. Bevor sich der Paraconid-Grat dem Metaconid verbindet, erhebt sich seine verschmälerte Kante schwach. Er ist dort an seinem Hinterabhang rau und verstärkt. Das Protoconid ist eine sehr kräftige leicht vorwärts geschwungene Keule, die mit schmalen kantigem, jedoch am Hinterabhang verstärktem Grat dem kronenwärts gelegenen Hang des Metaconids verbunden ist. Das Metaconid ist eine sehr hoch aufragende und alle anderen Höcker weit überragende Spitze, deren hintere wulstige gerundete Kante schräg zur Mittelfurche abfällt. Das Mesoconid ist ein schmales tiefes Grätchen, jedoch sehr deutlich. In rauhen niederen breitflächigen Anschwellungen setzt es sich diffus zur hinteren Kronenmitte und in Richtung des hinteren Metaconid-Abfalls fort. Das Entoconid ist ein ovaler kräftiger Knoten. Ihm ist hinten unten der Hypoconid-Grat schmal verbunden, welcher über einen Dentindurchbruch, der eventuell das Hypoconulid vertritt, zum kräftigen nach vorwärts gebogenen Hypoconid führt.

Der vorliegende M₁ stimmt in seiner Größe und im Vorhandensein des kurzen Mesoconids mit *Gliravus robiacensis* HARTENBERGER überein. Jedoch sind die zu diesem Stück passenden oberen Zähne nicht genügend belegt. Bemerkenswert sind beim vorliegenden M₁ die sehr kräftige Ausbildung der Höcker und daß das Entoconid mit dem Hypoconid-Grat relativ gut verwachsen ist.

Mit Vorbehalt wird hier ein oberer Zahn vom gleichen Fundpunkt abgeschlossen und als P⁴ gedeutet.

Nr. 1951 XXIII 10 (Taf. 8 Fig. 6 Stereo):

0,82 × ca. 1,04; wohl P⁴ re; beschädigt. Bewurzelung ausgebrochen. Kronenoberfläche konkav. Gerundet rechteckiger Umriß, vorne innen etwas verschmälert. Vom sehr kräftigen, wulstig etwas längs ausgezogenen Protoconus gehen, zur Kronenmitte

sich verjüngend, weiter nach außen sich wieder verstärkend, Paracon- und Metacon-Grat aus, welche außen in die ursprünglich wohl kräftigen bis sehr kräftigen, nur noch in geringen Resten erhaltenen Höcker des Paraconus und Protoconus einmünden. Vom Paraconus läuft eine Kante nach schräg hinten abwärts, um sich dort in einem Mittelgrätchen fortzusetzen, welches sich kaum aus dem Trigonum-Lumen erhebt. Die äußere Hälfte des Vordercingulums ist abgebrochen. Innen findet das Vordercingulum noch vor Erreichen des Innenrandes sein Ende, wo es sich allmählich flacher und schmaler werdend dem inneren Vorderrand des Zahnes anpaßt. Das Schlußcingulum ist dem Metacon-Grat angeheftet, wo dieser in den Metaconus übergeht. Es ist lingual sehr schwach verstärkt und endet kurz vor Erreichen des Innenrandes frei.

Das Trigonum ist bedeutend höher als Vorder- und Schlußcingulum und das Schlußcingulum zeigt keine nennenswerte linguale Verstärkung. Diese vom Typus der Art abweichende Ausbildung wäre bei einem P⁴ möglich. Die ursprünglich wohl sehr kräftigen Außenhöcker würden zur Ausbildung des M₁ Nr. 1951 XXIII 7 (S. 74, Taf. 8, Fig. 7) passen. Daß der Mittelgrat mit dem Para-, nicht mit dem Metaconus verbunden ist, kann eine für die P⁴ geltende Besonderheit sein.

b) *Gliravus* cf. *priscus* STEHLIN & SCHAUB
Taf. 7, Fig. 15 (Stereo)

cf. 1951. *Gliravus priscus* n. gen. n. sp. — STEHLIN & SCHAUB 1951, 299, 368, Abb. 513.

Fundpunkt S c h l e i f m ü h l e II

Nr. 1951 XXIII 4 (Taf. 7, Fig. 15 Stereo):

Ca. 0,90 × ?; M₃ re; sehr stark beschädigt. Kräftige, nach hinten abgespreizte, weitgehend erhaltene Hinterwurzel. Ansatz einer kleinen quergestreckten äußeren Vorderwurzel. Innere Vorderwurzel ausgebrochen. Die vordere Zahnwand und das Metaconid sind abgebrochen. Der Protoconid-Grat verläuft vom Metaconid aus zunächst schräg auswärts rückwärts, knickt sodann zur transversalen Richtung und weiterhin nach schräg vorwärts ab, um keulig verstärkt in das Protoconid überzugehen. Der auf seiner hinteren Seite des Schmelzes entblöbte Hypoconid-Grat besaß wohl gerundeten Verlauf. Ein trotz seiner geringen Höhe angekauert durch eine Einschnürung in zwei Erhebungen geteilter Mittelgrat beginnt lingual frei etwa im inneren Kronendrittel und läuft im äußeren Kronendrittel in ein schwach angedeutetes Grätchen aus, welches sich eventuell dem Hypoconid-Vorderhang in der Tiefe anlegt. Jedoch kann nicht ganz ausgeschlossen werden, daß es etwa den äußeren Zahnrand erreicht habe, um dort in einem Mesoconid abzuschließen.

Der stark beschädigte M₃ stimmt in seiner Entwicklungshöhe, insbesondere nach dem gegenüber *Gliravus robiacensis* HARTENBERGER langen Mesoconidgrat mit *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB (1951, 299, Abb. 513 u. 514) überein. Er ist jedoch etwas größer als dieser.

c) Gliridae, spec. inc. subfam.
Taf. 7, Fig. 1 (Stereo)

Fundpunkt T a l - H o l z

Nr. 1952 XII 13 (Taf. 7, Fig. 1 Stereo):

0,81 × 0,86; M_{1/2}, wohl re. Die Möglichkeit, daß es sich bei diesem ziemlich stark beschädigten Zahn um einen linken unteren Molaren eines der von STEHLIN & SCHAUB als „*Peridyromys murinus* POMEL“ (1951, 300, Abb. 515) beschriebenen Art verwandten Tieres handle, kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Dafür würde sprechen, daß man von den dann als Protoconid und Hypoconid aufzufassenden Erhebungen eher den hinteren als höher aufragend rekonstruieren möchte. Im übrigen sprechen jedoch die Kronenstruktur, soweit sie erhalten ist, und die Anbruchkanten des Schmelzmantels, welche Hinweise für die Rekonstruktion liefern, eher dafür, den Zahn als rechten unteren Molaren eines *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB nahe verwandten Tieres aufzufassen. Nur von dieser hier bevorzugten Annahme geht die folgende Beschreibung aus.

Stümpfe einer quergestellten hinteren und zweier vorderer Wurzeln, welche am erhaltenen Stumpf verwachsen sind, sich weiter gegen die Spitzen hin jedoch wohl trennen. Der Protoconid-Grat zeigt, obwohl die Spitze des Metaconids abgebrochen ist, noch deutlich eine völlige Verbindung mit diesem. Vom Metaconid aus läuft ein scharfkantiger Paraconid-Grat auswärts, welcher nach dem ersten Drittel der Kronenbreite schwach nach vorne abbiegt. Paraconid und Protoconid sind abgebrochen. Der verhältnismäßig gleichförmige und kräftige Protoconid-Grat ist etwas einwärts der Kronenmitte ziemlich scharf abgewinkelt und dürfte keilförmig gleichmäßig sich verstärkend in das Protoconid ausgelaufen sein. Die Bruchnarbe des Metaconids ist nach hinten verlängert, was auf ein vom Metaconid ausgehendes, wohl niedriges, den Innenrand abschließendes Grätchen hinweist. Dieses Grätchen dürfte sich langsam verflachend in der Mitte des Innenrandes sein Ende gefunden haben und kommunizierte vermutlich nicht oder höchstens durch eine seichte Verbindung mit dem Entoconid. Jedoch entsendet die Mesoconid-Leiste zum Hinterende des beschriebenen Innenrandgrätchens einen sich nach innen in zwei Stufen verflachenden, sich schlängelnden Ausläufer. Auch ein Knötchen in der Kronenmitte hinter der Mesoconid-Leiste steht mit dieser in Verbindung. Die Mesoconid-Leiste ist am kräftigsten in der Mitte und erreicht, noch relativ kräftig, fast den Außenrand; jedoch bleibt die Mesoconid-Leiste in ihrer Stärke und dadurch auch in der Erstreckung nach außen erheblich hinter Protoconid- und Hypoconid-Grat zurück. Vor dem Mesoconid-Grat befindet sich am Außenrand ein kleiner runder Pfeiler. Der größtenteils seines Schmelzbelags beraubte Hypoconid-Grat war kräftig und ist an seinem Vorderrand rundlich abgewinkelt. Sein Hinterrand dürfte als hintere Zahnwand wohl ziemlich ebenflächig ausgebildet gewesen sein. Daraus resultiert eine erhebliche keilförmige Verstärkung des Hypoconid-Grats nach außen und eine mindestens mäßig kräftige Ausbildung des Entoconids. Das des Schmelzbelags entblößte Entoconid läßt noch eine Streckung nach hinten außen erkennen.

Die unvollständige Erhaltung dieses unteren Molaren schließt eine genaue Bestimmung aus. Die größte Wahrscheinlichkeit darf beanspruchen, daß er *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB nahe steht und der vorher besprochenen Art angehört. Nicht völlig auszuschließen ist jedoch die Verwandtschaft mit dem von STEHLIN & SCHAUB 1951 als „*Peridyromys murinus* POMEL“ beschriebenen Tier aus Montaigu.

d) *Gliravus* spec. indet.
Taf. 7, Fig. 8 (Stereo)

Fundpunkt Steine-Berg III

Nr. 1952 XII 11 (Taf. 7, Fig. 8 Stereo):

0,82 × 1,04; M³ re. Stumpf einer schräg nach hinten innen gerichteten Innenwurzel und einer hinteren Außenwurzel sowie Ansatz einer schräg nach vorne außen gelängten vorderen Außenwurzel. Konkavität stark bis mäßig. Das lingual etwas verstärkte Vordercingulum ist nur dem Protoconus in wenig geschwächter Verbindung verwachsen. Es läuft auf den Paraconus zu und bleibt von ihm durch eine schmale untiefe Furche etwas getrennt. Der Paraconus überragt die übrige Kronenfläche als ovaler kräftiger Knoten weit und fällt nach hinten in einer gerundeten Kante ab. Am kronenwärts gelegenen Hang ist ihm der Paracon-Grat angeheftet. Dieser mündet lingual in den kräftig oval wulstig aufgetriebenen Innenrand, welcher dem Protoconus entspricht. Der Metacon-Grat ist weitgehend aufgelöst. Aus zwei kleinen in der Tiefe liegenden Teilstücken läßt sich sein Verlauf errahnen. Er dürfte vom eingeschnürten Ansatz am Protoconus nach schräg rückwärts zur Kronenmitte und dann nach hinten abbiegend zum Kronenrand führen. Unweit auswärts dieser Stelle ist das Schlußcingulum etwas verstärkt und wohl der frühere Metaconus zu suchen. Der Wulst am Kronenrand wird zwischen dem Paraconus und dem vermuteten Metaconus besonders niedrig, erhebt sich aber nochmals gering in einem Höckerchen. Auf dieses ist ein vager, sehr niederer, in der Tiefe des Trigonum-Lumens gelegener Grat gerichtet, welcher vor Erreichen des Außenrandes nach innen umkehrt und weiterhin geschlängelt endet. Außerdem ist in der äußeren Hälfte des Kronengrundes ein kurzes niederes Grätchen hinter dem Paracon-Grat enthalten. Das Schlußcingulum ist lingual keulig verstärkt und etwas eingeschnürt dem Protoconus verbunden.

Der hoch aufragende Paraconus erlaubt sicher die generische Bestimmung. Für die spezifische Einstufung könnte die Verbindung des Vordercingulums mit dem Protoconus als Hinweis für gleiche Entwicklungsrichtung und -höhe wie bei dem durch ein relativ langes Mesoconid ausgezeichneten M₃ Nr. 1951 XXIII 4 (S. 75; Taf. 7, Fig. 15 Stereo) angesehen werden. Auch der Größe nach passen die beiden Stücke zusammen. Bei *Gl. majori* STEHLIN & SCHAUB (1951, 138, Abb. 198) reichen die Cingula im Gegensatz zu diesem Stück fast bis zur Mitte des Innenrandes. Eine Verwandtschaft zu *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB ist demnach wahrscheinlich. Indessen fehlt die Sicherheit, welche nur ein umfangreicheres Material bringen könnte.

e) *Gliravus* spec. indet.

Taf. 7, Fig. 11 (Stereo), Fig. 14 (Stereo)

Fundpunkt S t e i n e - B e r g I

Mit einigem Vorbehalt werden die beiden folgenden Zähne wegen ihres ähnlichen Kronencharakters zu einer Art gestellt.

Nr. 1952 XII 2 (Taf. 7, Fig. 11 Stereo):

0,84 × 0,96; M^{1/2} oder P⁴ re. Hinterer Außenrand abgebrochen. Bewurzelung ausgebrochen. Kronenoberfläche kräftig konkav. Umriß rechteckig gerundet, besonders vorne. Berippung und Höcker kräftig. Das stark abgeschliffene Vordercingulum legt sich dem Vorderhang des Protoconus so an, daß sein Vorderrand kontinuierlich gerundet in den Kroninnenrand übergeht. Das Labialende des Vordercingulums verbindet sich mit dem sehr kräftigen Knoten des Paraconus. Der kräftige Paracon- und Metacon-Grat vereinigen sich in der kräftigen Erhebung des Protoconus. Dieser ist mit dem lingualen verstärkten Ende des Hintercingulums verbunden, wobei allerdings in weniger stark abgekautem Zustand die Verbindung nicht ganz so vollständig gewesen sein könnte,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
wie sie heute erscheint. Dem hinteren Paraconus-Hang ist unten ein Mittelgrat angelegt, welcher bis zur Kronenmitte reicht und an Stärke weit hinter den Hauptgraten zurückbleibt.

Der Zahn ist sehr klein. Sein mächtiger Paraconus ist als ursprüngliches Merkmal anzusehen. Als fortgeschritten sind sein verhältnismäßig wenig betonter Protoconus und die schwachen, jedoch vorhandenen Verbindungen zwischen Protoconus und Vorder- bzw. Schlußcingulum zu werten.

Nr. 1952 XII 4 (Taf. 7 Fig. 14 Stereo):

0,79 × 1,02; oberer Backenzahn, vermutlich M³ re. Bewurzelung ausgebrochen.

Der Zahn wird wegen seines Umrisses und wegen der Verstärkung des hier als Schlußcingulum aufgefaßten Grats als M³ re aufgefaßt, obwohl die M³ von *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB (1951, 137, 138, Fig. 198) stark abweichenden Charakter besitzen. Da von *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB bisher kein M³ bekannt gemacht wurde, der hier zum Vergleich dienen könnte, sind gegenwärtig nicht alle Zweifel völlig zu beseitigen, daß es sich beim vorliegenden Stück um einen D⁴ li. handele. Die nachfolgende Beschreibung geht von der Deutung als M³ re aus.

Krone kräftig konkav. Gerundet trapezoidischer, nach hinten und leicht nach innen verschmälerter Kronenumriß. Grobe Berippung und kräftige Höcker. Das Vordercingulum ist bedeutend niedriger als die Trigonum-Kanten gelegen. Es ist labial dem Vorderhang des Paraconus und lingual dem Vorderhang des Protoconus jeweils ziemlich weit unten verwachsen. Vom sehr kräftigen längsovalen Knoten des Protoconus gehen, sich zur Kronenmitte verschmälernd, Paracon- und Metacon-Grat aus. Der Paraconus ist ein rundlicher den Metaconus an Höhe übertreffender Knoten, welcher hinten auf der Kronenseite eine zur Krone konkav gerundete Kante besitzt, in deren Verlängerung sich in der Kronentiefe ein schwaches bis zur Kronenmitte reichendes vorderes Mittelgrätchen ansetzt. Der Metacon-Grat verstärkt sich kontinuierlicher als der Paracon-Grat keulenförmig nach außen, um schließlich im Metaconus mit schräg auswärts vorwärts gezogener Kante aufzugehen. Dessen Hinterhang ist ziemlich tief das labial ausspitzende Ende des Hintercingulums angelegt. Das Schlußcingulum ist zwar im ganzen schwächer als die Trigonum-Kanten ausgebildet, jedoch besitzt es an seinem Lingualende eine deutliche Verdickung. Dort ist es dem Protoconus-Hinterabfall unten verschmolzen, jedoch noch halb von ihm durch eine Einschnürung getrennt.

Da die Bewurzelung des vorliegenden oberen Zahnes ausgebrochen ist, kann die Entscheidung, ob es sich um einen D⁴ oder M³ handelt, nicht sicher gefällt werden. Der Umriß spricht für einen M³. Die sehr kräftige Ausbildung der Höcker, vor allem des Protoconus und das gegenüber dem Trigonum sehr niedrige Vordercingulum sind sehr ursprüngliche Merkmale, welche es nicht gestatten, den Zahn zu *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB (1951, 137, Abb. 197) zu stellen. *Gl. priscus* STEHLIN & SCHAUB besitzt nur einen bedeutend schwächeren Protoconus, und sein Trigonum läuft spitzer nach innen zu als beim vorliegenden Zahn.

f) *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB

Taf. 7, Fig. 2 (Stereo), Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6

v* 1951. *Gliravus Majori* n. sp. — STEHLIN & SCHAUB 1951 (137, 368, Abb. 198).

Fundpunkt T a l - H o l z

Nr. 1952 XII 17 (Taf. 7, Fig. 3):

1,07 × ca. 1,30; M^{1/2} rev beschädigt. Ansätze einer kräftigen rundlichen Innenwurzel und zweier schwächerer Außenwurzeln.

Nr. 1952 XII 18 (Taf. 7, Fig. 2 Stereo):

1,04 × ?; M^{1/2}, wohl M¹ re. Außenrand abgebrochen. Bewurzelung ausgebrochen.

Die beiden Zähne sind kräftig konkav. Das Vordercingulum reicht bei Nr. 1952 XII 18, welcher aus diesem Grunde als M¹ re aufgefaßt wird, nicht so weit nach innen wie das Hintercingulum; bei Nr. 1952 XII 17 erreicht das Vordercingulum fast den Innenrand, biegt dort jedoch etwas nach rückwärts ab. Etwas auswärts seines Innenrandes ist es bei beiden Zähnen leicht keulenförmig verdickt. Der am Innenrand gerundete Protoconus läuft in die wulstförmigen Trigonum-Schenkel aus. Sein Innenhang ist bei Nr. 18 etwas asymmetrisch ausgebildet mit einer nach hinten innen gerichteten abgestumpften Dreiecksspitze, wodurch das Trigonum eine stärker dreieckige Form andeutet als bei Nr. 17. Der weniger stark abgekaute Zahn Nr. 17 läßt eine solche Asymmetrie kaum noch erkennen. Nr. 17 zeigt jedoch stärker ein anderes Merkmal, die nach vorne geschwungene Form des hinteren Trigonum-Schenkels. Der hintere Trigonum-Schenkel mündet an einer abgerundeten Ecke in den Metaconus-Wulst ein, welcher den hinteren Innenrand bildet. Dem Vorderende des Metaconus ist in der Tiefe ein relativ niedriger Mittelgrat angelagert, welcher durch Querfurchen in zwei hintereinander liegende Leistchen und ein Höckerchen gegliedert wird. Das Hintercingulum ist höher bzw. durch eine tiefere Furche vom Trigonum getrennt als das Vordercingulum. Es liegt mit seinem keilförmigen inneren Ende nur andeutungsweise mit einer kaum erkennbaren Brücke dem Protoconus an. Nahe dem Außenende ist das Hintercingulum schwach verdickt und liegt in der Tiefe dem Metaconus an.

Die beiden M^{1/2} gleichen etwa den Zähnen des Typusschädels von *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB. Sie weichen von ihnen insofern etwas ab, als das Ende des Vordercingulums mehr oder weniger weit vom Lingualrand der Krone entfernt bleibt. Bei Nr. 1952 XII 18 erreicht auch das Schlußcingulum nicht ganz den Kroneninnenrand.

Nach Größe und Kronenstruktur sind hier die folgenden unteren Zähne anzuschließen.

Nr. 1952 XII 14 (Taf. 7, Fig. 4):

1,03 × 1,11; M₃ li. etwas beschädigt.

Nr. 1952 XII 15 (Taf. 7, Fig. 5):

1,02 × 1,11; M₃ li.

Nr. 1952 XII 16 (Taf. 7, Fig. 6):

1,10 × ca. 1,09; M_{2/3}, wohl M₃ re, stark usiert und beschädigt.

Einer kräftigen Hinterwurzel sind zwei bedeutend schwächere quergestreckte Vorderwurzeln vorgestellt. Da der stark abgekaute Molar Nr. 16 an seiner Hinterfläche eine nicht eindeutige Seitenusur aufweist, könnte hier auch ein M₂ vorliegen. Die Paraconid-Leiste besitzt außer der deutlichen als Paraconid gedeuteten Verdickung am Außenende eine zweite Verstärkung etwa in ihrer Mitte. Sie ist durch eine Furche von Protoconid getrennt und mündet mindestens bei Nr. 14 in das Metaconid ein. Das hochaufragende Metaconid ist an seinem Hinterhang zu einem den vorderen Innenrand begleitenden Wulst ausgezogen. Dieser Wulst endet hinten an einer Furche, welche ihn vom Entoconid trennt und zeigt angedeutet, jedoch kaum wahrnehmbar, die Tendenz hinten in

Richtung zur Kronenmitte abzubiegen. Demnach scheint in den Metaconid-Abfall ein sehr schwach angedeutetes Mesostylid-Grätchen einbezogen zu sein. Der Protoconid-Grat ist bei Nr. 15 in einem nach vorne offenen Bogen geschwungen, bei Nr. 14 ist der Vorderrand des Protoconids nach vorne abgewinkelt. Das Protoconid ist sehr kräftig ausgebildet. Das Innenende der Protoconid-Leiste ist schwach aufwärts gebogen mit dem unteren Außenhang des Metaconids verschmolzen. Das ellipsoidisch gerundete Entoconid erreicht zwar nicht die Höhe und kräftige Ausbildung des Metaconids und Protoconids, ist jedoch kräftig. Vom Hypoconid-Grat wird es durch eine Furche etwas geringerer Tiefe als vom Metaconid-Mesostylid-Wulst getrennt. Das Hypoconid ist als keulenförmige Verstärkung seines Grates kräftig entwickelt. Ein Hypoconulid kann an Nr. 15 als sehr schwache Verdickung im Hypoconid-Grat erahnt werden. Zwischen Entoconid und Hypoconid liegt ein mäßig kräftiger Grat. Er verläuft bei Nr. 14 etwa gerade, bei Nr. 15 nach vorne geschwungen. Bei Nr. 15 ist das Außenende dieses Grats über eine tiefe Brücke mit dem Hypoconid, das seinerseits mit einem Sporn darauf zuweist, verbunden. Auch bei Nr. 16 liegt dieser Grat mit der Spitze dem Hypoconid an. Auf der Innenseite weist der Grat in allen Fällen auf das Entoconid hin, ist aber mit diesem nicht, bei Nr. 16 eventuell und nur sehr schwach, verbunden.

Gemeinsam mit *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB (1951, 298 u. 368, Fig. 513) sind die beschriebenen unteren Molaren einfach gebaut, besitzen vier Haupthügel, weisen die hochaufragende Gestalt des Metaconids, die Isolierung des Entoconids und die Trennung des Paraconids vom Protoconid auf. Während jedoch bei *Gliravus priscus* die Mesoconid-Leiste, wenn auch bedeutend schwächer als Protoconid- und Hypoconid-Leiste ausgebildet, den Außenrand der Krone einnimmt, strebt bei den hier besprochenen unteren Molaren von *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB der auf das Entoconid weisende Grat auf die Innenseite des Hypoconids zu und deutet z. T. sogar eine Verbindung mit diesem an. Dieses Merkmal zeigt für die von STEHLIN & SCHAUB „*Peridyromys murinus* POMEL“ genannte Art (1951, 300, Abb. 515) eine nähere Verwandtschaft zu *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB als zu *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB an. Bemerkenswert ist bei den vorliegenden Zähnen die gegenüber dem Typus von *Gliravus priscus* STEHLIN & SCHAUB deutlichere Ausbildung des Paraconids und das Auftreten einer schwachen Verdickung in der Mitte der Paraconid-Leiste.

g) *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB?
Taf. 7, Fig. 7 (Stereo)

Wegen der ungenügenden Erhaltung kann nur mit Vorbehalt an die vorher beschriebene Art aus dem Fundpunkt Tal-Holz angeschlossen werden:

Fundpunkt Steine-Berg III

Nr. 1952 XII 12 (Taf. 7, Fig. 7 Stereo):

0,99 × ?; Kronenbruchstück eines M^{1/2} li. Bewurzelung ausgebrochen; Außenhälfte abgebrochen; ziemlich kräftig abgekaut. Vorder- und Schlußcingulum erreichen den Innenrand und enden dort frei. Die linguale Verstärkung des Vordercingulums wird betont durch den tiefen Schmelzdurchbruch an seiner inneren Vorderfläche. Auch das Schlußcingulum ist lingual verstärkt und übertrifft das Vordercingulum an Höhe. Der Protoconus ist ein mächtiger Wulst, welcher Paracon- und Metacon-Grat aufnimmt,

wobei der Metacon-Grat beim Protocon-Ansatz etwas nach vorne schwingt. Ein Mittelgrat ist in der Kronenmitte mit einem rautenförmigen Knötchen eben noch sichtbar.

h) *Gliravus* spec. indet.
Taf. 7, Fig. 13 (Stereo)

Fundpunkt S t e i n e - B e r g I

Nr. 1952 XII 5 (Taf. 7, Fig. 13 Stereo):

? $\times 1,11$; $M^{1/2}$ re oder P^4 li, vermutlich P^4 li. Vorderrand beschädigt. Es wäre naheliegend den Zahn als M^1 re eines *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB nahestehenden Tieres aufzufassen. Jedoch reicht der erhaltene Schmelzbelag der Vorderfläche an einer Stelle zu tief, um die Annahme zu rechtfertigen, daß an dieser Bruchfläche eine Schlußcingulum zu ergänzen sei. Daher dürfte der Zahn als P^4 li aufzufassen sein.

Bewurzelung ausgebrochen. Krone konkav. Der Vorderrand ist abgebrochen. Der Schmelzbelag der Vorderwand ist jedoch etwas einwärts der Kronenmitte in einem kurzen Stück ziemlich weit nach unten reichend erhalten. Der mäßig kräftige Protoconus-Wulst entsendet abbiegend die beiden Trigonum-Schenkel, wobei der Paracon-Grat an seiner Ansatzstelle etwas kräftiger ausgebildet ist als der dort leicht verschmälerte Metacon-Grat. Der Paracon-Grat geht in den hoch aufragenden Hügel des Paraconus über, welcher Proto- und Metaconus überragt. Der Paraconus entsendet von seiner Spitze eine schräg nach hinten innen gerichtete und bis zur Kronenmitte in einem niederen Grätchen fortgesetzte Kante, also einen vorderen Mittelgrat. Der Metacon-Grat verläuft vom Protoconus aus transversal sehr schwach nach vorne und biegt in der Kronenmitte schwach nach rückwärts ab, um sich mit dem Hinterende des nach schräg außen gestreckten Metaconus zu vereinigen. Das Schlußcingulum erreicht weder an Stärke noch an Höhe das Trigonum. Es ist lingual keulig verstärkt und endet noch etwas vor dem Innenrand frei. Labial verbindet es sich dem Hinterabhang des Metaconus unten so, daß sein Hinterrand in den Metaconus-Außenhang übergeht.

Wegen der Beschädigung am Vorderrand erlaubt der Zahn keine nähere Bestimmung.

i) *Gliravus* nov. spec. aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB
Taf. 9, Fig. 23 (Stereo)

Fundpunkt F a l l - T o b e l

Nr. 1951 XXIV 1 (Taf. 9, Fig. 23 Stereo)

$1,20 \times ?$, $M^{1/2}$ re; beschädigt. Ansatz einer kräftigen rundlichen Innenwurzel. Außenbewurzelung ausgebrochen. Kronenoberfläche konkav. Grobrippiger Bau. Vorder- und Schlußcingulum reichen bis zum Kroneninnenrand und enden dort frei. Sie sind den Trigonum-Schenkeln an Höhe gleichwertig; das Schlußcingulum ist sogar kräftiger gebaut als der vor ihm gelegene vordere Trigonum-Schenkel. Das Schlußcingulum ist lingual keulig verstärkt. Labial legt es sich, durch eine schmale seichte Furche wenig gesondert, dem hinteren Metaconus-Abfall an. Vom kräftigen ovalen Protoconus gehen der bis zur Kronenmitte gerade und etwas schräg vorwärts gerichtete Paracon-Grat und der zunächst transversal, weiterhin schräg rückwärts gerichtete und schließlich in den Metaconus übergehende Metacon-Grat aus. Vor dem Metacon-Grat und etwa parallel zu ihm verläuft ein in zwei Erhebungen gegliedertes niederes Grätchen, welches wohl mit dem Metaconus kommuniziert hat.

Stücke wohl der gleichen Art waren STEHLIN aus Wynau I bekannt (Basel Wy 85, 160, 161, 291, 292) und von ihm „in schedulis“ als Art ausgeschieden worden; jedoch ist der hier vorliegende M^{1/2} wohl etwas kleiner und besitzt ein größeres Länge-Breite-Verhältnis als die Stücke von Wynau I.

Gliravus majori STEHLIN & SCHAUB stimmt mit dem vorliegenden Stück in der Kronenstruktur, soweit erkennbar, überein, insbesondere auch darin, daß die Cingula etwa den Innenrand erreichen und dann frei enden. Die hier vorliegende Art ist jedoch größer als *G. majori* STEHLIN & SCHAUB.

j) *Gliravus* nov. spec. aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB?
Taf. 7, Fig. 9 (Stereo); Taf. 8, Fig. 2 (Stereo)

1. Fundpunkt Steine-Berg II

Nr. 1952 XII 7

0,86 × 1,22; P⁴ li. Ansatz einer kräftigen Innenwurzel; Narbe wohl nur einer mittelstarken Außenwurzel. Kräftig konkav. Gerundet rechteckiger Umriß. Der sehr kräftige, aufgekaute Protoconus entsendet die beiden Trigonum-Schenkel. Der Paracon-Grat geht, außen sich keulig verstärkend, in den kräftigen, nur sehr schwach nach hinten gerichteten Paraconus über. Der Metacon-Grat verbindet sich mit dem schräg nach vorne außen orientierten, ovalen Knoten des Metaconus, welcher an Stärke nicht ganz den Paraconus erreicht, jedoch etwas stärker aufgekauert ist als dieser. Das kurze Vordercingulum besitzt eine linguale Verstärkung, legt sich jedoch dem Trigonum-Vorderrand auf halber Höhe an. Das Hintercingulum zeigt in einer spindelförmigen Aufkaufläche, welche bis zur Kronenmitte reicht, seine linguale Verstärkung an. Es bleibt vom Protoconus-Hinterhang durch eine seichte Furche getrennt. Auch labial endet es frei in einer sich langsam abdachenden Kante, getrennt vom Metaconus durch eine an dessen Hinterhang frei nach außen endende Furche.

2. Fundpunkt Gschwendertobel II

Nr. 1952 XII 28 (Taf. 8, Fig. 2 Stereo):

0,83 × 1,23; P⁴ li. Stümpfe einer wohl kräftigen ovalen Innenwurzel, einer kleinen hinteren Außenwurzel und einer mittelstarken vorderen Außenwurzel. Stark konkav. Kräftiges Relief. Gerundet rechteckiger, innen verschmälerter Umriß. Das Vordercingulum legt sich lingual dem vorderen Hang des vorderen Trigonum-Schenkels bzw. des Protoconus an. Außen ist es dem Vorderabhang des Paraconus verbunden, so daß sein Vorderrand in den Kronenaußenrand überleitet. Vom sehr kräftigen Knoten des Protoconus gehen der Paracon- und Metacon-Grat aus. Der Paracon-Grat geht außen in den kräftigen Knoten des Paraconus über. Der Metacon-Grat endet bei diesem Zahn vor der Kronenmitte, indem er kurz zuvor schräg rückwärts abbiegt. Er weist auf eine oval knotig verstärkte Stelle des Schlußcingulums hin. Der ovale, nicht den Paraconus an Höhe erreichende Metaconus geht etwas schräg nach hinten ausgezogen in das Schlußcingulum über. Dieses fällt bei der Kronenmitte, einwärts der erwähnten Verstärkung, an Höhe nochmals ab, um sich nach einer angedeuteten labialen Verstärkung ziemlich spitz auslaufend dem Hinterabhang des Protoconus anzulegen.

Nr. 1952 XII 7 ist als P⁴ eines *Gliravus* gut zu erkennen und wird nach seiner Größe hierher gerechnet. Bei Nr. 1952 XII 28 dürfte das Fehlen der äußeren Hälfte des Metacon-Grats individuell bedingt sein. Dieser Zahn wird ebenfalls

nach der Größe zur vorliegenden Art gerechnet. Gegenüber dem P⁴ des *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB fällt auf, daß die beiden hier besprochenen Zähne Vordercingula besitzen. Nr. 1952 XII 7 kommt jedoch in der Form der Außenhöcker und des Schlußcingulums *Gl. majori* STEHLIN & SCHAUB recht nahe.

Ein sehr schlecht erhaltener M_{1/2} dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit nach seiner Größe und der, soweit kenntlich, mit *Gl. majori* STEHLIN & SCHAUB übereinstimmenden Kronenstruktur hier anzuschließen sein.

3. Fundpunkt Schleifmühle II

Nr. 1951 XXIII 3:

Ca. 1,35 × ca. 1,39; M_{1/2}, wohl M₂ li; durch Verlust eines großen Teil des Schmelzmantels sehr stark beschädigt. Kurze Ansätze wohl zweier Vorderwurzeln, von denen die äußere kleiner als die quergestreckte innere sein dürfte. Außerdem Narbe und Reste vermutlich einer mächtigen Hinterwurzel, in deren Ansatz jedoch möglicherweise auch eine kleine innere Hinterwurzel einbezogen ist. Mäßig konkav. Viereckiger, hinten schwach verschmälerter und etwas gerundeter Umriß. Das Metaconid stellt die höchste Erhebung der Krone dar. Der von ihm ausgehende Protoconid-Grat deutet sich an der Dentinoberfläche an. Beim Paraconid-Grat ist die Verdickung des Paraconids noch erkennbar. Das Entoconid dürfte ein ovaler kräftiger Knoten gewesen sein. Das Hypoconid stellt wie das Protoconid eine kräftige keulige Verstärkung seines Grates dar. Ein in der Kronenmitte gelegener schwächerer Grat ist angedeutet. Das eine Ende seines Schmelzbelags ist in der Kronenmitte als kleiner Rest erhalten. Von dort könnte dieses Grätchen zum inneren Vorderhang des Hypoconids geschwungen gewesen sein und einen vagen Abzweiger bis zur Furche hinter dem Protoconid entsandt haben.

I V. G e n u s *Peridyromys* STEHLIN & SCHAUB 1951

Die Typusart des Genus ist *Peridyromys murinus* (POMEL) aus Langy (Allier). POMEL (1853, S. 24) verglich den ihm vorliegenden Schädel wohl mit dem in Frankreich häufigen rezenten *Eliomys quercinus* L. und nennt den Kronenbau von *Peridyromys murinus* komplizierter als denjenigen von *Eliomys quercinus* (L.). 1951 bildeten STEHLIN & SCHAUB (S. 137 f., 300 u. 368, Abb. 199 u. 515) obere und untere Zähne bzw. Zahnreihen (Basel MA 3262, MA 3215 und Ph. 4172) einer gut definierten Art aus Montaigu (Allier) ab und beschrieben in ihrer Genusdiagnose für *Peridyromys* diese Art.

Das Original POMELS dürfte jedoch einer anderen Art angehört haben als die Stücke, welche STEHLIN & SCHAUB aus Montaigu vorlagen, da sonst POMEL meines Erachtens den Kronenbau der Art von Montaigu mindestens nicht mit solcher Bestimmtheit als komplizierter als denjenigen von *Eliomys quercinus* (L.) bezeichnet hätte.

Die Fundpunkte des mittleren und oberen Aquitans enthalten neben der aus Montaigu beschriebenen Art mit relativ einfachem Kronenbau (z. B. Basel S. G. 260) auch weniger leicht voneinander unterscheidbare Arten mit komplizierterem Relief. Der Verfasser möchte daher annehmen, daß die von VIRET 1929 als *Dyromys (Myoxus) murinus* (POMEL) beschriebenen, aus St. Gérard stammenden

Zähne besser zur Beschreibung POMELS passen als die Art von Montaigu. Aus diesem Grunde sieht sich der Verfasser nicht berechtigt, dem Vorschlag DE BRUIJNS (1965, S. 90 u. 91) zu folgen, daß die durch STEHLIN & SCHAUB 1951 von Montaigu beschriebene Art zunächst als identisch mit *Peridyromys murinus* (POMEL) betrachtet werden solle, es sei denn, daß für diese Benennung eine Ausnahmegenehmigung erwirkt werden kann, was sehr zu begrüßen wäre. Gegenwärtig ist der Verfasser gezwungen, die von VIRET 1929 (S. 66—70, Taf. 1, Fig. 9—11, Abb. 7) beschriebenen Stücke als *Peridyromys murinus* (POMEL) am nächsten stehend zu betrachten.

Zu der Unsicherheit, welche gegenwärtig durch die ungenügende nomenklatorische Definition der Gattung *Peridyromys* STEHLIN & SCHAUB bedingt wird, kommen noch Zweifel, ob die im folgenden beschriebenen Arten mit Recht hierher gestellt werden oder ob sie dem Genus *Microdyromys* DE BRUIJN zugerechnet werden müßten. Wie später dargelegt wird, dürfte die Einordnung beim Genus *Peridyromys* zu bevorzugen sein (S. 94).

a) *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG)

Taf. 7, Fig. 10 (Stereo); Taf. 8, Fig. 4 (Stereo); Fig. 5 (Stereo)

v* 1941. *Dryomys praemurinus* n. sp. — FREUDENBERG 1941 (S. 120 f., Taf. 12, Fig. 15 u. 16, Abb. 14). — (Diese Arbeit: Taf. 8, Fig. 4 Stereo)

1. Fundpunkt Steine-Berg II

Nr. 1952 XII 6 (Taf. 7, Fig. 10 Stereo):

0,90 × 0,89; M₁ re. Vorne kurzer Stumpf, hinten Narbe einer quergestreckten Wurzel. Kronenoberfläche mäßig konkav; Kronenumriß rechteckig, vorne verschmälert. Der Protoconid-Grat kommuniziert durch eine schmale Kante mit dem Metaconid. Labial verbreitert er sich und mündet in das vorgezogene Protoconid, beim vorliegenden Stück in dessen vorderen Teil, ein. Die Verbindung von Protoconid und Paraconid ist über eine zwar schmale aber hohe Kante vollständig. Das Paraconid tritt als Verstärkung sehr deutlich in Erscheinung. Der Metaconid-Wulst tritt als Kante hoch heraus und verbindet sich bei diesem Exemplar im Bogen vollständig mit dem Protoconid-Grat. Eine tiefer gelegene Abzweigung des Protoconid-Grates führt zu einer knotigen, hier selbständig nochmals aufragenden Verstärkung am Lingualrand der Krone vor der Mittelfurche, vermutlich dem Mesostylid. Die Verbindung des langen Mittelgrats zu diesem Knoten ist etwas verschmälert. Der Mesoconid-Grat ist in der Kronenmitte unterbrochen. Er mündet in den kräftigen ovalen Knoten des Entoconids, welcher nach hinten zum Hypoconid-Grat abfällt. Der vordere und der durch zwei Einschnürungen gegliederte hintere Zwischengrat sind kräftig ausgebildet.

Der vorliegende Zahn fällt infolge seiner etwas größeren Maße etwas aus dem Streubereich heraus, den man für die unten (S. 85 f.) beschriebene Unterart trotz des noch unzureichenden Materials annehmen möchte. Er stimmt aber darin gut überein mit dem Original des *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG), das in der vorliegenden Arbeit zum Vergleich nochmals abgebildet wird (Taf. 8, Fig. 4 Stereo). Die deutliche Ausbildung von Paraconid und Entoconid sind dem Typus gegenüber als etwas primitivere Merkmale zu werten, können aber wohl noch als im Variationsbereich der Art gelegen aufgefaßt werden. Wie das noch

unveröffentlichte übrige Gliridenmaterial von Gaimersheim zeigt, neigt *Peridromys? praemurinus* (FREUDENBERG) tatsächlich zu Variationen im Kronenbau. Daher werden die übrigen angeführten Besonderheiten des vorliegenden Stückes (Nr. 1952 XII 6) als individuelle Abänderungen aufgefaßt.

2. Fundpunkt Schindelwies-Graben

Nr. 1951 XXIII 11 (Taf. 8, Fig. 5 Stereo):

0,84 × 0,80; M₁ li. Ziemlich lange Stümpfe zweier quergestreckter Wurzeln, von denen die vordere etwas eingebuchtet, jedoch nicht geteilt ist. Rechteckig gerundeter, vorne etwas verschmälerter Kronenumriß. Der Protoconid-Grat winkelt im äußeren Kronendrittel nach schräg vorne, am Außenrand nochmals nach vorne ab und ist mit dem Paraconid-Grat verwachsen. Der Paraconid-Grat läßt an zahlreichen Schmelzdurchbrüchen seine feine Quergliederung erkennen; insbesondere deutet sich nahe seinem Labialende das ehemalige Paraconid etwas an. Der Paraconid-Grat mündet innen in die bogenförmige hohe Kante, welche das Metaconid aufgenommen hat und hinten plötzlich steil zur Mittelfurche abfällt. Von dieser Kante strebt, ihr nur mit einer Spitze etwas vertieft angeheftet, der Mittelgrat etwa im rechten Winkel weg. Sein Außenende ist dem erwähnten Protoconidgrat-Knick in der Tiefe etwas angeheftet. Das Mesoconid steht an Stärke etwas hinter dem Hypoconid zurück und ist über den Mesoconid-Grat mit ihm durch einen durchgehenden, am Entoconid verstärkten und dahinter leicht geschwächten Grat verbunden. Das Hypoconid ist als ovaler, nach vorne gezogener, knotiger Pfeiler besonders deutlich. Der hintere Zwischengrat ist ziemlich lang, der vordere fehlt.

Der beschriebene Zahn weicht vom Typus des *Peridromys? praemurinus* durch das Fehlen eines vorderen Zwischengrates ab.

b) *Peridromys? praemurinus* nov. subsp. A²)

Taf. 9, Fig. 1 (Stereo), 17, 18, 19, 20 (Stereo), 21 (Stereo), 22 (Stereo)

Diagnose: Mit ähnlicher Kronenstruktur wie beim Typus des *Peridromys? praemurinus* (FREUDENBERG), jedoch etwas kleiner als dieser.

1. Fundpunkt Gschwender Tobel

Nr. 1952 XII 23 (Taf. 9, Fig. 18):

0,71 × 0,72; M_{1/2}, wohl M₁ re. Zwei querverlaufende Wurzelleistenansätze. Mäßig konkav. Vorne etwas verschmälerter, rechteckig kantengerundeter Kronenumriß. Die Paraconid-Leiste ist mit dem Protoconid verwachsen und dort am Außenteil etwas verdickt. Sie erhebt sich hoch im Metaconid, welches als kräftige Schneide ausgebildet ist und in einer Kante bis zu dem Einschnitt abfällt, welcher vor dem Entoconid liegt. In diesen Abfall der Metaconid-Kante ist ein kaum zu erkennendes Grätchen einbezogen, welches als Mesostylid aufgefaßt werden kann. Die Protoconid-Leiste verläuft an ihrem Vorderrand in einem schwach nach hinten geschwungenem Bogen; an ihrem Hinterrand verläuft sie stärker transversal und kaum nach hinten geschwungen fast bis zum Außenrand, so daß die Protoconid-Leiste keulenförmige Gestalt und das Protoconid selbst eine

²) Da Art und Unterart nomenklatorisch gleichen Rang besitzen, wird hier eine neu beschriebene Unterart des *Peridromys? praemurinus* (FREUDENBERG) mit „A“, eine neue Art von *Peridromys?* mit „B“ bezeichnet.

etwas stumpf dreieckige Form annimmt. Lingualwärts gabelt sich die Protoconid-Leiste im inneren Kronendrittel. Sie entsendet nach vorne innen einen kurzen Sporn, welcher im steilen labial gerichteten Metaconid-Abfall im unteren Teil verschwindet. Weiterhin verläuft von der Gabelungsstelle ein Grat auf den vorderen kronenwärtigen Abfall des Entoconids zu, von dem es jedoch durch eine seichte Furche getrennt bleibt. Vor der Protoconid-Leiste liegt ein kurzes ovales Grätchen. Hinter der Protoconid-Leiste liegt der Mittelgrat, welcher etwa zwei Fünftel der Kronenbreite einnimmt und sich nur mit einer sehr tiefen Brücke, kaum wahrnehmbar, an den genannten Längsgrat anlegt. Der Mesoconid-Grat ist relativ gleichförmig, biegt an seinem Innenende, vom Entoconid durch eine seichte Furche getrennt, etwas nach vorne ab und verbindet sich dort mit dem erwähnten Längsgrat. Das Mesoconid ist als fast ebenso kräftige Erhebung wie das Protoconid ausgebildet und tritt noch besonders dadurch hervor, daß die Mesoconid-Leiste ziemlich unvermittelt mit geringerer Stärke an das Mesoconid grenzt. Außerdem ist das Mesoconid ziemlich scharf und weit nach vorne gezogen. Vom ovalen Knoten des Entoconids verläuft der Hypoconid-Grat über die Andeutungen zweier Zwischenhügel, wovon die äußere dem Hypoconulid entsprechen könnte, hinweg zum Außenende. Dort geht er in dem sehr kräftigen keulenförmigen Hypoconid auf, das weniger unvermittelt als Protoconid und Mesoconid nach vorne gezogen ist. Vor der Hypoconid-Leiste liegt ein sich nur wenig erhebender und etwas gegliederter Zwischengrat.

Nr. 1952 XII 25 (Taf. 9, Fig. 19):

0,78 × 0,75; $M_{1/2}$, wohl M_2 re. Lingual mäßig stark abgekaut. Bewurzelung undeutlich, da bis zur Basis ausgebrochen. Zwei quer orientierte, kräftige Wurzelleistenansätze, deren Trennung an diesem Exemplar nicht sicher zu erkennen ist. Ob diese Wurzelleisten aus je zwei Wurzeln zusammengewachsen sind, muß ebenfalls offen bleiben. Krone mäßig konkav. Rechteckig gerundeter Umriß. Dem Protoconid ist die Paraconid-Leiste mit hoher, jedoch noch schwach eingetiefter Brücke verschweißt. Das Paraconid ist im äußeren Teil der Paraconid-Leiste als schwache Verdickung erkennbar. Weiterhin verläuft die Paraconid-Leiste im Bogen in das hohe, als kräftige Leiste hervortretende Metaconid. Der hintere Teil des Metaconid-Abfalls ist schwach verstärkt und könnte als Mesostylid gedeutet werden. Der Mittelgrat ist dem Hinterabfall der Metaconid-Kante im rechten Winkel über eine stark verschmälerte Nahtstelle angefügt. Er verläuft etwas geschlängelt und in drei schwachen Verstärkungen kulminierend etwa über drei Viertel der Kronenbreite hinweg. Der ziemlich kräftige Protoconid-Grat ist in einem nach vorne geöffnetem Bogen geschwungen. Nach innen zu verjüngt er sich, um in einer Spitze dem Metaconid-Labialabfall unten anzuliegen. Vor dem Protoconid-Grat liegt ein Zwischengrat. Der Mesoconid-Grat verläuft vom ovalen Entoconid aus zu Beginn etwa transversal, in der Mitte leicht nach vorne abgewinkelt, dann wieder transversal in ziemlich gleichbleibender Stärke über die Krone hinweg. Das Mesoconid biegt von seinem Grat in relativ engem Bogen nach schräg vorne zu einer langen, sich verschmälernenden und mäßig abfallenden Kante ab. Dabei verläuft die vordere Begrenzung des äußeren Mesoconid-Grats mehr bogenförmig, die hintere Begrenzung in abgerundet stumpfem Winkel. Vom Entoconid führt der Hypoconid-Grat in durchgehender Verbindung bogenförmig zum hohen, sehr kräftigen Hypoconid, das an Stärke Mesoconid und Protoconid wesentlich übertrifft. Vor der Hypoconid-Leiste liegt ein Zwischengrat, dem ein runder ziemlich kräftiger Knoten aufgesetzt ist.

Daß die beiden beschriebenen Zähne aus einem Fundpunkt stammen und sich mit Ausnahme des nachfolgend beschriebenen 1952 XII 21 gemeinsam erheblich von den übrigen Gliriden-Zähnen der Fundstelle unterscheiden, erleichtert den Entschluß, sie zu einer Art zu stellen. Auch zeigen manche Varianten von *Glis glis* (L.) und von dessen quartären Verwandten (KOWALSKI 1963,

Fig. 11; SOERGEL 1919, Taf. 3, Fig. 3) gelegentlich ebenfalls Längsverbindungen zwischen den transversalen Graten, so daß man nicht gezwungen ist, Nr. 1952 XII 23 wegen seiner Verbindung zwischen Protoconid- und Entoconid-Grat zu einer anderen Art zu stellen wie Nr. 1952 XII 25, der seinerseits in Unregelmäßigkeiten von Protoconid-Grat, Mittelgrat und Entoconid-Grat selbst eine Tendenz zur gleichen Längsverbindung ahnen läßt.

Nr. 1952 XII 21 (Taf. 9, Fig. 17):

0,56 × 0,71; P⁴ li; etwas beschädigt. Stümpfe einer rundlichen kräftigen Innenwurzel, einer kräftigen rundlichen vorderen Außenwurzel und einer kleinen hinteren Außenwurzel, welche kronennah verwachsen jedoch in ihren Spitzen deutlich getrennt sind. Mäßige Konkavität. Para- und Metaconus ragen als sehr kräftige Knoten hoch auf. Die hintere Trigonum-Kante ist deutlich als gleichmäßige Leiste ausgebildet. Da der Zahn vorne etwas beschädigt ist, kann der Ansatz der vorderen Trigonum-Kante am Paraconus nicht beobachtet werden. Der Paraconus entsendet einen kräftigen vorderen Mittelgrat weit in das Trigonum-Lumen. Der Metaconus entsendet nur einen kurzen Sporn nach vorne innen, welcher jedoch in einen tief eingeschnittenen Graben abfällt und vom vorderen Mittelgrat getrennt bleibt. Das Vordercingulum ist labial zerstört. Im linguale Kronendrittel ist es dem vorderen Trigonum-Schenkel, durch eine untiefe Furche getrennt, angesetzt. Das Schlußcingulum erreicht den inneren, aber nicht ganz den äußeren Kronenrand. Ein tiefer, nur an den Seiten etwas seichter Graben trennt es vom Trigonum. Der tief eingeschnittene Teil des Grabens reicht weiter nach innen als das Trigonum-Lumen. Eine schwache Verdickung des Schlußcingulums ist in seiner äußeren Hälfte zu erkennen. Eine Verstärkung am Innenende ist nur angedeutet. An diesem Exemplar ist es nicht ganz auszuschließen, jedoch unwahrscheinlich, daß der vordere „Mittelgrat“ die abgetrennte vordere Trigonum-Kante darstellt. Der Protoconus tritt als Höcker nicht in Erscheinung. Der Lingualrand wurde, wohl durch Abkauen, zur fast geraden Kante.

Nr. 1952 XII 21 erscheint etwas groß, paßt jedoch noch durchaus zu den beiden hier beschriebenen unteren Molaren dieses Fundpunktes. Seine Kronenkomplikation ist, wie bei diesen unteren Molaren, relativ hoch.

2. Fundpunkt Fall - Tobel

Aus ähnlichem stratigraphischen Niveau wie die soeben beschriebenen Zähne dürften die folgenden aus dem Fall-Tobel geborgenen Reste stammen.

Nr. 1951 XXIV 4 (Taf. 9, Fig. 22 Stereo):

0,78 × 0,78; M₂ re. Zwei kurze, mäßig quergestreckte, hintereinander gelegene Wurzelstümpfe. Mäßig konkave Kronenoberfläche. Rechteckiger, hinten wenig verschmälerter und gerundeter Kronenumriß. Der Zahn ähnelt weitgehend dem oben beschriebenen Nr. 1952 XII 25 (S. 86; Taf. 9, Fig. 19). Dagegen ist die Brücke zwischen dem Paraconid-Grat und dem Protoconid um eine Nuance weniger hoch (allerdings am Original höher zu erkennen, als es nach Taf. 9, Fig. 22 den Anschein hat). Das Entoconid ist wiederum deutlich zu erkennen und steht mit dem Hypoconid-Grat nur über eine sehr schmale Brücke in Verbindung. Der hintere Zwischengrat ist etwas stärker nach außen gerückt als bei Nr. 1952 XII 25.

0,92 × 0,92; M^{1/2} re; leicht beschädigt. Kurze Stümpfe einer großen, längsgestreckten, hinten etwas verbreiterten, ovalen Innenwurzel und zweier kleinerer, rundlicher Außenwurzeln. Kronenoberfläche mäßig konkav. Kronenumriß rechteckig, vorne innen etwas gerundet. Das Vordercingulum ist lingual verstärkt, relativ stark usiert und ist nur durch eine sehr tiefe Brücke dem Protoconus verbunden. Labial endet das Vordercingulum ohne Verbindung zum Paraconus. Der Protoconus ist zu einem lingualen Wulst ausgezogen und die beiden Trigonum-Schenkel münden etwas voneinander entfernt ein, so daß das Trigonum etwas abgestumpft erscheint. Der vordere Trigonum-Schenkel steht über den ziemlich hoch aufragenden Paraconus-Wulst in kontinuierlicher Verbindung zum lingual etwas verdickt endenden vorderen Mittelgrat, welcher etwa drei Viretel der Trigonum-Breite erreicht. Der hintere Trigonum-Schenkel steht über den durch einen kleinen Schmelzdurchbruch markierten Metaconus in Verbindung mit dem hinteren Mittelgrat, welcher etwa bis zur Hälfte der Kronenbreite in das Trigonum-Lumen hineinreicht. Vom innen abgebrochenen Schlußcingulum ist eben noch die Verbindung zum Protoconus-Wulst zu sehen. Labial läuft das Schlußcingulum sich verjüngend, ohne Brücke, etwas einwärts hinter dem Metaconus aus. In der Kronenmitte liegt vor dem Mittelgrat ein kurzer Zwischengrat. Am lingualen Abfall des Protoconus-Wulstes sind Narben schwach angedeutet.

Nr. 1951 XXIV 2 (Taf. 9, Fig. 21 Stereo):

0,70 × 0,83; M³ re. Narben bzw. kurzer Ansatz einer großen, längsgestreckten, hinten verschmälerten Innenwurzel und zweier kleinerer Außenwurzeln. Mäßig, jedoch relativ schwach konkav. Kronenumriß etwa trapezoid, abgerundet eckig, hinten verschmälert. Das ziemlich gerade, lingual kantig verstärkte Vordercingulum ist dem Protoconus durch eine Brücke mit halb eingetiefter Furche verbunden. Außen endet es frei, Das Trigonum ist lingual durch eine ziemlich gerade Kante begrenzt, endet jedoch in seinem Lumen in einer abgestumpften Spitze. Der vordere Trigonum-Schenkel mündet mit einer Spitze in den hohen spitzen Höcker des Paraconus, welcher nach hinten und innen als Kante etwas abfällt und in einen sehr kurzen, kräftigen, bald im Lumen frei endenden vorderen Mittelgrat einmündet. Der Metaconus ist als verbreiterte Abkautfläche, ohne daß er sich erheben würde, gut kenntlich. Er steht durch eine schmale, schräg nach vorne innen führende Kante mit dem eigentlichen Mittelgrat in Verbindung. Das lingual verdickte Schlußcingulum ist dem Trigonum lingual völlig angeschweißt und endet labial frei.

Die drei von diesem Fundpunkt beschriebenen Zähne passen nach ihrer Größe gut zueinander und legen, da in diesem Fundpunkt die Gliriden sonst nur noch durch das völlig verschiedene Genus *Gliravus* vertreten sind, den Verdacht ihrer Zugehörigkeit zu einer Art sehr nahe. Der M^{1/2} paßt nach seiner Kronenstruktur gut zum unteren Molaren. Die Kronenstruktur des M³ kann noch als zu dieser Art passend angesehen werden. Er ist, von dem steil aufragenden Paraconus abgesehen, allerdings ziemlich flachkronig. Auch divergieren die beiden Trigonum-Schenkel verhältnismäßig wenig von innen nach außen.

Der vom Fall-Tobel vorliegende untere Molar liefert die Verbindung zu den beiden unteren Zähnen des Fundpunktes Gschwender Tobel I. Er könnte mit seiner geringfügig abgeschwächten Verbindung zwischen Protoconid und Paraconid-Grat und mit seiner ebenfalls schwächeren Verbindung zwischen Ento-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
conid und Hypoconid-Grat für geringfügig ursprünglicher als die Zähne vom Fundpunkt Gschwender Tobel I angesehen werden.

3. Fundpunkt R o t t e n b u c h

Nr. 1949 XXV 4 (Taf. 9, Fig. 1 Stereo):

0,79 × 0,72; M₁ re. Die Bewurzelung ist ausgebrochen. Kronenoberfläche konkav. Etwas abgerundet rechteckig, vorne verschmälerter Kronenumriß. Vorne und hinten Seitenusuren. Der Protoconid-Grat ist mit einer Spitze dem Metaconid-Labialabfall angesetzt. Er verläuft im Bogen nach außen. Das Protoconid ist als ovaler, nach vorne gezogener Pfeiler betont. Es ist mit dem Paraconid-Grat zusammengeheftet. Der Paraconid-Grat läßt das Paraconid als Verdickung nahe seinem Lingualende deutlich erkennen. Er geht in den kantigen Metaconid-Wulst über, welcher hinter einer hohen kantigen Kulmination an der Einmündungsstelle von Protoconid- und Mittelgrat jeweils etwas verstärkt ist. Vor der steil eingetieften Mittelfurche biegt vom Metaconid-Wulst rechtwinklig der lange Mittelgrat ab. Der vordere Zwischengrat wird durch einen Knoten vertreten. Der Mesoconid-Grat trifft etwa rechtwinklig auf den Innenrand und das Entoconid, welches, etwas verstärkt und sich nach hinten langsam verjüngend, eben noch kenntlich bleibt. Der Hypoconid-Grat holt bei diesem Stück besonders weit nach hinten aus und verstärkt sich mit Annäherung an das abgerundete winkelig vorgezogene Hypoconid. Der hintere Zwischengrat ist verhältnismäßig lang und in seiner Mitte kräftig.

Die beschriebenen Formen passen nach ihrer geringen Größe gut zusammen und unterscheiden sich darin von dem etwas größeren Typus des *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG). Die unteren Molaren weisen im Durchschnitt sehr geringfügig ursprünglichere Merkmale auf als der Typus von Gaimersheim. So ist die Verbindung zwischen Protoconid und Paraconid-Grat nicht immer so vollständig wie bei der Form von Gaimersheim und das Entoconid ist z. T. etwas stärker betont und gesondert.

Besondere Bedeutung kommt den Funden aus dem Fall-Tobel zu, weil sie die Zuordnung von Unterkiefer- und Oberkieferbeziehung liefern. Allerdings stimmt ein weiterer M^{1/2} (1952 XII 3, S. 90; Taf. 7, Fig. 12 Stereo) von Steineberg I nicht ganz zum M² re. vom Fall-Tobel, da er eine Verbindung vom Vordercingulum zum Protoconus aufweist und weil sein Trigonum stärker zur Gestalt eines offenen Vierecks tendiert, Eigenschaften, die ihn in die Verwandtschaft von *Microdyromys* DE BRUIJN verweisen. Dabei erscheint die Verbindung von Protoconus und Vordercingulum bei diesem Zahn zu deutlich, als daß man sie nur mit dem stark abgekauten Zustand dieses Zahnes erklären könnte. Da man den Funden vom Fall-Tobel doch die größere Bedeutung beimessen möchte, wird die Art beim Genus *Peridyromys?* belassen. Daß die Abspaltung des Genus *Microdyromys* von einer der vorliegenden nahestehenden Art erfolgt sein muß, wird durch das Relief der Oberkieferzähne bestätigt. Denn *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN bewahrt eine mit der vorliegenden Unterart von *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG) etwa gleiche Ausbildung der Mittelgrate und des Zwischengrats. Es unterscheidet sich nur durch das für *Microdyromys* typische feine Schmelzrelief und die endgültige Verbindung zwischen Vordercingulum

und Protoconus. Die untypischeren Unterkieferzähne der vorliegenden Form zeigen ohnedies ein Schmelzrelief, das demjenigen von *Microdromys koenigswaldi* DE BRUIJN weitgehend ähnlich ist. Wenn DE BRUIJN 1965 die Art von Gaimersheim als „*Microdromys praemurinus* FREUDENBERG“ auffaßt, so deutet sich in dieser Zuweisung nur ein sehr geringer Unterschied zur Auffassung des Verfassers an. Dagegen kann der Verfasser zum Genus *Glirudinus* DE BRUIJN nach der Kronenstruktur der Unterkieferzähne keine nähere Verwandtschaft der vorliegenden Form sehen, wie DE BRUIJN 1966 (S. 12) sie andeutet.

Schwieriger sind die Besonderheiten der unteren Molaren zu deuten. Die kräftige klotzige Ausbildung der Außenhöcker und ihre Tendenz, nach vorne abzuknicken (Nr. 1952 XII 23, Taf. 9, Fig. 18; Nr. 1949 XXV 4, Taf. 9, Fig. 1), sowie die gelegentliche Neigung zu Längsverbindungen zwischen Graten (Nr. 1952 XII 23, Taf. 9, Fig. 18) könnten trotz der Konkavität der vorliegenden Zähne darauf hindeuten, daß sie nicht sehr ferne gemeinsame Vorfahren mit dem Genus *Glis* besitzen.

c) *Peridyromys? praemurinus* nov. subsp. A?
Taf. 7, Fig. 12 (Stereo)

Mit einigem Vorbehalt wird an die vorher besprochene Unterart ein oberer Molar angeschlossen.

Fundpunkt Steine-Berg I

Nr. 1952 XII 3 (Taf. 7, Fig. 12 Stereo):

0,81 × 0,88; M² li. Ziemlich kräftig abgekaut. Ansätze einer längsgestreckten kräftigen Innenwurzel und zweier ovaler kleinerer Außenwurzeln. Der Zahn ähnelt dem Stück Nr. 1951 XXIV 3 (S. 88; Taf. 9, Fig. 20 Stereo) vom Fall-Tobel. Jedoch ist sein Lingualende des Vordercingulums deutlich mit dem Protoconus verbunden. Die Ansatzstellen des Paracon- und Metacon-Grats am Innenwulst liegen außerdem beim Stück von Steine-Berg I etwas deutlicher von einander entfernt und so erscheint das Trigonum hier deutlich seiner Spitze beraubt. Auch ist der Zahn von Steine-Berg I kleiner als derjenige vom Fall-Tobel.

d) *Peridyromys?* nov. spec. B³)

Taf. 7, Fig. 16 (Stereo); Taf. 8, Fig. 1 (Stereo), 9 (Stereo), 10 (Stereo), 11 (Stereo), 12 (Stereo)

D i a g n o s e: Mit ähnlichem Kronenrelief wie bei *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG), jedoch deutlich größer, mit etwas stärker konkaver Kronenoberfläche und mit relativ feinerem Schmelzrelief als dieser.

³) Da Art und Unterart nomenklatorisch gleichen Rang besitzen, wird hier eine neu beschriebene Unterart des *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG) mit „A“, eine neue Art von *Peridyromys?* mit „B“ bezeichnet.

1. Fundpunkt Schindelwies-Graben

Nr. 1951 XXIII 12 (Taf. 8, Fig. 11 Stereo):

1,12 × 1,21; $M_{1/2}$ li. Bewurzelung nicht sicher erkennbar; Narben vermutlich zweier vorderer, etwas zusammengehefteter Wurzeln und einer hinteren, in der Mitte etwas eingeschnürten Querwurzel. Kronenoberfläche stark konkav; Kronenumriß gerundet rechteckig, vorne schwach verschmälert; Berippung fein. Der Protoconid-Grat setzt mit einer Spitze am kronenwärtigen Abhang des Metaconid-Wulstes an und verschmilzt mit der Mitte des schräg etwas gelängten Protoconids. Protoconid und Paraconid-Grat sind durch eine Furche getrennt; beide laufen jedoch mit ihren Kanten in diese Furche hinab und verengen sie am Kronenaußenrand schwach, indem sie dort eine sehr tiefe Brückenkante bilden. Der Paraconid-Grat ist labial etwas verstärkt. Er geht in den hohen und nach hinten zu auch kaum abfallenden Metaconid-Wulst über, welcher erst vor der Mittelfurche plötzlich steil geneigt abfällt. Im unteren Teil des kronenwärtigen Hangs beginnt an diesem Hinterende des Metaconid-Wulstes, ihm durch eine nach oben auslaufende, feine Kante verbunden, der Mittelgrat; er ist bei diesem Exemplar mit dem Protoconid verwachsen. Der ovale kräftige Pfeiler des Entoconids ist völlig mit dem Hypoconid-Grat verschmolzen. Dieser fällt bis zum inneren Kronendrittel gleichmäßig ab und steigt bis zum Hypoconid, einem vorgezogenen ovalen Knoten, wieder gleichmäßig an. Der Mesoconid-Grat ist dem vorderen kronenwärtigen Abfall des Entoconids mit einer Spitze in der Tiefe angelegt. Er zeigt im inneren Kronendrittel eine nur tief überbrückte Unterbrechung. Vorderer und hinterer Zwischengrat sind lang und kräftig. Vom hinteren Zwischengrat aus führt im inneren Kronendrittel eine kurze knotig endende Abzweigung nach rückwärts.

Nr. 1951 XXIII 5 (Taf. 8, Fig. 12 Stereo):

1,07 × 1,08 M_3 re. Ansatz einer quergestreckten, in der Mitte vorne etwas eingeschnürten, außen längsovalen, innen gedrungen ovalen Vorderwurzel, die eine Pulpa geringen Durchmessers zeigt; dahinter Narbe einer großen, rundlichen Hinterwurzel. Kronenoberfläche mäßig konkav; abgerundet trapezoider, hinten verschmälertes Umriß; Berippung fein. Der Protoconid-Grat setzt unten am kronenwärtigen Abhang des Metaconid-Wulstes an. Paraconid-Grat und Protoconid sind aneinander geheftet, jedoch noch durch eine halb eingeschnittene Furche geschieden. Der Paraconid-Grat ist labial verstärkt und reicht bis zum Außenrand. Er geht in den hohen Metaconid-Wulst über, der an der vorderen Innenecke des Zahnes kulminiert und dann sehr schwach bis vor die Mittelfurche abfällt. Der Metaconid-Wulst verbindet sich abgerundet abwinkelnd mit dem langen Mittelgrat. Der Mesoconid-Grat ist mit einer Spitze dem Entoconid unten quer angesetzt. Das kräftige ovale Entoconid verbindet sich, langsam nach hinten abfallend, in einer verschmälerten Stelle mit dem Hypoconid-Grat. Vorderer und hinterer Zwischengrat sind kräftig und lang.

Nr. 1951 XXIII 9 (Taf. 8, Fig. 10 Stereo):

0,93 × 0,92; P_4 li. Kurzer Stumpf einer kleinen rundlichen Vorderwurzel und Narbe, vermutlich einer quergestreckt ovalen großen Hinterwurzel; hinterer Teil der Bewurzelung nicht ganz klar erkennbar. Kronenoberfläche mäßig bis schwach konkav; gerundet trapezoidischer, vorne verschmälertes Umriß, ziemlich feine Berippung. Der Protoconid-Grat ist dem Metaconid-Wulst etwa rechtwinkelig angeschweißt und steht auch mit dem Paraconid-Grat in Verbindung. Der Metaconid-Wulst kulminiert vor der Einmündungsstelle des Protoconid-Grats und verläuft noch weiter hinter dieser geradlinig fort bis vor die Mittelfurche. Der lange Mittelgrat verbindet sich nur über eine feine tiefe Kante mit dem Ende dieser Verlängerung des Metaconid-Wulstes. Der Mesoconid-Grat ist bei diesem Stück im inneren Kronendrittel unterbrochen. Sonst besteht von ihm über das kaum angedeutete Entoconid in fortlaufendem Bogen eine Verbind-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
dung zum Hypoconid-Grat. Der hintere Zwischengrat ist kräftig und füllt in der Länge einen großen Teil des vor dem Hypoconid-Grat gelegenen Lumens. Auch ein vorderer Zwischengrat ist vorhanden.

Nr. 1951 XXIII 8 (Taf. 8, Fig. 9 Stereo):

1,10 × 1,18; M^{1/2}, wohl M¹ re. Bewurzelung schwer erkennbar; Narben und Ansätze wohl von zwei Außenwurzeln und einer größeren längsgestreckten Innenwurzel. Stark abgekaut und wohl auch etwas korrodiert. Stark konkave Kronenoberfläche. Umriß gerundet rechteckig, vorne etwas verschmälert. Ziemlich feine Berippung. Das Vordercingulum scheint dem Trigonum nur angelegt, nicht lingual mit ihm verwachsen zu sein, da die sonst weitgehend vorhandenen Dentinaufbrüche in dem Verbindungsstück fehlen. Die vordere Außenecke des Zahnes ist nicht einfach zu deuten. Folgende Lösung wird bevorzugt: Das Vordercingulum mündet in eine knotige Verdickung ein, welche bei diesem Stück, vor dem Paraconus gelegen, sich eventuell von diesem abgespalten hat und vom eigentlichen Paraconus-Wulst durch eine tiefe Querfurche getrennt wird. Der vordere Trigonum-Schenkel erreicht den Paracon-Wulst nicht, sondern biegt vorher scharf ab, um sich schlängelnd schließlich mit dem Mittelgrat zu vereinigen; dieser besitzt außerdem die übliche Verbindung zum Hinterende des Paracon-Wulstes. Von der labialen Knickstelle des vorderen Trigonum-Schenkels ist eine tiefe Verbindung zur Labialverdickung des Vordercingulums gewachsen. Der Mittelgrat greift bis unmittelbar vor den Protoconus in das Lumen ein und endet mit einer Verdickung. Vor ihm liegt ein Zwischengrat. Dieses Exemplar besitzt außerdem einen langen, gegliederten und schwachen Zwischengrat unmittelbar hinter dem Vordercingulum. Vorderer und hinterer Trigonum-Schenkel münden in einiger Entfernung voneinander in den Protocon-Wulst ein, welcher das Trigonum lingual etwas schräg abschneidet. Der hintere Trigonum-Schenkel endet abgerundet am kronenseitigen Abhang des kräftigen durch zwei Dentin-Durchbrüche betonten Metaconus-Wulstes. Dieser entsendet vorne rechtwinkelig den ziemlich langen hinteren Mittelgrat und geht nach hinten in das Schlußcingulum über, welches mit dem Protocon-Wulst lingual verwachsen war.

2. Fundpunkt S c h l e i f m ü h l e I

Nr. 1951 XXIII 1 (Taf. 7, Fig. 16 Stereo):

1,04 × 1,04; M₃ re. Bewurzelung ausgebrochen; zusammenhängendes Narbenfeld einer quergestreckten oder zweier kleinerer Vorderwurzeln und einer rundlichen großen Hinterwurzel. Kronenoberfläche mäßig konkav; Umriß abgerundet trapezoid, hinten verschmälert und rund; Berippung ziemlich fein bis mäßig kräftig. Der Zahn stimmt nach Größe und Kronenstruktur im wesentlichen mit dem M₃ re. Nr. 1951 XXIII 5 (S. 91; Taf. 8, Fig. 12 Stereo) überein. Er unterscheidet sich von ihm in Einzelheiten. So besteht bei ihm eine Verbindungskante zwischen Protoconid und Paraconid-Grat. Sein Paraconid ist als Gratverdickung angedeutet; jedoch fehlt die unmittelbar labiale Verdickung des Paraconid-Grats von Nr. 1951 XXIII 5. Vom hohen Metaconid-Wulst ist beim vorliegenden M₃ durch eine nicht ganz vollständige Einschnürung ein tieferes Pfeilerchen, dem sich der Mittelgrat verbindet, gesondert. Der hintere Innenrand des vorliegenden M₃ ist abgebrochen. Vermutlich vertritt die knotige linguale Verdickung des Mesoconid-Grats das Entoconid und wird durch einen tiefen Abfall von dem dahinter verschmälert einsetzenden Hypoconid-Grat geschieden.

3. Fundpunkt G s c h w e n d e r T o b e l I I

Nr. 1952 XII 27 (Taf. 8, Fig. 1 Stereo):

1,09 × ?; Bruchstück eines M^{1/2} li. Eine längsgestreckte Innenwurzel. Außenbewurzelung abgebrochen. Kronenoberfläche kräftig konkav. Umriß vermutlich gerun-

det viereckig und vorne verschmälert. Ziemlich stark abgekaut. Das Vordercingulum besaß lingual eine kräftige Verdickung, welche jetzt einen tiefen Schmelzdurchbruch aufweist. Es stand vermutlich über eine etwas eingetiefte Brücke im Zusammenhang mit dem Protoconus. Der Innenwulst ist an der Einmündungsstelle des Paracon-Grats und darüber hinaus reichend verstärkt und dort wohl als Vertretung des Protoconus aufzufassen. Unweit dahinter mündet der vordere Mittelgrat, welcher lingual verstärkt ist, in den Innenwulst. In größerem Abstand liegt dahinter die Einmündungsstelle des nahe seinem Lingualende verdickten Metacon-Grats. Der Hypoconus zeichnet sich verhältnismäßig wenig als linguale Verstärkung des Schlußcingulums ab und steht in guter, nur wenig eingetiefter Verbindung mit dem Innenwulst. Der hintere Mittelgrat ist schwächer als der vordere und reicht bis zum inneren Kronendrittel. Vor dem vorderen Mittelgrat liegt ein Sekundärgrätchen und steht mit ihm in Verbindung. Hinter dem Vordercingulum befindet sich in der äußeren Kronenhälfte ein schwacher Zwischengrat.

Der Fundpunkt Schindelwies-Graben lieferte vier nach Größe und Struktur gut als zusammengehörig zu erkennende Zähne. Unbedenklich dürfen wohl Nr. 1952 XII 27 und Nr. 1951 XXIII 1 (Taf. 8, Fig. 1; Taf. 7, Fig. 16 Stereo) angeschlossen werden. Die vorliegende Art gleicht *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG) in der Kronenstruktur weitgehend. In den unteren Molaren sind die beiden Zwischengrate vorhanden und der Mittelgrat reicht weit nach außen. In den M^1 und M^2 ist bei beiden Arten ein schwacher Zwischengrat vor dem Paracon-Grat vorhanden. Bei beiden besteht die Tendenz, das Vordercingulum an den Protoconus anzuheften. Die vorliegende Art unterscheidet sich von *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG) durch ihre starke Kronenkonkavität, durch relativ feinere Berippung der Zähne und durch die bedeutendere Größe. Auch bei den nicht konstant erscheinenden Eigenschaften — eine endgültige Kritik müßte sich hier auf reicheres Material gründen — sind Unterschiede in der Tendenz zu erkennen. So besitzen von der vorliegenden Art die unteren Molaren bei Nr. 1951 XXIII 12 u. 5 (S. 91; Taf. 8, Fig. 11 Stereo, 12 Stereo) keine Verbindung zwischen Paraconid-Grat und Protoconid oder diese sind dort nur aneinandergelegt und sie münden mit dieser Furche nach außen, nicht schräg vorne. Dagegen sind, wie bei *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG), Paraconid-Grat und Protoconid durch eine Brücke verbunden bei Nr. 1951 XXIII 9 und 1 (S. 91; Taf. 8, Fig. 10 Stereo; S. 92; Taf. 7, Fig. 16 Stereo). Im oberen M^1 und M^2 sind bei beiden Stücken der vorliegenden Art (Nr. 1951 XXIII 8, S. 92, Taf. 8, Fig. 9 Stereo; Nr. 1952 XII 27, S. 92, Taf. 8, Fig. 1 Stereo) die Vordercingula mehr oder weniger dem Trigonum angelegt, während von *Peridyromys? praemurinus* nov. subsp. A bei Nr. 1951 XXIV 3 eine solche Verbindung nicht existiert, wohl bei Nr. 1952 XII 3 (S. 88, Taf. 9, Fig. 20 Stereo bzw. S. 90, Taf. 7, Fig. 12 Stereo).

Gegenüber den von VIRET 1929 (S. 67—70) als „*Dryomys (Myoxus) murinus* POMEL“ von St. Gérard berichteten Funden und gegenüber der von DEHM 1950 (S. 375—379) als „*Dryomys murinus* POMEL“ aus dem Burdigal bekannt gemachten Art besitzt die hier vorliegende Form etwas kompliziertere Kronenstruktur. Diese äußert sich bei den Unterkieferzähnen in konstanterer und längerer Ausbildung

der beiden Zwischengräte und in der größeren Länge des Mittelgrats, bei den M^1 und M^2 im Vorhandensein eines hinter dem Paracon-Grat gelegenen Zwischengrats und auch eines schwachen vor dem Paracon-Grat angedeuteten Zwischengrats sowie in der mehr oder weniger erreichten Anheftung des Vordercingulums an den Protoconus. In allen diesen Eigenschaften besteht eine viel weitgehendere Übereinstimmung der vorliegenden Art mit *Peridyromys? praemurinus* (FREUDENBERG) sowie eine mit dieser Art gemeinsame Verwandtschaft zum Genus *Microdyromys* DE BRUIJN.

e) *Peridyromys?* nov. spec. B?

Taf. 8, Fig. 8 (Stereo)

Fundpunkt Schindewies-Graben

Nr. 1951 XXIII 6

? $\times 1,29$; Bruchstück eines $M^{1/2}$ li. Narben einer schräggerichteten hinteren Außenwurzel und hinterer Teil des Ansatzes einer Innenwurzel. Kronenoberfläche kräftig konkav. Der Metacon-Grat mündet offenbar in großem Abstand vom abgebrochenen Paracon-Grat in den an seinem hinteren Ende nicht sehr kräftigen kantigen Innenrand. Das lingual kaum verstärkte Schlußcingulum steht lingual über eine halb eingetiefte Brücke in mäßiger Verbindung zum Trigonum. Der Kroneninnenrand weist an seiner Lingualwand deutliche streifige Narben auf. Labial ist das Schlußcingulum dem Metacon-Grat angelegt. Der Metacon-Grat steht über den Metaconus in bogiger Verbindung zum hinteren Mittelgrat. Vom vorderen Mittelgrat ist die innen im Trigonum-Lumen frei endende Innenverstärkung erhalten. Hinter dem hinteren Mittelgrat ist ein kurzes, schwaches Sekundärgrätchen vorhanden.

Das Stück ist zu schlecht erhalten, um eine sichere Bestimmung zu gestatten, stimmt jedoch, soweit erhalten, mit der vorher behandelten Art überein.

f) *Peridyromys?* spec. indet.

Taf. 9, Fig. 12, 14

Fundpunkt Gschwender Tobel

Nr. 1952 XII 26 (Taf. 9, Fig. 14):

Schätzungsweise $0,9 \times$ schätzungsweise $1,0$; Kronenbruchstück eines $M_{1/2}$ re. Ziemlich stark abgekaut. Stark beschädigt. Bewurzelung nicht erhalten. Am erhaltenen Stück nur schwache Konkavität zu erkennen. Wie beim beschädigten Protoconid nicht sicher entschieden werden kann, jedoch angedeutet ist, biegt der Mesoconid-Grat vor Erreichen des Außenrandes schräg nach vorne ab, und zwar der Vorderrand schon etwas weiter innen als der Hinterrand. Ein ähnliches Abbiegen schräg nach vorne, insgesamt weiter innen gelegen, zeigt der Hypoconid-Grat. Das Mesoconid zeigt deshalb die Form eines abgerundeten Dreiecks, das längere Hypoconid die Gestalt eines abgerundeten, vorne verschmälerten Trapezes. Der vor dem Mesoconid-Grat gelegene Mittelgrat reicht bis zur Kehle des Mesoconids. Der vor dem Hypoconid gelegene etwas geschlängelte Zwischengrat erstreckt sich über etwa zwei Drittel der Kronenbreite. Die Grate verlaufen etwa transversal. Der Mesoconid-Grat und der dahinter gelegene Zwischengrat sind etwas einwärts der Kronenmitte ein bißchen nach vorne eingeknickt.

Nr. 1952 XII 22 (Taf. 9, Fig. 12):

Ca. $1,05 \times ?$; Bruchstück eines $M^{1/2}$ re. Stark abgekaut. Narbe vermutlich einer Innenwurzel. Am erhaltenen Teil Konkavität nur schwach angedeutet. Das Vordercingulum ist dem vorderen Trigonum-Schenkel durch eine etwas verschälerte Brücke am Lingualrand fest verbunden. Der Lingualrand des Trigonums ist weit ausgezogen zu einem langen Protoconus-Wulst, welcher an den beiden Einmündungsstellen der Trigonum-Schenkel zu stärkeren Dentin-Durchbrüchen abgekaut und in der Mitte etwas verbreitert ist, wo sich ihm die Spitze eines Mittelgrats anheftet. Dem vorderen Mittelgrat ist, gerade noch erkennbar, etwas innerhalb der Kronenmitte wohl der hintere Mittelgrat angeheftet. Jedoch geht vom hinteren Mittelgrat an der Vereinigungsstelle ein kurzer, undeutlich abgegrenzter Sporn aus, schräg nach hinten und vor allem nach innen führend. Das Hintercingulum ist am Lingualende etwas verstärkt, mit erweitertem Dentin-Durchbruch versehen und mit dem Trigonum verbunden. Der Lingualrand ist als auffallend gerade Kante ausgebildet, wobei nur das Innenende des Vordercingulums schwach aus dieser Flucht nach auswärts versetzt ist.

Die beiden Stücke sind bei dem bis jetzt vorliegenden Material schwer einzuordnen, vor allem wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes. Auch ihre Zugehörigkeit zu einer Art ist nicht gesichert. Nr. 1952 XII 22 (Taf. 9, Fig. 12) stimmt in Größe und erhaltener Struktur gut zu dem Stück Nr. 1951 XXIII 8 (S. 92; Taf. 8, Fig. 9) und ist kaum kleiner als dieses, jedoch zu schlecht erhalten, um einen sicheren Vergleich zuzulassen.

Nr. 1952 XII 26 (Taf. 9, Fig. 14) besitzt relativ feines Relief und ist vermutlich etwas kleiner als das Stück Nr. 1951 XXIII 12 (S. 91; Taf. 8, Fig. 11). Leider ist gerade sein Vorderrand abgebrochen.

g) Gliridae, spec. inc. subfam.

Taf. 9, Fig. 16

Fundpunkt Gschwendner-Tobel I

Nr. 1952 XII 20

$0,80 \times 1,02$; M^1 oder P^4 re., wohl P^4 re. Eine kräftige, runde Innenwurzel, vordere ovale und kleinere hintere rundliche Außenwurzeln als Ansätze; mäßig stark angekaut. Das Vordercingulum ist dem Paraconus angelegt, ist in seinem Mittelteil lang wulstig und an seinem Lingualende etwas verstärkt und verbindet sich lingual im inneren Kronenviertel dem Vorderabhang des inneren Trigonum-Vorderarms; dieser kommt ihm durch eine dort gelegene, vorwärts gerichtete Verbiegung entgegen. Der vordere Trigonum-Schenkel schwingt außerdem auch in seinem Hauptverlauf schwach nach vorne aus. Der Paraconus ist ein kräftiger Höcker und entsendet einen etwas geschlängelten, ziemlich kräftigen vorderen Mittelgrat, dem sich ein vom Metaconus kommendes schwaches Grätchen anheftet. Hinter dem vorderen Mittelgrat liegt in der Kronenmitte ein niedriges Höckerchen. Vom angekauften und an Höhe dem Paraconus nachstehenden Metaconus zieht sich in geschwungenem Verlauf die ziemlich kräftige und gleichmäßige hintere Trigonum-Kante zum wulstigen im Trigonum aufgegangenem Protoconus. Das Hintercingulum ist labial an den Metaconus angeheftet und läßt dort an einer etwas verstärkten Abkaunarbe eine schwache Verstärkung erkennen. Insgesamt verstärkt es sich hauptsächlich gegen das Lingualende, welches mit dem Protoconus durch eine kräftige wulstige Brücke verbunden ist. Eine sehr schwache Verstärkung des Schlußcingulums deutet sich auch etwas einwärts von seiner Mitte an.

Der hier vorliegende Zahn ist als P^4 mangels weiteren Materials nicht für eine sichere Bestimmung geeignet. Er würde nach Kronenkomplikation und nach seiner Größe zu *Peridyromys*? nov. spec. B passen. Jedoch ist eine ähnliche Kronenstruktur auch von Vorläufern des *Glis*? *gregarius* (DEHM) zu erwarten.

h) *Peridyromys*? spec. indet.

Taf. 9, Fig. 2 (Stereo), 7, 9, 10 (Stereo), 11

Fundpunkt P f a r r - A l p e lieferte unter anderem folgende fünf Zähne, die eventuell zusammengefaßt werden dürfen.

Nr. 1952 XII 35 (Taf. 9, Fig. 2 Stereo):

? \times 1,29; Bruchstück eines $M^{1/2}$, wohl M^2 li. Stümpfe einer kräftigen, längsgestreckten Innenwurzel und zweier kleiner ovaler Außenwurzeln. Ziemlich kräftig konkav. Ursprünglich vermutlich etwas gerundet rechteckiger Kronenumriß. Teil des Metacon-Grats und Schlußcingulum abgebrochen. Ziemlich feines Schmelz-Relief. In den geraden Innenrand münden lingual das sehr schwach verstärkte Vordercingulum, der Paracon-Grat und ziemlich weit davon entfernt der Metacon-Grat ein. Das Vordercingulum bleibt labial durch eine Furche vom Paraconus-Wulst getrennt. Hinter ihm ist im äußeren Kronendrittel ein kurzes Zwischengrätchen eingeschaltet. Der Paracon-Grat weist in seinem Ansatz am Paraconus eine starke Einschnürung auf, so daß er diesem nur mit einer Spitze anliegt. Dagegen entsendet der hohe kräftige Paraconus, welcher zu einem kurzen Längswulst ausgezogen ist, in kontinuierlichem Übergang nach rückwärts den vorderen Mittelgrat. In der Kronenmitte wird der vordere Mittelgrat sehr schmal, knickt schräg nach hinten ab und teilt sich in eine kurze Längsverbindung zum vermutlichen hinteren Mittelgrat und in das transversal weiter verlaufende, lingual verstärkte Stück. Dem Metaconus ist am vorderen Innenhang ein kurzes Grätchen angesetzt, welches im äußeren Kronenviertel nach hinten abknickt und sich mit einem unmittelbar dahinter gelegenen, transversalen, bis über die Kronenmitte führenden Grastück vereinigt. Der hintere Abhang des Metaconus-Wulstes scheint sich in Metacon-Grat und Schlußcingulum verzweigt fortgesetzt zu haben.

Der beschriebene $M^{1/2}$ besitzt geringfügig höhere Komplikation als *Peridyromys*? nov. spec. B und ist etwas feinrippiger. Jedoch ist das Relief etwas gröber als beim Genus *Microdyromys* DE BRUIJN.

Nr. 1952 XII 29 (Taf. 9, Fig. 9):

1,12 \times 1,07; $M_{1/2}$, wohl M_2 li. Stümpfe zweier quergestreckter Wurzeln, von denen die vordere aus zwei Wurzeln verwachsen ist, wobei der Außenteil der Vorderwurzel ganz erhalten ist und das Foramen an seiner Spitze erkennen läßt. Die beiden Wurzeln sind an ihrem Hals weit verwachsen. Umriß gerundet rechteckig. Abgekaut fast ohne Konkavität. Der Zahn ist sehr stark abgekaut und wird entlang seinem Lingualrand vollständig von einem breiten Dentin-Durchbruch eingenommen, welcher mit den Dentin-Durchbrüchen der Hauptgrate und der beiden Nebengrate kommuniziert. Auf der weniger stark abgekauten Labialseite zeigt sich, daß die Grate relativ steil und hoch aus dem Zahngrund aufragen. Der Paraconid-Grat ist ziemlich gleichbleibend mäßig kräftig ausgebildet und bleibt vom Protoconid durch eine Furche getrennt. Der Protoconid-Grat verläuft fast gerade, nur sehr schwach gebogen und in ziemlich gleichbleibender Stärke schräg nach vorne. Der Mesoconid-Grat ist ebenso kräftig, eher noch ein wenig stärker. Sein äußerer Teil ist jedoch etwas stärker nach vorne gebogen und läuft etwas spitzer aus als das in diesem Pfeiler plötzlich endende Protoconid. Der Hypoconid-

Grat ist in seinem mittleren Verlauf etwas gebogen und verläuft etwa transversal. Außen ist er ziemlich scharf bogig nach vorne abgewinkelt. Vor dem Protoconid-Grat liegt ein Zwischengrat, an dessen Rückseite nicht abgekaute, demnach nur wenig aus dem Kronengrund aufragende, mit gekörnter Oberfläche versehene Höckerchen die Furche zum Protoconid-Grat in ihrer Tiefe zum Teil verringern. Der Mittelgrat und der hintere Zwischengrat nehmen drei Viertel der Kronenbreite ein.

Eine zufriedenstellende Zuordnung des vorliegenden Zahnes ist schwer zu finden. Die Flachkronigkeit, welche eventuell nur durch völliges Abkauen des Innenrandes vorgetäuscht ist, und die im frischeren Zustand eventuell mangelnde Verbindung des Mittelgrats zum Metaconid könnten als Anklänge an das Genus *Glis* gedeutet werden. Vorläufig wird der Zahn jedoch mit konkaven unteren Molaren sonst ähnlicher Struktur aus dem Allgäuer Fundpunkt Greifen-Mühle von der Grenze Chattium/Aquitantium verglichen und unter Vorbehalt dem M^{1/2} Nr. 1952 XII 35 (S. 96; Taf. 9, Fig. 2 Stereo) zugeordnet.

Nr. 1952 XII 34 (Taf. 9, Fig. 11):

1,13 × 1,05; M^{1/2}, wohl M¹ li. Stark abgekauft. Stümpfe einer kräftigen, ovalen, längsgestreckten Innenwurzel und zweier kleiner rundlicher Außenwurzeln. Kronenoberfläche in der Mitte etwas durchbrochen; Umriß etwas gerundet rechteckig, vorne wenig verschmälert. Das labial tief und breit aufgekaute Vordercingulum ist dem Paracon-Wulst vorne angelegt. Lingual besitzt es eine Verbindung zum Protoconus, so daß der gerade Zahninnenrand bis vorne verlängert wird. Der Paracon-Grat steht über den hohen Paraconus in bogiger Verbindung zum vorderen Mittelgrat, welcher sich am Innenende verstärkt dem Protocon-Wulst innen anlegt. Vor ihm befindet sich ein kräftiger Zwischengrat. Am Innenwulst ist außer den beiden von einander entfernt liegenden verstärkten Einmündungsstellen des Paracon- und Metacon-Grats auch ein mittlerer Teil bis zum Dentin aufgekauft. Der hintere Trigonum-Schenkel steht über den nicht ganz die Höhe des Paraconus erreichenden Metaconus in geschwungener Verbindung zum hinteren Mittelgrat; dieser endet etwa in der Kronenmitte und hinter ihm kann vague noch ein Zwischengrätchen erkannt werden. Das Schlußcingulum ist labial dem Metacon-Wulst hinten angelegt. Es ist lingual beschädigt. Es darf vermutet werden, daß vor der Beschädigung eine Verbindung zum Protoconus-Wulst bestand.

Der beschriebene Zahn besitzt ähnlichen Bauplan wie *Peridyromys?* nov. spec. B, weicht von dieser Form jedoch durch seine stärkere Konkavität und seine im Verhältnis zur Länge geringe Breite ab. Der Zahninnenrand ist noch gerader gebaut. Die gute Verbindung zwischen Vordercingulum und Protoconus-Wulst kann durch starkes Abkauen zu sehr unterstrichen sein. Die Gemeinsamkeiten zu *Microdyromys* treten deshalb noch stärker hervor. Nur das Schmelzrelief ist nicht so fein und steil wie beim Genus *Microdyromys* DE BRUIJN ausgebildet.

Nr. 1952 XII 30 (Taf. 9, Fig. 7):

0,82 × 0,93; P⁴ oder M¹, wohl P⁴ re. Stark abgekauft. Stümpfe einer kräftigen rundlichen Innenwurzel und zweier kleinerer Außenwurzeln, von denen die vordere rundlich und etwas stärker, die hintere kleiner und etwas quergestreckt ist. Die drei Stümpfe sind an ihrem Hals in der Mitte etwas miteinander verwachsen. Kronenoberfläche konkav. Abgerundet rechteckiger, vorne innen stark abgerundeter Umriß. Das Vordercingulum geht in abgerundetem Verlauf in den vorderen Innenrand des Trigo-

nums über. Auch labial ist es mit dem weitgehend abgekauten Paraconus-Wulst verbunden. Über diesen hängen in kontinuierlichem Bogen der Paracon-Grat und der vordere Mittelgrat, welcher am Innenende verstärkt ist, zusammen. Vor dem Mittelgrat liegt ein kurzes Zwischengrätchen. Der Metacon-Grat mündet nahe dem Paracon-Grat in den bogenförmig geschwungenen Zahninnenwulst ein, so daß das Trigonum im Lumen ziemlich spitz endet. Labial ist der Metacon-Grat völlig dem Metaconus verbunden, dem sich der zarte hintere Mittelgrat am vorderen Innenhang verbindet. Auch das Schlußcingulum ist dem Metaconus verbunden. Lingual ist es mit seinem verstärkten Innenende vollständig dem Protoconus-Wulst verschweißt.

Nach seiner Bewurzelung wird der vorliegende Zahn als P¹ aufzufassen sein und nach seinem Kronenrelief mit Nr. 1952 XII 34 (S. 97; Taf. 9, Fig. 11) zusammen einer Art angehören. Die etwas bedeutend erscheinende Größe wird als im Variations-Bereich gelegen aufgefaßt werden dürfen.

Nr. 1952 XII 38 (Taf. 9, Fig. 10 Stereo):

0,89 × ca. 1,03; M³ re.; innen und hinten außen etwas beschädigt. Bewurzelung ausgebrochen. Mäßig konkave Kronenoberfläche. Das lingual etwas verstärkte Vordercingulum ist mit dem Protoconus-Wulst verbunden. Labial geht es in den tief aufgekauften Paraconus über, von wo nach rückwärts und innen wohl der vordere Mittelgrat weiterführt. Der Paracon-Grat läuft etwa dem Vordercingulum parallel. Der Metacon-Grat mündet in ziemlich großem Abstand vom Paracon-Grat in den Innenrandwulst ein. Er verläuft von dort zunächst etwas, später stärker schräg nach hinten außen, um etwas auswärts einer am Zahnrand noch erhaltenen Verdickung, die wohl dem Metaconus entspricht, den hinteren Zahnaußenrand zu erreichen. Von dort dürfte eine vage Erhebung des Kronenbodens ausgehen, die vermutlich dem hinteren Mittelgrat entspricht. Der abgetrennte linguale Teil des vorderen Mittelgrates wird vermutlich durch ein Gratstück vertreten, das von einem vor dem Metacon-Grat gelegenen Knoten aus einwärts führt, wo es sich, lingual schwach verstärkt, mit dem Innenwulst verbindet. Vor dem vorderen Mittelgrat liegt ein langer Zwischengrat, welcher in der Kronenmitte, wohl in einer abgeschliffenen Aufkaufäche, verzweigt erscheint. Hinter dem vorderen Mittelgrat reicht der Kronenboden bis zum Zahnrand, wird dort jedoch durch eine sehr schwache Erhebung nochmals gliedert.

Der vorliegende Zahn fällt durch seine besonders niedere Berippung auf. Er dürfte stark usiert sein. Da er außerdem randlich Beschädigungen aufweist, ist er im Wert sehr gemindert.

i) *Peridyromys?* spec. indet.

Taf. 9, Fig. 13

Fundpunkt Gschwender Tobel I

Nr. 1952 XII 24

1,03 × ca. 0,97; M₃ li. Etwas beschädigt. Etwas abgekaut. Kräftige Hinterwurzel; davor der Ansatz zweier am Hals verwachsener, eventuell nur einer quergestreckten Vorderwurzel. Mäßig konkav. Das etwas beschädigte Metaconid entsendet nach vorne den Paraconid-Grat mit zwei Verdickungen, einer sehr schwachen etwa in der Mitte gelegenen und einer schwachen am Ende. Der sehr kräftige Protoconid-Grat ist mit seiner Spitze dem Innenabhang des Metaconids angeheftet, verläuft im inneren Kronendrittel leicht nach rückwärts gerichtet und biegt dann schwach nach vorne ab, um in geradem Verlauf, sich keulenförmig verstärkend, dem Kronenaußenrand zuzustreben.

Protoconid-Grat und Mesoconid-Grat erheben sich ziemlich steil aus dem Zahnboden und zeigen am Labialende keine Tendenz, nach vorne umzubiegen. Der Protoconid-Grat ist durch eine Furche vom Paraconid getrennt, ihm jedoch durch eine sehr seichte Brücke in der Tiefe etwas angelegt. Vor ihm liegt in der inneren Kronenhälfte ein schwacher ovaler Knoten. Der Hinterabfall des Metaconids biegt vor der tiefen Mittelfurche in rechtem Winkel zu einem kurzen schwachen Mittelgrat ab. In dessen Verlängerung taucht aus der Mittelfurche in der äußeren Kronenhälfte ein tropfenförmiger Knoten auf. Der Mesoconid-Grat verstärkt sich ähnlich wie der Hypoconid-Grat ziemlich gleichmäßig keulenförmig nach außen. Er verläuft fast gerade und bleibt an Stärke erheblich hinter dem Protoconid-Grat zurück. Lingual vereinigt er sich mit dem Vorderende eines erhabenen Wulstes, der dem Entoconid entspricht und an Höhe und Stärke hinter den übrigen Haupthöckern zurückbleibt. Der Hypoconid-Grat hängt zwar in der Tiefe mit diesem Entoconid-Wulst zusammen, jedoch fällt das Hinterende dieses Wulstes ziemlich steil ab. Der entsprechende, gegenüberliegende Anstieg des Hypoconid-Grats erfolgt allmählich, so daß man hinter dem Entoconid höchstens von einem asymmetrischen Einschnitt bis in etwa halbe Tiefe sprechen kann. Das Hypoconid ist durch eine seichte Einkerbung am Innenrand seines Grates etwas abgesondert. Seine Innenkante ist vorne durch eine Kante begrenzt, welche auf einen hinteren Zwischengrat zuweist. Dieser besteht aus einem nach vorne leicht konkaven Rücken, dessen Außenende zwar etwas steiler abfällt als sein Innenende, jedoch in der Tiefe in die Andeutung einer Fortsetzung nach außen in Richtung auf die Kante des Hypoconids ausläuft.

Der vorliegende M_3 weist zu ursprüngliche Merkmale auf, als daß er in eine der besser belegten Arten eingereiht werden dürfte. Von *Peridyromys? prae-murinus* (FREUDENBERG) unterscheidet ihn seine etwas bedeutendere Größe. Von dieser Art und von *Peridyromys? spec. nov.* B wird er durch seinen ursprünglichen Kronenbau geschieden. Er ist ziemlich grobrippig und besitzt ein relativ schwaches Mesoconid. Protoconid und Paraconid-Grat sind recht deutlich getrennt, das Entoconid ist noch ziemlich selbstständig, der vordere Zwischengrat kurz und der Mittelgrat läuft noch nicht über den größten Teil der Krone durch. Sogar an *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB kann man Reminiszenzen sehen, nämlich das deutliche Paraconid, den schwächeren Mesoconid-Grat und den auf den hinteren Zwischengrat weisenden Sporn des Hypoconids. Von der durch STEHLIN & SCHAUB (1951, 300, Abb. 515) als „*Peridyromys murinus* POMEL“ bekanntgemachten Art aus Montagu (Allier) unterscheidet sich die vorliegende durch ihre Zwischen-grate.

j) *Peridyromys? spec. indet.*

Taf. 9, Fig. 15

Fundpunkt Gschwender Tobel I

Nr. 1952 XII 19

Ca. 0,77 x 1,06; oberer Backenzahn, wohl P^4 li. Bewurzelung abgebrochen. Zusammenhängende Narbe vermutlich einer Innenwurzel und zweier Außenwurzeln. Nur wenig angekauft. Das labial abgebrochene Vordercingulum läßt am Innenende eben noch eine schwache Verstärkung erahnen und ist durch eine verschmälerte, aber kaum an Höhe verlierende Brücke mit dem vorderen Trigonum-Schenkel so verbunden, daß am Zahninnenrand eine nur wenig geschwungene, über den Protoconus schräg rückwärts zum Innenende des Schlußcingulums führende Kante entsteht. Der Paraconus

ist zu einem hoch aufragenden, kurzen, den vorderen Außenrand einnehmenden Längsgrat gestreckt, geht bogenförmig abbiegend in die vordere Trigonum-Kante über und ist auch vollständig mit dem von seinem Hinterende rechtwinkelig abbiegenden, ziemlich kräftigen Mittelgrat verschweißt. Der Metaconus besitzt eine gerundet dreieckige Höckerform, da sein Vorderende etwas ausgezogen und sogar zu einem schwachen, vollständig an ihn verschweißten Pfeilerchen verstärkt ist. Die äußere Hälfte des hinteren Trigonum-Schenkels ist schwächer abgekaugt als die innere Hälfte und der vordere Trigonum-Schenkel. An den Nahtstellen zum Protoconus-Wulst sind die Trigonum-Schenkel nur in ihrer Breite, nicht aber in der Höhe reduziert. Der Protoconus-Wulst tritt daher gegenüber seiner Umgebung verhältnismäßig wenig in Höhe und Stärke hervor. Das Hintercingulum ist dem hinteren Metaconus-Abfall in der Tiefe angeheftet und gewinnt ziemlich gleichmäßig bis zu seinem Innenende, das dem Protoconus nach schräg vorwärts einwärts angeschweißt ist, an Stärke. Sehr schwache besondere Verstärkungen des Hintercingulums sind noch im inneren und im mittleren Drittel seines Verlaufs zu erahnen.

Der vorliegende P⁴ zeigt zu einfachen Bau, um an *Peridyromys?* nov. spec. B angeschlossen zu werden.

V. G e n u s *Microdyromys* DE BRUIJN

a) *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN

Taf. 9, Fig. 4, 5, 6

* 1966. *Microdyromys koenigswaldi* nov. sp. — DE BRUIJN 1966 (11—14, Taf. 1, Fig. 5 u. 6)

Fundpunkt P f a r r - A l p e

Nr. 1952 XII 33 (Taf. 9, Fig. 6): 0,80 × 0,86; M^{1/2}, wohl M¹ re. Bewurzelung ausgebrochen.

Nr. 1952 XII 31 (Taf. 9, Fig. 4): 0,75 × 0,94; M² re. Bewurzelung ausgebrochen.

Umriss derjenige eines abgerundeten Parallelogramms, bei Nr. 1952 XII 31 mit ziemlich gerader Vorderabgrenzung und nach hinten etwas verschmälert. Die Schmelzfalten sind vergleichsweise zart und ragen ziemlich steil und hoch aus dem Kronengrund hervor. Das Vordercingulum ist lingual deutlich verstärkt und über eine nur wenig gegenüber der Innenkante niedrigere Brücke an den Protoconus-Wulst verschweißt. Die hinter dem Vordercingulum gelegene Furche erreicht den Außenrand. Der Paraconus, ein sehr hoch aufragender, kurzer, randparalleler Wulst entsendet den Trigonum-Vorderschenkel und den fast ganz bis zur Spitze des Trigonum-Lumens reichenden Mittelgrat. Bei Nr. 1952 XII 31 ist der Trigonum-Vorderarm im äußeren Viertel kräftig ausgebildet, knickt dann plötzlich schwächer werdend nach schräg hinten ab, verläuft in der Kronenmitte etwa transversal und weiter einwärts wieder schräg nach hinten und innen. Der vordere Mittelgrat ist bei Nr. 1952 XII 31 dem hinteren Abfall des hinten in einem sehr kurzen transversalen Sporn endenden Paraconus angeheftet. Er verläuft insgesamt schräg etwas nach hinten, am lingualen Ende ungefähr transversal und ist dort bei Nr. 1952 XII 31 etwas verstärkt. Der Metaconus besitzt bei Nr. 1952 XII 33 die Form eines etwas längsgestreckten Pfeilers ähnlich wie der Paraconus, steht diesem jedoch an Höhe nach. Bei Nr. 1952 XII 31 stellt der Metaconus die schräg vorwärts auswärts gerichtete keulenförmige, labiale Verstärkung des hinteren Trigonum-Schenkels dar. In beiden Fällen ist der Metaconus dem geschwungenen hinteren Trigonum-Schenkel kontinuierlich angeschlossen. Vor dem vorderen Mittelgrat liegt ein langer Zwischengrat. Der hintere Mittelgrat weist bei Nr. 1952 XII 33 auf den Metaconus hin, bleibt aber

durch eine Furche von ihm getrennt; bei Nr. 1952 XII 31 ist er labial etwas verstärkt und besitzt eine sehr schwache Verbindung zum Metaconus. Das in beiden Fällen beschädigte Hintercingulum dürfte den Außenrand ohne eine Verbindung zum Metaconus erreichen. Lingual ist es durch eine Längsbrücke mit dem Protoconus verbunden. Vor dem vorderen Trigonum-Schenkel und in Verlängerung seines verstärkten Labialstücks ist bei Nr. 1952 XII 31 ein etwas quergegliederter niedriger Zwischengrat ausgebildet. Die Innenkante der Krone verläuft etwa gerade, wobei jedoch der dem Protoconus entsprechende Teil gegenüber Vorder- und Hintercingulumansatz ganz schwach erhöht ist. Die Ansatzstellen der Trigonum-Schenkel sind etwas verstärkt. Bei Nr. 1952 XII 31 treffen die Trigonum-Schenkel etwas weiter von einander entfernt auf als bei Nr. 1952 XII 33, wo man eher von einer Trigonum-Spitze sprechen kann. Der steil, jedoch nicht senkrecht einfallende Innenrand weist Narben auf.

Nr. 1952 XII 32 (Taf. 9, Fig. 5)

0,75 × 0,86; M^{1/2}, wohl M² re. Stumpf einer Innenwurzel. Außenbewurzelung unklar; Ansatz einer etwas längsgestreckten Außenwurzel, die vermutlich aus einem kräftigen vorderen und einem schwächeren hinteren Teil am Hals verwachsen ist. Umriß viereckig gerundet, nach hinten etwas verschmälert. Konkav. Ziemlich stark abgekaut und am Schlußcingulum leicht beschädigt. Das Kronenrelief entspricht etwa den beiden zuvor beschriebenen Zähnen. Jedoch erscheinen die Grate, wohl nur infolge der viel stärkeren Abkautung, insgesamt stärker. Innenkante und Innenwand sind abgeschliffen und wohl deshalb sind Narben an der Innenwand nur an einer Stelle schwach angedeutet. Das Labialende des Vordercingulums ist kräftig verstärkt. Auch der vordere Mittelgrat läuft in eine ovale Verstärkung aus. Es bestehen jeweils fortlaufend zusammenhängende Bögen vom vorderen Trigonum-Schenkel über den Paraconus zum vorderen Mittelgrat und vom hinteren Trigonum-Schenkel über den Metaconus zum hinteren Mittelgrat. Hinter dem vorderen Trigonum-Schenkel liegt ein Zwischengrat, nicht vor ihm. Die Ansatzpunkte der beiden Trigonum-Schenkel am Innenwulst liegen ein Stück von einander getrennt.

Die drei beschriebenen oberen Molaren gehören in die Stammlinie des rezenten *Glirulus japonicus* (SCHINZ). Gemeinsam mit *Glirulus (Amphidyromys) pusillus* (HELLER) (DEHM 1962; 44—46; Abb. 3—6; Taf. 6, Fig. 10—13) und *Glirulus (Amphidyromys) lisiensis* HUGUENEY & MEIN (1965; 117—118; Taf. 3, Fig. 60—62) besitzen sie eine durchgehende Verbindung am Innenrand, das auseinandergerückte Auftreffen der Trigonum-Schenkel auf den Innenrand, die Narben an Kroneninnenabhang, die zarte Ausbildung der Grate, die Konkavität der Kronenoberfläche und den etwas schrägen subparallelen Verlauf der Grate. Auch bleibt bei Nr. 1952 XII 31 und 33 (S. 100; Taf. 9, Fig. 4 bzw. 6) der hintere Mittelgrat vom Metaconus getrennt wie bei *Glirulus (Amphidyromys) pusillus* (HELLER) und wie beim Typus von *Microdyromys complicatus* DE BRUIJN (1966, Taf. 1, Fig. 8) abgebildet. Dagegen steht bei Nr. 1952 XII 32 (Taf. 9, Fig. 5) der hintere Mittelgrat über den Metaconus in fortlaufender Verbindung mit dem hinteren Trigonum-Schenkel wie beim Typus von *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN. Während bei den genannten beiden altpleistozänen Arten von *Glirulus (Amphidyromys)* der Mittelgrat den Innenrand erreicht, geht er bei den hier besprochenen Zähnen nur bis knapp davor und ist an seinem Ende z. T. verstärkt wie bei *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN und *M. complicatus* DE BRUIJN. Auch besitzen die hier beschriebenen Molaren ebensowenig Verbindungen zwischen Vordercingulum und Paraconus bzw. zwischen Hintercingulum und Meta-

conus wie bei den von DE BRUIJN aus Spanien beschriebenen Arten, während solche Verbindungen bei den genannten altpleistozänen Arten bestehen. Außer dem vorderen und hinteren Mittelgrat besitzt die beschriebene Form gewöhnlich nur den Zwischengrat, welcher vor dem vorderen Mittelgrat liegt — außer bei Nr. 1952 XII 31 (S. 100; Taf. 9, Fig. 4), wo noch ein vor dem vorderen Trigonum-Schenkel gelegener hinzutritt. Bei allen anderen Arten ist die Komplikationshöhe größer. Weitgehende Übereinstimmung im Kronenbau besteht demnach zu *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN, dessen Maße allerdings etwas höher liegen. Möglicherweise liegt hier aus dem Allgäu eine neue Unterart vor.

b) *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN?

Taf. 9, Fig. 3, 8

Fundpunkt P f a r r - A l p e lieferte die beiden nachfolgend beschriebenen Zähne, die mangels weiteren, die Sicherheit erhöhenden Materials nur mit Vorbehalt an die eben besprochene Art angeschlossen werden können.

Nr. 1952 XII 36 (Taf. 9, Fig. 8):

0,58 × 0,76; P⁴ re. Kräftige, fast ganz erhaltene, geschwungene Innenwurzel; mäßig große rundliche schwach schräg gestreckte vordere und kleine rundliche hintere Außenwurzel. Zahnoberfläche konkav. Umriß abgestumpft gerundet dreieckig. Das Vordercingulum hört beim inneren Kronendrittel auf und verbindet sich dort rechtwinkelig nach hinten abgknickt dem vorderen Trigonum-Schenkel. Labial verbindet es sich über eine etwas verschmälerte Brücke mit dem kräftigen Höcker des Paraconus. Die labiale Hälfte des Paracon-Grats ist ziemlich schwach, die linguale Hälfte kräftig ausgebildet. Der Metacon-Grat verläuft vom kräftigen, jedoch hinter dem Paraconus zurückstehenden Höcker des Metaconus zunächst transversal einwärts und biegt im inneren Drittel nach vorne ab, so daß sein Vorderrand nahe dem Paracon-Grat auf den Kroneninnenrand trifft. Dieser verbindet die etwas abgestumpfte Trigonum-Spitze vollständig mit dem Schlußcingulum, welches labial frei endend vom Metaconus durch eine Furche abgetrennt ist. Sowohl vom Paraconus wie vom Metaconus führen Leisten schräg zur Kronenmitte, wo von der Vereinigungsstelle der etwas geschlängelte und innen verstärkte Mittelgrat ausgeht. Das vom Paraconus ausgehende Leistchen ist an der Auftreffstelle zum gemeinsamen Mittelgrat etwas abgeschnürt; dafür legt sich das vom Metaconus ausgehende Leistchen diesem nur in seinem vorderen Innenabfall an. Etwas innerhalb der Kronenmitte entsendet der Mittelgrat eine kurze Längsverbindung zum vorderen Trigonum-Schenkel. Vor ihm liegt ein niederes kurzes Sekundärgrätchen. Hinter dem Mittelgrat befindet sich ebenfalls ein Zwischengrätchen, welches mit seinem verstärkten Innenende verbunden ist und dem abgetrennten Lingualteil des hinteren Zwischengrats entsprechen könnte.

Der beschriebene P⁴ ist als Einzelfund zu untypisch, um sicher bestimmt werden zu können.

Nr. 1952 XII 37 (Taf. 9, Fig. 3):

0,69 × 0,90; M³ li. oder P⁴ re, vermutlich M³ li. Bewurzelung abgebrochen.

Die folgende Beschreibung setzt voraus, daß es sich bei dem Stück um einen M³ li handelt.

Kronenoberfläche schwach konkav. Umriß trapezoid, hinten verschmälert, vorne bogig gerundet. Schmelzrelief ziemlich fein und steil. Ein gerader Innenrand besitzt auf

seiner schräg abfallenden Lingualfläche Narben und verläuft schräg nach hinten außen. Er knickt hinten zum Metacon-Grat und vorne zum Vordercingulum ab und nimmt etwa in der Mitte den Paracon-Grat auf. Das Schlußcingulum verbindet sich dem Hinterhang des Protoconus etwas tiefer als dieser und setzt sich so an den hinteren Lingualabfall der Innenkante an, daß seine Verlängerung die untere Begrenzung deren Schrägabdachung und den Zahnumriß bildet. Das, von einer stumpfen Knickstelle abgesehen, gerade verlaufende Schlußcingulum ist über eine etwas eingetiefte Kante mit dem Metaconus verbunden. Der Metacon-Grat steht über den bogig ausgezogenen Metacon-Wulst mit dem hinteren Mittelgrat in Verbindung. Das Vordercingulum verbindet sich mit dem Paraconus-Wulst, welcher vor der Mittelfurche endet. Der vordere Mittelgrat wird durch ein kurzes, freies, tropfenförmiges Höckerchen vertreten. In dessen Verlängerung nach innen liegt in der Tiefe ein kurzes Leistchen. Auch der Paracon-Grat bleibt vom Paraconus durch eine Furche getrennt.

Der vorliegende Zahn gehört nach seinen feinen steilen Graten und nach dem Kronenbild sicher zum Genus *Microdyromys*. Er wirft jedoch erhebliche Zweifel über seine Orientierung und die spezifische Bestimmung auf. Sowohl der Kronenumriß wie Einzelheiten der Schmelzstruktur würden der Deutung als P⁴ re. den Vorzug geben. Jedoch würde der Zahn dann wegen seiner Größe nicht mehr zu *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN des gleichen Fundpunktes passen. Nach dem Kronenbild möchte man ihn nicht mit dem Stück 1952 XII 35 (S. 96; Taf. 9, Fig. 2 Stereo) zu einer Art zusammenfassen, zu dem ein P⁴ der Größe des vorliegenden Zahnes zugeordnet werden müßte. Bis eventuell weiteres Material eine Klärung bringt, wird der Zahn unter Vorbehalt als M³ li. zu *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN gerechnet.

VI. Genus inc.

Gliridae spec. inc. subfam.

Taf. 8, Fig. 3 (Stereo)

Fundpunkt Schindelwies-Graben

Nr. 1951 XXIII 13

1,49 × ?; Kronenbruchstück eines M_{1/2} re. Bewurzelung abgebrochen. Das Außenende des Paraconid-Grats ist etwas verstärkt und durch einen Schmelzdurchbruch gekennzeichnet. Es ist in der Tiefe dem Protoconid angeheftet, bleibt von diesem aber im wesentlichen durch eine schmale, nach außen öffnende Furche getrennt. Das Protoconid ist als eine kräftige Verstärkung seines Grats sehr deutlich und ist leicht nach vorne gebogen. Der lange Mittelgrat besitzt in der Kronenmitte eine eben noch erhaltene Einschnürung. Der etwa transversal, nur sehr schwach vorwärts führende Mesoconid-Grat verstärkt sich keulenförmig gegen sein Außenende. Das Hypoconid ist in dem kräftigen, nach außen vorne schwingenden Hypoconid-Grat aufgegangen. Der hintere Zwischengrat ist ziemlich kräftig, der vordere fehlt an dem erhaltenen Stück und es bliebe auch kein Platz für ihn.

Nr. 1951 XXIII 13 kann nach Größe, relativer Grobrippigkeit und Struktur mit der burdigalen Art *Glis? gregarius* (DEHM) verglichen werden. Jedoch ist nicht nur der für eine sichere Zuordnung erforderliche linguale Kronenteil abgebrochen, sondern an dem erhaltenen Stück fehlt auch im Gegensatz zur genannten Art der vordere Zwischengrat.

- BRUIJN, H. DE, 1965: Miocene Gliridae, Sciuridae, and Eomyidae (Rodentia, Mammalia) from the Calatayud area (prov. Zaragoza, Spain) and their bearing on the biostratigraphy. — 202 S., 18 Abb., 11 Taf., 2 Beil., Unveröff. Diss., Utrecht
- BRUIJN, H. DE, 1966: Some new miocene Gliridae (Rodentia, Mammalia) from the Calatayud area (Prov. Zaragoza, Spain). — Proc. koninkl. nederl. Akad. Wet. Amsterdam, Ser. B, **69**, 1—21, 1 Abb., Taf. 1—2, Amsterdam
- CASOLI, M., 1962: Révision de quelques familles de Mammifères du gisement de Coderet-Branssat (Allier). — C. R. somm. Séanc. Soc. géol. France 1962, Fasc. 8, 230, Paris
- DEHM, R., 1938: *Heteromyoxus* n. g. und *Dyromys* THOMAS, zwei Schlafmäuse im Untermiocän (Aquitanium) von Ulm. — Zbl. Mineral. Geol. Paläontol. 1938, Abt. B, 337—343, 3 Abb., Stuttgart
- DEHM, R., 1950: Die Nagetiere aus dem Mittel-Miocän (Burdigalium) von Wintershof-West bei Eichstätt in Bayern. — N. Jb. Mineral. etc. Abh., **91**, Abt. B, 321—428, 137 Abb., 6 Tab., 1 Beil., Stuttgart
- DEHM, R., 1962: Altpleistocäne Säuger von Schernfeld bei Eichstätt in Bayern. — Mitt. bayer. Staatssamml. Paläontol. hist. Geol., **2**, 17—61, 7 Abb., Taf. 3—6, München
- ELLERMANN, J. R., 1940: The families and genera of living rodents. Vol. 1, 689 S., 189 Abb., London (British Museum)
- FRAAS, O., 1870: Die Fauna von Steinheim. — Jh. Ver. vaterländ. Naturk., **26**, 145—306, Taf. 4—13, Stuttgart
- FREUDENBERG, H., 1941: Die oberoligocänen Nager von Gaimersheim bei Ingolstadt und ihre Verwandten. — Palaontographica, **92**, Abt. A., 99—164, 70 Abb. Taf. 12—15, Stuttgart
- HARTENBERGER, J.-L., 1966: *Gliravus robiacensis* n. sp., nouveau Rongeur (Gliridae) de l'Éocène supérieur du Languedoc. — C. R. somm. Séanc. Soc. géol. France, 1965, Fasc. 10, 326—327, 2 Abb., Paris
- HAUPT, O., 1935: Andere Wirbeltiere des Neozoikums. In: W. SALOMON-CALVI, Ober-rheinischer Fossilkatalog. H. 9, Berlin
- HELLER, F., 1936: Eine oberpliocäne Wirbeltierfauna aus Rheinhessen. — N. Jb. Mineral. Geol. Paläontol. Beil. — Bd. **72** B, 99—160, 4 Abb., Taf. 7—11, 3 Tab., Stuttgart
- HUGUENEY, M. & P. MEIN, 1965: Lagomorphes et Rongeurs du Néogène de Lissieu (Rhône). — Trav. Lab. géol. Fac. Sci. Lyon, N. S., **12**, 109—123, Taf. 1—3, Lyon
- HÜRZELER, J., 1945: Säugetierpalaeontologische Bemerkungen zur Abgrenzung und Unterteilung des Aquitanien. — Eclog. geol. Helv., **38**, 655—661, Basel
- JANOSSY, D., 1961: Die Entwicklung der Kleinsäugerfauna Europas im Pleistozän (Insectivora, Rodentia, Lagomorpha). — Z. Säugetierk., **26**, 40—50, Hamburg und Berlin
- KORVENKONTIO, V. A., 1934: Mikroskopische Untersuchungen an Nagerincisiven. — Ann. zool. Soc. zool.-bot. fenn. Vanamo, **2**, 1—275, Taf. 1—47, Helsinki
- KOWALSKI, K., 1963: The Pliocene and Pleistocene Gliridae (Mammalia, Rodentia) from Poland. — Acta zool. cracov., **8**, Nr. 14, 533—567, 15 Abb., Kraków
- KRETZO, M., 1959: Fauna und Faunenhorizont von Csarnóta. — M. All. Földtani intézet Evi Jelentése, 1959. 297—395, Taf. 1—5, Budapest
- LAVOCAT, R., 1961 a: Réflexions sur l'origine et la structure du groupe des rongeurs.— Coll. int. Centre nat. Rech. sci., **104**, 287—299, Paris
- LAVOCAT, R., 1961 b: Le gisement de vertébrés miocènes de Beni Mellal. — Not. Mém. Serv. géol. Maroc, **155**, 1—144, Taf. 1—12, 31 Abb., Rabat
- MAJOR, C. J. FORSYTH, 1899: On Fossil Dormice. — Geol. Mag. n. Ser., **6**, 492—501, London

- MEIN, M. P., 1958: Les mammifères de la faune sidérolithique de Vieux-Collonges. — Nouv. Arch. Mus. Hist. natur. Lyon, 5, 1—118, 172 Abb., Lyon
- MISONNE, X., 1957: Mammifères oligocènes de Hoogbutsel et de Hocleden. — Bull. Inst. roy. Sci. natur. belg., 33, Nr. 51, 16 S., 2 Taf., Bruxelles
- POMEL, A., 1853: Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles. — 193 S., Paris
- REUVENS, C. L., 1890: Die Myoxidae oder Schläfer. — 80 S., 4 Taf., Leiden
- RICHTER, R., 1948: Einführung in die Zoologische Nomenklatur durch Erläuterung der Internationalen Regeln. — 252 S., Frankfurt a. M.
- SCHALK, K., 1957: Geologische Untersuchungen im Ries. Das Gebiet des Blattes Bissingen. — Geologica Bavarica, 31, 107 S., 80 Abb., 3 Taf., 1 geol. K. 1 : 25 000, München
- SCHAUB, S. & H. ZAPPE, 1953: Die Fauna der miozänen Spaltenfüllung von Neudorf an der March (CSR). Simplicidentata. — S.-B. österreich. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl. Abt. I, 162, 181—215, 5 Abb., 3 Taf., Wien
- SCHLOSSER, M., 1885: Die Nager des europäischen Tertiärs. — Palaeontographica, 31 A, 19—161, Taf. 5—12, Kassel
- SIMPSON, G. G., 1945: The principles of classification and a classification of mammals. — Bull. amer. Mus. natur. Hist., 85, 1—350, New York
- SOERGEL, W., 1919: Der Siebenschläfer aus den Kiesen von Süßenborn bei Weimar. — Z. deutsch. geol. Ges., 71, 59—79, Taf. 3, 1 Abb., 1 Tab., Stuttgart
- STEHLIN, H. G., 1902: Über die Grenze zwischen Oligocän und Miocän in der Schweizer Molasse. — Ecol. geol. Helv., 7, 360—365, Basel
- STEHLIN, H. G., 1914: Übersicht über die Säugetiere der schweizerischen Molasseformation, ihre Fundorte und ihre stratigraphische Verbreitung. — Verh. naturforsch. Ges. Basel, 25, 179—202, Basel
- STEHLIN, H. G., 1938: Über das Alter des Vaulruzsandsteins. — Ecol. geol. Helv., 31, 293—296, 1 Abb., Basel
- STEHLIN, H. G. & S. SCHAUB, 1951: Die Trigonodontie der simplicidentaten Nager. — Schweiz. paläontol. Abh., 67, 385 S., 620 Abb., Basel
- STROMER, E., 1928: Wirbeltiere im obermiocänen Flinz Münchens. — Abh. bayer. Akad. Wiss., math.-naturw. Abt., 32, 71 S., 3 Abb., 3 Taf., München
- TOBIEN, H., 1956: Eine stampische Kleinsäugerfauna aus der Grenzregion Schleichsand/Cyrenenmergel von Heimersheim bei Alzey (Rheinessen). — Z. deutsch. geol. Ges., 106, 1954, 565—566, Hannover
- TOBIEN, H., 1960: Säugetierreste aus dem älteren Miozän von Ravolzhausen (Kreis Hanau, Hessen). — Notizbl. hess. Landesamt Bodenforsch., 88, 7—19, Taf. 1—2, Wiesbaden
- VIRET, J., 1929: Les faunes de Mammifères de l'Oligocène supérieur de la Limagne Bourbonnaise. — Ann. Univ. Lyon, Nouv. Ser., I, 47, 328 S., 32 Abb., 31 Taf., Paris
- VIRET, J. & J. HÜRZELER, 1937: Sur l'âge de la faune de Mammifères des Pyrimont-Challonges. — Bull. Soc. géol. France, (5) 7, 129—140, 1 Abb., Paris
- VOLLMAYR, TH., 1958: Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1 : 25 000. Blatt Nr. 8426 Oberstauen. — 55 S., 1 Abb., 3 Taf., 1 geol. Karte 1 : 25 000, München
- ZÖBELEIN, H. K., 1952 a: Die Bunte Molasse bei Rottenbuch (Obb.) und ihre Stellung in der Subalpinen Molasse. — Geologica Bavarica, 12, 86 S., 9 Abb., 1 Fossilliste, 1 Lagepl., München
- ZÖBELEIN, H. K., 1952 b: Beiträge zur Kenntnis der Faltenmolasse im westlichen Oberbayern. — Erdöl u. Kohle, 5, 617—623, 2 Tab., Hamburg
- ZÖBELEIN, H. K., 1955: Funde von Land- und Süßwasserschnecken in der chatischen und aquitanischen Bunten Molasse des bayerischen Allgäus. — Z. deutsch. geol. Ges., 105, 1953, 384—395, Stuttgart

- ZÖBELEIN, H. K., 1958: Land- und Süßwasserschnecken aus dem Chattien und Aquitanien der Subalpinen Molasse des westlichen Allgäus. — In: VOLLMAYR 1958, 42—55
- ZÖBELEIN, H. K., 1962: Über die Bausteinschichten in der Subalpinen Molasse des westlichen Oberbayerns. — Z. deutsch. geol. Ges. **113**, 1961, 261—265, 2 Abb., Hannover
- ZÖBELEIN, H. K., 1963: Zur Biostratigraphie der gefalteten Molasse (Chattien/Aquitanien) im Süden des Oberen Zürichsees. — Bull. Ver. schweiz. Petrol.-Geol. u. -Ing., **29**, Nr. 77, 11—28

Tafel-Erläuterungen

Tafel 7

- Fig. 1—6: Fundpunkt T a l - H o l z
- 1: Gliridae, spec. inc. subfam.; $M_{1/2}$, wohl re (1952 XII 13)
 - 2—6: *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB;
 - 2: $M^{1/2}$, wohl M^1 re (1952 XII 18)
 - 3: $M^{1/2}$ re (1952 XII 17)
 - 4: M_3 li (1952 XII 14)
 - 5: M_3 li (1952 XII 15)
 - 6: $M_{2/3}$, wohl M_3 re (1952 XII 16)
- Fig. 7—8: Fundpunkt S t e i n e - B e r g III
- 7: *Gliravus majori* STEHLIN & SCHAUB?;
 $M^{1/2}$ li (1952 XII 12)
 - 8: *Gliravus* spec. indet.; M^3 re (1952 XII 11)
- Fig. 9—10: Fundpunkt S t e i n e - B e r g II
- 9: *Gliravus* nov. spec., aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB?;
 P^4 li (1952 XII 7)
 - 10: *Peridromys?* *praemurinus* (FREUDENBERG): M_1 re (1952 XII 6)
- Fig. 11—14: Fundpunkt S t e i n e - B e r g I
- 11: *Gliravus* spec. indet.; $M^{1/2}$ oder P^4 re (1952 XII 2)
 - 12: *Peridromys?* *praemurinus* nov. subsp. A?; M^2 li (1952 XII 3)
 - 13: *Gliravus* spec. indet.; $M^{1/2}$ re oder P^4 li, vermutlich P^4 li (1952 XII 5)
 - 14: *Gliravus* spec. indet.; oberer Backenzahn, vermutlich M^3 re (1952 XII 4)
- Fig. 15: Fundpunkt S c h l e i f m ü h l e II; *Gliravus* cf. *priscus* STEHLIN & SCHAUB; M_3 re (1951 XXIII 4)
- Fig. 16: Fundpunkt S c h l e i f m ü h l e I; *Peridromys?* nov. spec. B; M_3 re (1951 XXIII 1)

Alle Vergrößerungen ca. 20fach

Tafel 8

- Fig. 1—2: Fundpunkt G s c h w e n d e r T o b e l I I
- 1: *Peridromys?* nov. spec. B; $M^{1/2}$ li (1952 XII 27)
 - 2: *Gliravus* nov. spec., aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB?;
 P^4 li (1952 XII 28)
- Fig. 4: *Peridromys?* *praemurinus* (FREUDENBERG); Holotypus; re UK mit M_1 u-
 M_2 ; G a i m e r s h e i m
- Fig. 3,5—12: Fundpunkt S c h i n d e l w i e s - G r a b e n
- 3: Gliridae, spec. inc. subfam.; $M_{1/2}$ re (1951 XXIII 13)
 - 5: *Peridromys?* *praemurinus* (FREUDENBERG) M_1 li (1951 XXIII 11)


- 6—7: *Gliravus cf. robitacensis* HARTENBERGER
 6: wohl P⁴ re (1951 XXIII 10)
 7: M₁ li (1951 XXIII 7)
 8: *Peridyromys* ? nov. spec. B ?; M^{1/2} li (1951 XXIII 6)
 9—12: *Peridyromys* ? nov. spec. B
 9: M¹⁻², wohl M¹ re (1951 XXIII 8)
 10: P₄ li (1951 XXIII 9)
 11: M_{1/2} li (1951 XXIII 12)
 12: M₃ re (1951 XXIII 5)

Alle Vergrößerungen ca. 20fach


Tafel 9

- Fig. 1: Fundpunkt R o t t e n b u c h; *Peridyromys* ? *praemurinus* nov. subspect.
 A; M₁ re (1949 XXV 4)
- Fig. 2—11: Fundpunkt P f a r r - A l p e
 2: *Peridyromys* ? spec. indet.; M¹⁻², wohl M² li (1952 XII 35)
 3: *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN?; M³ li oder P⁴ re, vermutlich M³ li
 (1952 XII 37)
 4—6: *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN;
 4: M² re (1952 XII 31)
 5: M^{1/2}, wohl M² re (1952 XII 32)
 6: M^{1/2}, wohl M¹ re (1952 XII 33)
 7: *Peridyromys* ? spec. indet.; P⁴ oder M¹, wohl P⁴ re (1952 XII 30)
 8: *Microdyromys koenigswaldi* DE BRUIJN?; P⁴ re (1952 XII 36)
 9—11: *Peridyromys* ? spec. indet.;
 9: M_{1/2}, wohl M₂ li (1952 XII 29)
 10: M³ re (1952 XII 38)
 11: M^{1/2}, wohl M¹ li (1952 XII 34)
- Fig. 12—19: Fundpunkt G s c h w e n d e r T o b e l I
 12: *Peridyromys* ? spec. indet.; M^{1/2} re (1952 XII 22)
 13: *Peridyromys* ? spec. indet.; M₃ li (1952 XII 24)
 14: *Peridyromys* ? spec. indet.; M_{1/2} re (1952 XII 26)
 15: *Peridyromys* ? spec. indet.; oberer Backenzahn, wohl P⁴ li (1952 XII 19)
 16: Gliridae, spec. inc. subfam.; M¹ oder P⁴, wohl P⁴ re (1952 XII 20)
 17—19: *Peridyromys* ? *praemurinus* nov. subspec. A;
 17: P⁴ li (1952 XII 21)
 18: M_{1/2}, wohl M₁ re (1952 XII 23)
 19: M_{1/2}, wohl M₂ re (1952 XII 25)
- Fig. 20—23: Fundpunkt F a l l - T o b e l I
 20—22: *Peridyromys* ? *praemurinus* nov. subspec. A
 20: M^{1/2} re (1951 XXIV 3)
 21: M³ re (1951 XXIV 2)
 22: M₂ re (1951 XXIV 4)
 23: *Gliravus* nov. spec., aff. *majori* STEHLIN & SCHAUB;
 M^{1/2} re (1951 XXIV 1)
- Fig. 24: V e r g l e i c h s m a ß s t a b. Genau gültig für alle Stereobilder außer
 Taf. 8, Fig. 4, 9 u. 12


Alle Vergrößerungen ca. 20fach



Tafel 7



Tafel 8



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Histor. Geologie](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Vollmayr Theodor

Artikel/Article: [Oberoligozäne Gliridae \(Rodentia, Mammalia\) aus der süddeutschen Faltenmolasse 65-107](#)