

NEUKOMBINATIONEN UND NEUE NAMEN AUS
„NATÜRLICHE PFLANZENFAMILIEN“ BAND 20 d,
RHAMNACEAE UND VITACEAE

von
K. SUESSENGUTH

In dem genannten Band sind auf Seite 391/392 diejenigen Kombinationen und Namen aufgeführt, die dort erstmals neu aufgestellt wurden.

Wm.T. STEARN von Museum of Natural History London hat den Verf. darauf aufmerksam gemacht, daß diese Neukombinationen usw. nach dem neuen "International Code of Botan. Nomenclature", 1952, Art. 42 erst gültig sind, "when the basonym (name bringing or epithet-bringing synonym) is clearly indicated with its author and the place and date of publication". Im folgenden wird dieser neuen Forderung entsprochen.

Ampelocissus dichothrix (Miq.) Suesseng. (= *Cissus dichothrix* Miquel, Fl.Ind.Batav. Suppl.I, 514, 1860).

" " sphaerophylla (Bak.) Suesseng. (= *Vitis sphaerophylla* Baker, Journ.Linn.Soc. 22, 460, 1860).

Cayratia acuminata (A.Gray) Suesseng. (= *Cissus acuminata* A.Gray, Bot.U.St.Expl.Exped. I, 273, 1854).

" " anemonifolia (Zippel) Suesseng. (= *Cissus anemonifolia* Zippel ex Miq., Ann.Mus.Bot.Lugd.Batav. I, 80, 1863/64).

" " apoensis (Elmer) Suesseng. (= *Cissus apoensis* Elmer, Leaflet.Philipp.Bot. VIII, 2880, 1915).

" " auriculata (Roxb.) Suesseng. (= *Cissus auriculata* Roxb., Hort.beng.Serampore 11, 1814; auch Fl.Ind. I, 411, 1820).

" " debilis (Bak.) Suesseng. (= *Vitis debilis* Bak. = *Cissus debilis* Planch., DC.Monogr.Phaner. V, 569, 1887).

" " elongata (Roxb.) Suesseng. (= *Cissus elongata* Roxb., Hort.beng.Serampore 11, 1814; Fl.Ind. I, 411, 1820).

" " gracilis (Guill. & Perr.) Suesseng. (= *Cissus gracilis* Guill. & Perr., Fl.Seneg.Tent. I, 134, 1830-33).

- Cayratia grandifolia (Warburg) Suesseng. (= *Cissus grandifolia* Warb., Engl.Bot.Jahrb. 18, 199, 1894).
- " " ibuensis (Hook.f.) Suesseng. (= *Cissus ibuensis* Hook.f. in W.J.Hook., Niger-Flora 265, 1849).
- " " lineata (Warburg) Suesseng. (= *Cissus lineata* Warburg in Engl.Bot.Jahrb. 13, 370, 1891).
- " " megacarpa (Lauterb.) Suesseng. (= *Cissus megacarpa* Lauterb., Engl.Bot.Jahrb. 59, 526, 1925).
- " " nervosa (Planch.) Suesseng. (= *Cissus nervosa* Planch., DC.Monogr.Phaner. V, 564, 1887).
- " " palauana (Hosokawa) Suesseng. (= *Columella palauana* Hosokawa, Trans.Nat.Hist.Soc.Formosa 25, 244, 1935).
- " " pterita (Merrill) Suesseng. (= *Columella pterita* Merrill, Philipp.J.Sc.Bot. 11, 135, 1916).
- " " retivenia (Planch.) Suesseng. (= *Cissus retivenia* Planch., DC.Monogr.Phaner. V, 576, 1887).
- " " ridleyi Suesseng. (= *Cissus flaviflora* Ridley, Kew Bull. 1926, 63, non Sprague).
- " " ruspolii (Gilg) Suesseng. (= *Cissus ruspolii* Gilg, Notizbl.Bot.Gart.Berlin 4, 186, 1905).
- " " schumanniana (Gilg) Suesseng. (= *Cissus schumanniana* Gilg in K.Schum. & Lauterb., Flora Deutsch. Südsee 429, 1901).
- " " setulosa (Diels & Gilg) Suesseng. (= *Cissus setulosa* Diels & Gilg in Engl.Bot.Jahrb. 29, 466, 1901).
- " " simplicifolia (Merrill) Suesseng. (= *Columella simplicifolia* Merrill, Philipp.J.Bot. 11, 135, 1916).
- " " thalictrifolia (Planch.) Suesseng. (= *Cissus thalictrifolia* Planch., DC.Monogr.Phaner. V, 560, 1887).
- " " thomsoni (Lawson) Suesseng. (= *Vitis thomsoni* M. Lawson, Hook.f., Fl.brit.Ind. I, 657, 1875).
- " " vitiensis (A.Gray) Suesseng. (= *Cissus vitiensis* A.Gray, Bot.U.St.Expl.Exped. I, 272, 1854).
- " " yoshimurai (Makino) Suesseng. (= *Cissus yoshimurai* Makino, Bot.Mag.Tokyo 24, 233, 1910; = *Columella yoshimurai* Masamune, Journ.Soc.Trop.Agric. Taiwan 2, 51, 1930).
- Cissus ernstii Suesseng. (= *Cissus paucidentata* Ernst, Journ.Bot. 8, 374, 1870, non Klotzsch).
- " " glossopetala (Bak.) Suesseng. (= *Vitis glossopetala* Baker, Kew Bull. 1894, 344).

- Cissus koordersii (Backer) Suesseng. (= Vitis koordersii Backer, Schoolfl. Java, Verbeterblad, p. 10, 1911).
- " " lenticellata (Bak.) Suesseng. (= Vitis lenticellata Bak., Journ. Linn. Soc. 20, 122, 1883).
- " " leucophlea (Scott Elliot) Suesseng. (= Vitis leucophlea Sc. Elliot, Journ. Linn. Soc. 29, 12, 1891).
- " " novogranatensis (Moldenke) Suesseng. (= Vitis novogranatensis Mold., Phytologia I, 9, 1933).
- " " triternata (Bak.) Suesseng. (= Vitis triternata Baker in Journ. Linn. Soc. 20, 123, 1883).
- " " urbanii Suesseng. (= Cissus dissecta Urban & Ekman, Ark. Bot. Stockh. XXII A, Nr. 8, 72, 1929, non Craib 1926).
- " " voanonala (Baker) Suesseng. (= Vitis voanonala Baker, Journ. Linn. Soc. 22, 461, 1887).
- " " woodrowii (Stapf) Suesseng. (= Vitis woodrowii Stapf in Cooke, Fl. Bombay I, 248, 1901).
- Colletia ferox Gill. ex Hook. var. infausta (N.E.Br.) Suesseng. (= Colletia infausta N.E. Brown, Gard. Chron. Ser. III, 60, S. 132, 1916).
- " " spinosa Lam. (non Miers) emend. Suesseng.
- " " " var. assimilis (N.E. Brown) Suesseng. (= Colletia assimilis N.E. Br. l.c.).
- " " " var. miersii Suesseng. (= Colletia spinosa Miers, non Lam., Contr. Bot. I, 252, 1851-1861).
- " " " var. trifurcata (N.E. Brown) Suesseng. (= Colletia trifurcata N.E. Br., Gard. Chron. Ser. III, 60, S. 132, 1916).
- Condaliopsis lloydii (Standl.) Suesseng. (= Condalia lloydii Standley, Contr. U.S.A. Herb. 23, 714, 1923).
- " " lycioides (A. Gray) Suesseng. (= Zizyphus lycioides A. Gray, = Condalia lycioides Weberb. in Engl.-Pr., Nat. Pfl. Fam. III/5, 404, 1896).
- " " obtusifolia (A. Gray) Suesseng. (= Condalia obtusifolia Weberb. l.c. = Zizyphus obtusifolius A. Gray).
- " " parryi (Torr.) Suesseng. (= Condalia parryi (Torr.) Weberb. in Engl.-Pr., Nat. Pfl. Fam. III/5 S. 404, 1896).
- " " seleri (Loesener) Suesseng. (= Condalia seleri Loesener in Feddes Repert. 9, 355, 1911).
- " " velutina (J.M. Johnst.) Suesseng. (= Condalia velutina Johnst. in Journ. Arn. Arb. 20, 236, 1939).

Discaria Hook. sect. Notophaena (Miers) Suesseng. (= No=
tophaena Miers, Ann.Mag.Nat.Hist.Ser. III/5, S.
267, 1860).

" " sect. Ochetophila Suesseng. (= Ochetophi=
la Poepp.ex Reiss. in Endlicher, Genera, 1099,
1840 und in Miers l.c. 279).

" " prostrata (Miers) Reiche var. nana (Gay) Suesseng.
(= Discaria nana (Gay) Benth.& Hook. ex Weberb.,
Nat.Pfl.Fam. III/5, 423, 1896).

" " crenata (Clos) Regel

" " " var. andina (Spegazz.) Suesseng. (= Discaria
andina Spegazzini in Anal.Soc.Ci.Argent. 47,230,
1899 und Nov.Add.Fl.Patagon. I, 1901, repr.25).

" " " var. discolor (Hook.) Suesseng. (= Discaria
discolor Dusén in Ergeb.Swed.Exped.Magell.III/
V, 153; = Colletia discolor Hook.Ic.pl.t. 538,
1843).

" " " var. dumosa (Miers) Suesseng. (= Colletia du=
mosa Miers in A.Mag.Nat.Hist.Ser.III/V,212,1860).

" " " var. integrifolia (Spegazz.) Suesseng. (= Dis=
caria integrifolia Spegazzini, Rev.Agron.La Pla=
ta 1897, 502).

" " " var. magellanica (Miers) Suesseng. (= Disca=
ria magellanica Maklooskie in Rep.Princeton Univ.
Exped.Patagon. VIII, 566, 1903-06; Miers sub No=
tophaena mag., Contr.Bot. I, 270, 1851-1861).

" " " var. montana (Phil.) Suesseng. (= Colletia
montana Phil. in Linnaea 33, 37, 1864/65).

Discypharia Suesseng. sectio nova (I) Cayratiae Juss.:
Endospermium in sectione transversali T-forme;
pedunculus plerumque nec articulatus nec bracteis
instructus, saepissime terminalis inter 2 folia
opposita; semen duobus aperturis et duabus areis
ventralibus. Species sectionis vide: "Natürl.
Pflanzenfamilien, 2.Aufl., Band 20 d", 280, 1953.

Gouania discolor Benth. var. ulei (Pilger) Suesseng. (= G. ulei Pilger, Notizbl.Bot.Gart.Berlin 6, 315,
1915).

Koilosperma Suesseng. sect. (II) nova Cayratiae Juss.:
Endospermium in sectione transversali O-forme;
pedunculus articulatus et sub medio bracteis in=
structus, semper axillaris; semen una apertura
ventrali. - Cfr. "Nat.Pflanzenfamilien, 2.Aufl.,
Band 20 d", 278, 1953.

Neoreynosia Suesseng. subgen.nov. Reynosiae Gris.:
Petala praesentia, species ab cl. URBAN propter

constructionem ovarii ad Reynosiam positae. Cfr.
"Nat. Pflanzenfamilien, 2.Aufl., Band 20 d", 137,
1953 .

Rhoicissus usambarensis Gilg em. Suesseng. (= Cissus usam-
barensis Gilg ex Engler (sphalm.) Abhandl.Preuss.
Akad.Wiss. (1894) 44 und in Englers Pflanzenwelt
Ost-Afrikas A, S.31, 1895).

Sageretia yemensis (Deflers) Suesseng. (= Berchemia yemen-
sis Deflers, Voy.Yemen 123).

Scutia hutchinsonii Suesseng. (= Scutia buxifolia Hutch.&
Moss, Kew Bull. 1928, 272; non Sc. buxifolia
Reissek, siehe SUESSENGUTH, Lilloa 4, 135, 1939).

Tetrastigma andamanicum (King) Suesseng. (= Vitis andama-
nica King, Journ.As.Soc.Beng. 65, 393).

" " curtisii (Ridley) Suesseng. (= Vitis curtisii
Ridley, Journ.As.Soc.Straits 75, 24, 1917).

" " pubiflorum (Miq.) Suesseng. (= Cissus publi-
flora Miq. in Fl.Ind.Batav.Suppl.I, 516, 1860).

Ventilago gamblei Suesseng. (= V. lanceolata Gamble, Kew
Bull. 1916, 134, non V. lanceolata Merrill 1915).

INHALTSVERZEICHNIS

HERMANN MERXMÜLLER und GERALD CZECH, Eine neue Gattung der Cyperaceen	S. 317
JOSEF POELT, Mitteleuropäische Flechten II	S. 323
KARL SUESSENGUTH und Mitarbeiter, Neue Taxa, Kombinationen und Vorkommen in Süd-Afrika ...	S. 333
MARTHA HOLZHAMMER, Neue Sterculiaceen aus Südwestafrika	S. 345
KARL SUESSENGUTH und INGE GALL, Die Verbrei- tung der "gefäßlosen" Angiospermen auf der Erde	S. 350
KARL SUESSENGUTH, Neukombinationen und neue Namen aus "Natürliche Pflanzenfamilien" Band 20 d, Rhamnaceae und Vitaceae	S. 352

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Suessenguth Karl

Artikel/Article: [NEUKOMBINATIONEN UND NEUE NAMEN AUS
Â„NATÜRLICHE PFLANZENFAMILIEN" BAND 20 d. RHAMNACEAE UND
VITACEAE 352-356](#)