

PORPIDIA ALBOCAERULESCENS
EINE WEIT VERBREITETE, DOCH IN EUROPA SELTENE
UND VIELFACH VERKANNTE KRUSTENFLECHTE

von

H. HERTEL & J.-G. KNOPH

SUMMARY

Porpidia albocaerulescens (syn. *Leptothrix albocaerulescens*, *Nuilia albocaerulescens*) is a widespread, crustaceous lichen, common on shaded, acid rocks in humid, summer-warm, deciduous forests of eastern North America, as well as eastern and southeastern Asia (extending into Indonesia, easternmost Australia and northern New Zealand). In Europe, *Porpidia albocaerulescens* was most commonly misunderstood and mixed up with a variety of species of the genus *Porpidia*. It is lacking in the Mediterranean area (including Macaronesia), in the oceanic parts of Western Europe (France, United Kingdom), and in Fennoscandia.

The known distribution of *Porpidia albocaerulescens* is summarized by locality-lists and maps. As to North America, the picture is very rough, for we did not study the rich holdings of American herbaria; the presence of *Porpidia albocaerulescens* in British Columbia and Washington remains unclear.

In two tables, the mean diagnostic characters of *Porpidia albocaerulescens*, *P. contraponenda*, *P. flavocaerulescens*, *P. glaucocephala*, *P. hydrophila*, *P. macrocarpa*, *P. musiva*, *P. sorediflodes*, *P. spiraea*, *P. superba*, *P. trulliflata*, *P. tuberculosa*, *P. scoroides* and *Poeltiaria turgescens* are contrasted with one another to distinguish *Porpidia albocaerulescens* from those lichens that are most often confused with it. A list of synonyms is presented.

The following new combinations are proposed: *Porpidia con-traponenida* (Arnold) Knoph et Hertel (Basionym: *Lecidea con-traponenida* Arnold) and *Porpidia secoroides* (Anzi) Knoph et Hertel (Basionym: *Lecidea secoroides* Anzi, syn.: *Huilia macrocarpa* var. *trullisata* (Arnold) Hertel).

Geschichtliches

Im Jahre 1788, also vor fast zweihundert Jahren, beschrieb Franz Xaver Freiherr von WULFEN aus Kärnten eine neue Flechtenart, die an Silikathöckchen in den lichten Laub-mischwäldern der Umgebung von Klagenfurt auffällige weiße Krusten bildete. WULFEN konnte damals nicht ahnen, daß er mit seinem "*Lichen albo-caeruleo-sessens*" eine neue Art entdeckt hatte, die innerhalb Europas selten und nur auf ein verhältnismäßig kleines Areal beschränkt ist, während sie in Ostasien und im atlantischen Nordamerika zu den verbreitetsten und häufigsten gesteinbewohnenden Krustenflechten überhaupt gehört.

Bereits wenige Jahre nach ihrer Veröffentlichung findet sich *Lichen albo-caeruleo-sessens* unter mancherlei Namen (*Patellaria albocaeruleo-sessens* (Wulf.) Hoffm., *Verrucaria albocaeruleo-sessens* (Wulf.) Hoffm., *Lecidea albocaeruleo-sessens* (Wulf.) Ach.) in verschiedenen Florenwerken Skandinaviens, Deutschlands, Frankreichs und Englands. Schon 1798 meldet sie ACHARIUS aus Schweden, wo sie seitdem als eine verbreitete Art gilt (z.B. MAGNUSSON 1952:110, DEGELIUS 1982:70, SANTESSON 1984:130). Früh wird sie auch von den Britischen Inseln gemeldet, wo sie bis heute in Floren und Verzeichnissen geführt wird (DUNCAN 1970:36, HAWKSWORTH & al. 1980:43). In ihrer Flechtenflora Frankreichs bezeichnen sie OZENDA & CLAUZADE (1970:388) als "commun partout". VAINIO (1934:167), wie DOMBROVSKAJA (1970:35) geben sie für Finnland und die angrenzenden Teile der Sowjetunion an, SAMPAIO & CRESPI (1927:142) für Spanien, NYLANDER & NEWTON (1888:240) für Portugal, SERVIT (1931:81-82) und SZATALA (1943:26) für Griechenland, KLEMENT (1965:550-551) für die Kanaren und TAVARES (1952:361) für die Azoren, Kanaren und Madeira. In all diesen Ländern aber (Deutschland ausgenommen) kommt, wie wir nunmehr sehen, *Porpidia albocaeruleo-sessens* nicht vor. Die WULFENSche Art wurde hier mit anderen, habituell ähnlichen Sippen der Gattung *Porpidia* (syn. *Huilia*) verwechselt (so mit: *P. glaucocephala*, *P. macrocarpa*, *P. musiva*, *P. speirea*, *P. superba*, *P. secoroides*).

Zu den wenigen älteren Lichenologen Europas, die eine zutreffende Vorstellung von *Lecidea albocaeruleo-sessens* hatten, zählen F. ARNOLD und G. LETTAU. ARNOLD hatte die Art an ihrem locus classicus aufgesucht, wiedergefunden und in schönem Exsiccatenmaterial weltweit verteilt. Während ihm

einige Neufunde in Südbayern gelangen (vgl. HERTEL 1981a: 224-225), konnte er sie aus dem von ihm so planmäßig durchforschten Tirol nirgends melden (dessen ungeachtet bezeichnet sie MIGULA (1931:120) später als "in den Alpen verbreitet"). Nach ARNOLD war es wohl erst wieder LETTAU (1954:232), der die WULFENSche Art gegenüber ähnlichen Arten der *Lecidea-macrocarpa*-Gruppe (die jetzige Gattung *Porpidia*) korrekt zu unterscheiden wußte. LETTAU spricht von einer öfters verwechselten, "in Mitteleuropa offenbar spärlich verbreiteten Flechte".

Nach LETTAU wird es wieder still um unsere Art, bis diese durch HERTEL (1977:204-209) als eine im humiden, warmtemperierten Süd- und Ostasien weitverbreitete Sippe erkannt wird. Wie häufig sie dort vorkommt, zeigt die jüngste Revision dieses Formenkreises in Japan durch INOUE (1983:122), der sie als "one of the commonest lichens in Japan" bezeichnet.

Lange bekannt und dort nur selten verwechselt ist *Porpidia albocaerulescens* dagegen im atlantischen Nordamerika. Schon TUCKERMAN (1847:256) führt sie in seiner Übersicht über die Flechten Nordamerikas. Zumindest in Teilen der Appalachen ist sie ähnlich häufig wie in Japan. PLITT (1909:33) beispielsweise fand sie in der Umgebung von Baltimore (Maryland) "on nearly every rock in our wooded areas" und ähnliche Beobachtungen konnte der eine von uns (H.N.) im Shenandoah Nationalpark (Virginia) und im Great Smoky Nationalpark (Tennessee und North Carolina) machen. Trotzdem scheint auch bei amerikanischen Literaturangaben Vorsicht geboten. FINK (1935:210) hat die Art allzu weit aufgefaßt, als er *Lecidea albocaerulescens* var. *flavocaerulescens* und *Lecidea hebescens* als Synonyme einschloß. An zweifellos korrekten neueren Angaben seien herausgegriffen: DEGELIUS (1941: 34, Great Smoky Mountains), HALE (1950:195, Aton Forest, Connecticut), BRODO (1968:116, Long Island), BRODO (1981: 45, Umgebung von Ottawa).

Ob *Porpidia albocaerulescens* im Staat Washington und im angrenzenden British Columbia vorkommt, muß im Augenblick offen bleiben. Wir haben von dort noch kein Material gesehen. FINK (1935:210), THOMSON (1969:16) und DOUGLAS (1974: 587) nennen *Lecidea albocaerulescens* für Washington, OTTO & AHTI (1967:16) und OTTO (1968:369) für British Columbia.

Bereits vor Beginn unseres Jahrhunderts wurde auch das australisch-neuseeländische Areal von *Porpidia albocaerulescens* entdeckt. Aus Neuseeland melden die Art NYLANDER (1888:105), MÜLLER-ARGAU (1894:61) und HELLBOM (1896:112), aus Australien MÜLLER-ARGAU (1891:391 et 1893:46-47) und SHIRLEY (1893- nach WEBER & WETMORE 1972:50).

Während so in den letzten Jahren zunehmend klar wurde, daß es sich bei *Porpidia albocaerulescens* um eine sehr kon-

Heritage Library, <http://www.biodiversitylibrary.org/> www.bi
kurrenzkräftige Art sommerwarmer und humider Laubwaldgebiete handelt, die einerseits ein Areal im atlantischen Nordamerika und andererseits eines in Ost- und Südasien, sowie in Australien und Neuseeland besitzt, blieb ihre Verbreitung in Europa, im Erdteil ihrer Entdeckung, bis in die allerjüngste Zeit rätselhaft.

Nur sehr wenige zutreffende neuere Meldungen liegen aus Europa vor. WIRTH (1980:1254), der ihr ökologisches Verhalten treffend skizziert, fand sie im südlichen Schwarzwald wieder, während ihm die Vorkommen im nördlichen Schwarzwald, im Odenwald, Spessart und Taunus nur durch Herbarmaterial aus dem 19. Jahrhundert bekannt sind. HERTEL (1981a:225) gelang ein neuer Fund im südlichsten Bayern, MAURER & al. (1983:134) berichten über Vorkommen im Schöckl-Gebiet (Steiermark). In guter Kenntnis ihrer Standortansprüche gelangen in neuerer Zeit POELT viele Funde im östlichen Österreich.

Nach der eingehenden Beschäftigung des älteren Autors mit dieser Art in Asien (HERTEL 1977) und im australisch-neuseeländischen Raum (HERTEL 1984) lag die Revision auch des europäischen Materials nahe. Der jüngere Autor (J.K.) unterzog sich dieser Aufgabe in Rahmen einer Diplomarbeit, während der das einschlägige Material der Herbarien in Berlin-Dahlem (B), Bern (BERN), Graz (GJO und GZU), München (M) und Wien (W), durchgearbeitet wurde. Die Herbarien in London (BM), Stockholm (S) und Uppsala (UPS) wurden später auf ergänzendes Material hin durchgesehen. Funde aus Nordamerika wurden nur beiläufig registriert, weshalb die beigegebene Punktverbreitungskarte für Nordamerika sicher noch ganz erheblich ergänzt werden kann.

Unser Dank gilt den Direktoren und Konservatoren der genannten Herbarien für das bereitwillige Entleihen der Proben, Herrn Prof. Dr. Ch. LEUCKERT (Berlin) für die Hilfe bei der Auswertung chemischer Analysen, Herrn G. RAMBOLD und A. SCHWAB (beide München) für viele nützliche Hinweise, Herrn Dr. A. VĚZDA (Brno) für die Hilfe beim Lokalisieren alter Fundortsangaben aus dem ehemaligen Groß-Ungarn und Herrn Prof. Dr. J. POELT (Graz) für die zahlreichen Funde, die er uns zur Veröffentlichung überließ.

Zur Kennzeichnung von *Porpidia albocerata* sicc.

Ausführliche Beschreibung

THALLUS: meist mäßig dünnkrustig (0.25-0.4 mm hoch), selten auch dicker (bis 1.5 mm), ausgedehnt (gelegentlich bis über 40 cm im Durchmesser - so im Great Smoky National Park), schmutzig weißlich, bläulich grauweiß, weißgrau bis grau, sehr selten leicht rostig, im Herbar (wie viele norstictin-säurehaltigen Flechtenarten) allmählich vergilbend und dann von gelblicher, beiger oder creme-farbener Tönung. Gelegentlich zeigen die Randbereiche des Thallus eine hellere Farbe als das Zentrum. Thallusoberfläche in der Regel glatt und zusammenhängend bis rimos, gelegentlich unregelmäßig wulstig. HYPOTHALLUS: schwarzgrau bis schwarz; ein bis 0.1 mm breiter, nur selten deutlich entwickelter Saum. Thallus aber stets scharf gegen Nachbarthalli abgesetzt. APOTHECIESEN: sehr zahlreich, bis über 80 pro cm^2 , selten größer als 2.2 mm Ø, einzeln oder in dichten Gruppen, in der Regel zu 25%-75% ihrer Höhe, selten auch völlig, in den Thallus eingesenkt, sehr selten mit schwach verengter Basis aufsitzend. Wulstrand um 0.1 mm breit, schwarz, bei älteren Apothecien manchmal leicht verfaltet, meist auch im Alter deutlich bleibend. Scheiben flach bis mäßig stark gewölbt, weißgrau bis blaugrau bereift, an Schadformen mitunter schwarzbraun, unbereift, bei Vorkommen über eisenhaltigem Substrat selten auch leicht "rostfarben bereift". EPIHYMENIUM: 10-20 µm hoch, hellbraun bis dunkelbraun, selten schwarzbraun, sehr selten braunoliv. HYMENIUM: (75-) 90-105-120 (-135) µm hoch, farblos, J+ tiefblau. SUBHYMENIUM: 15-45 µm hoch, sowohl gegen das Hymenium, als auch gegen das Hypothecium hin nur schwer abzugrenzen. HYPOTHECIUM: (75-) 90-200 (-300) µm hoch, dunkelbraun bis braunschwarz, mit Überwiegend vertikal verlaufenden Hyphen, manchmal auch angedeutet "plektenchymatisch", mit fließenden Übergang zur Medulla. EXCIPULUM: 60-95-135 µm breit, mit dunkelbraunem bis braunschwarzem, unterschiedlich breitem, meist jedoch schmalem Rindenbereich und schwach bräunlichem bis farblosem Innenbereich. Excipularhyphen 1.8-4.2 µm breit. Das Excipulum ist gegen die Medulla hin nicht, gegen das Hypothecium hin nur wegen der geringeren Pigmentierung abgrenzbar. PARAPHYSEN: Überwiegend unverzweigt, schwach bis mäßig stark anastomosierend, zart, 1.4-2.0 µm breit, die obersten 2-4 Zellen etwas verbreitert, die Apikalzellen 2.5-3.5 µm breit. ASCII: keulig, 70-120 x 15-24 µm. Äußerer Bereich der Ascuswand (Querschnitt!) J (conz.) + blau bis blau-braun, nicht kräftig rotbraun. SPOREN: ellipsoidisch bis schlank ellipsoidisch, unreif häufig etwas zugespitzt, (14.5-) 18-22-27 (-32) x (6-) 7.5-9.5-12 (-14) µm. PYKNIDEN: in den Thallus völlig eingesenkt, kugelig, um 80 µm Ø, mit unpigmentierter bis bräunlicher Öffnung. Pyknosporen stäbchenförmig, 6-8-11 (-14) x 1 µm. TÜPFELREAKTIONEN und FLECHTENSTOFFE: Thallus (vor allem Medulla): K+ gelb (selten K+ gelb → dann rot), P+ orange (selten

P+ gelb), C-, KC-, J- (sehr selten J+ violett). Hauptinhaltsstoff ist entweder Stictinsäure (in Europa bisher ausschließlich diese Chemorasse) oder Norstictinsäure. Die insgesamt selteneren, vor allem in den warmtemperierten bis subtropischen Bereichen Süd- und Südostasiens vorkommende Norstictinsäure-Rasse wurde bislang als "var. *polycarpiza*" abgetrennt (*Hulia albocaeruleascens* var. *polycarpiza* Vain.) Hertel, *Lecidea polycarpiza* Vain.), mag aber als eigenständige Varietät vielleicht überbewertet sein.

Kurzcharakteristik

Porpidia albocaeruleascens ist bei guter Entwicklung vor allem durch die folgenden Merkmale zu kennzeichnen:

Große bis sehr ausgedehnte, geschlossene, glatt wirkende, mäßig dicke, soralfreie, weiße Lager mit J-negativer Medulla und reichlich Stictin-, oder (seltener) Norstictinsäure als Hauptinhaltsstoff. Apothecien zahlreich, stark eingesenkt, mit blaugrau bereiften Scheiben. Am mikroskopischen Bild (Apothecien-Längsschnitte) sind das braune (bestenfalls olivbraune, aber nie grüne) Epithymenium, das im Innenbereich helle bis sehr helle Excipulum mit auffällig schmalen Excipularhyphen, sowie das schwarzbraune Hypothecium besonders kennzeichnend. Sehr typisch sind nicht zuletzt die Standortsansprüche: kalkfreie Silikatblöcke in lichten, luftfeuchten und sommerwarmen Laubmischwäldern.

Verwechslungsmöglichkeiten

In Europa wurde *Porpidia albocaeruleascens* häufig verwechselt mit zahlreichen anderen Arten der Gattung *Porpidia*. Ein kräftiger weißer Thallus und bereifte Apothecien genügten häufig, um einer *Porpidia* das Etikett "*Lecidea albocaeruleascens*" aufzukleben. Im australisch-neuseeländischen Raum wurde die Sippe zumindest gelegentlich mit *Poeltiaria turgescens* (Koerb.) Hertel (syn. *Lecidella turgescens* Koerb., *Lecidea turgens* Nyl. ex Hue nom. illegit.) verwechselt.

Es empfiehlt sich, immer die Gesamtheit aller diagnostisch wichtigen Merkmale im Auge zu behalten. Deshalb werden im folgenden die wichtigsten, mit *Porpidia albocaeruleascens* Verwechselbaren Arten mit ihren besonders kennzeichnenden Merkmalen in Tabellenform einander gegenübergestellt.

Art	Sporo.	Reag. I-Halogenstoff	Reaktion 3-Reakti- on	maxim. Apoth.-Ø (mm)	Apotheken- eingesenk- t?	Apoth.-Schalen- reift	Substrat	Anmerkungen		
								flach braun	grau	
<i>Porpidia albocaerulescens</i>	-	STI - - - -	3-	2,6	eingesenk	++	SI	Laubmischwälder		
<i>P. contraponenda</i>	-	- - - - -	3-2	3- (3+)	1,2(-2,2)			sehr selten	SI	wenig studiert
<i>P. flavocerulescens</i>	-	+ - - - -	CON - -	3- (3+)	3,0	angepreßt	++	SI	± alpine Stufe	
<i>P. glaucophaea</i>	-	+ - - - -	β-1 -	3-	2,8		++	ja	SI	± montane Stufe
<i>P. hydrophila</i>	-	- - - - -		3-	3,5				SI	oft nahe Orte
<i>P. macrocappa</i>	-	STI - - - -		3-	4,0		zT	sehr selten	SI	sehr variabel
<i>P. musiva</i>	-	- - - CON - -	3-	2,0(-2,8)					SI	
<i>P. morelloides</i>	+	STI - - - -	3-	1,2			zT	ja	SI	bis montane Stufe
<i>P. speirea</i>	-	- - CON - -	3- 3+	2,5	± eingesenkt bis aufsitzend			SI SI _{Ca}	SI _{Ca}	Sammelart
<i>P. superte</i>	-	STI - - - -	3-	2,0(-3,0)				SI SI _{Ca}		
<i>P. trullisata</i>	-	STI - - - -	3+	3,0		++		SI _{Ca}	alpine Stufe	
<i>P. tuberculosa</i>	+	- - CON - -	3+	2,2			zT	SI		bis montane Stufe
<i>P. zonoides</i>	-	STI - - - -	3-	4,5		++		SI _{Ca}	alpine Stufe	
<i>Pomtiaria turgescens</i>	-	- - CON - -	3-	4,5		++	ja	SI	nur Australien, und Neuseeland	

Tabelle 1: Makroskopische und chemische Merkmale einiger mit *Porpidia albocaerulescens* verwechselbarer Flechtenarten.

Anmerkungen zu den Tabellen

Sorale. Oft leicht zu übersehen!

Hauptinhaltsstoff. Daten wurden mittels Dünnschichtchromatographie (Standardverfahren, vgl. CULBERSON & AMMANN 1979) erhoben.

CON = Confluentinsäure

NOR = Norstictinsäure

STI = Stictinsäure

P-1 = unbekannter Stoff (nach Ch. LEUCKERT, mündlich, wahrscheinlich ein Depsidon vom Orcin-Typ): Rf-Klassen A:5, B:6, C:5-6; Flecke im Tageslicht nicht sichtbar, mit Wasser nicht benetzbar, in UV 254 nm fluoreszenzlöschend, in UV 350 nm schwach hellblau, nach Behandlung mit Schwefelsäure, wie mit Anisaldehyd-Schwefelsäure rosa.

P-2 = unbekannter Stoff: Rf-Klassen A:6, B:4(-5), C: 5-6; Flecke im Tageslicht nicht sichtbar, in UV 254 nm fluoreszenzlöschend, in UV 350 nm nicht sichtbar, mit Wasser benetzbar, nach Behandlung mit Schwefelsäure schwach rosa, mit Anisaldehyd-Schwefelsäure rötlich.

Medulla, J-Reaktion. Mikroskopisch mit Lugol'scher Lösung an 15 µm dicken Schnitten zu prüfen. Jede Art zeigt eine ausgeprägte Tendenz, nie eine absolute Konstanz bezüglich ihres Verhaltens gegenüber Jodlösung. Prüft man sehr umfangreiches Material einer J-negativen Art, so wird man mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Proben mit schwach positiver Reaktion und vielleicht auch seltene Einzelproben mit stark positiver Reaktion finden. Umgekehrt kann bei einzelnen Exemplaren üblicherweise J-positiver Sippen diese Reaktion ausbleiben oder auf inselartige Bereiche der Medulla beschränkt sein.

Apothecien eingesenkt? Vorsicht bei geschädigten Proben (Windschliff, Schneckenfraß).

Apothecien-Bereifung. Bei Schadformen kann die Bereifung abgewischt sein. Einige Arten entwickeln nur gelegentlich bereifte Apothecien (zT).

Apothecien-Scheiben feucht braun. Apothecien anfeuchten und warten bis maximale Quellung erreicht ist. Bei einigen Arten erscheint die Scheibe der Apothecien dann bräunlich (statt schwarz oder blaugrau).

Substrat. Es ist zu unterscheiden zwischen kalkfreien, sauren Silikaten (Si) und solchen Silikatgesteinen, bei denen ein Kalkgehalt mittels Auftröpfen von Salzsäure (HCl) nachweisbar ist (HCl^+). Auf reinen Kalken und auf Dolomit sind Porpidia-Arten nicht bekannt.

Epihymenium-, Hypothecium-, Excipulum-Färbung. Zu beurteilen an ca. 15 µm dicken Schnitten (in Wasser), bei tageslichtartiger Beleuchtung. Beim Excipulum beziehen sich die Angaben auf den Innenbereich, nicht auf den stets dunklen Randsaum.

Art	Ecthymenid-Farbe	Pyrenidum-Höhe (µm)	Sporangium-Länge (µm)	Hypothecium-Farbe	Ectipulpa-Farbe	Ectipulpa-Höhen- d (µm)	Ectipulpa-K+-Reaktion	Kaliumchlorid-Reaktion
<i>Porpidea albocerulescens</i>	br gb	90-105-120	18-22-27 (-32)	schwarzbraun	fast farblos o. hellbraun	2-4	K-	blau
<i>P. correspondens</i>	gb	80-100-130	15-22-30	dunkelbraun	braun	3-6	K-	rotbraun
<i>P. flavocochlear- lesscens</i>	gb	70-100-130	14-20-26	schwarzbraun	hellbraun bis dunkel rotbraun	2-4	K-	blau
<i>P. glaucophaea</i>	br	90-110-130	15-20-25	schwarzbraun	hellbraun	2-4	K-	blau
<i>P. hydrophila</i>	ca	80-110-140	15-18-30	schwarzbraun	(hell)braun	3-5	K-	blau
<i>P. macrocarpa</i>	br gb	75-100-130	15-21-27	dunkelbraun bis schwarz- braun	hell- bis dunkel- braun oder gelbbraun	3,5-8	K-	rotbraun
<i>P. musiva</i>	br gb	75-95-125	14-18-23	schwarzbraun	dunkelbraun	3,5-5,5	K-	blau
<i>P. setulosodes</i>	br	85-105-130	16-20-25	dunkelbraun	gelbbraun	4-7	K-	rotbraun
<i>P. speciosa</i>	gb	70-90-105	12-14-19	schwarzbraun	(hell)braun oft reduziert	3-5	K-	blau
<i>P. superba</i>	br	100-115-150	18-23-33	schwarzbraun	schwarzbraun	3-7	K-	rotbraun
<i>P. trullinata</i>	gb	70-90-105	12-14-18	schwarzbraun	(hell)braun	3-5	K-	rotbraun
<i>P. tuberculosa</i>	br gb	90-100-120	15-20-25	schwarzbraun	schwarzbraun	2,5-4,5	K-	blau
<i>P. zeocroides</i>	br gb	100-125-145	16-21-30	schwarzbraun	braun	4-7	K-	rotbraun
<i>Positaria turgescens</i>	ca	80-100-120	12-18-22	fast farblos	fast farblos	2-3,5	K-	blau

Tabelle 2: Mikroskopische Merkmale einiger mit *Porpidia albocerulescens* verwechselbarer Flechtenarten.

alte Namen	neue Namen
<i>Lecidea albocauulescens</i> (Wulf.) Ach.) [*] f. <i>albuginosa</i> (Myl.) Zahlbr., L. <i>albuginosa</i> Myl. var. <i>spuma</i> Schaeff. var. <i>flavocerulescens</i> (Hornem.) Scheen, L. <i>flavo-</i> <i>cerulescens</i> Hornem.) [*] var. <i>smaragdula</i> Knobels in A.L.Smith var. <i>scutellifera</i> Vain. in Neuvil var. <i>sordidicoma</i> (Myl.) Zahlbr.	<i>Porpidia albocauulescens</i> (Wulf.) Hertel & Knoph <i>Porpidia glaucophaea</i> (Koerb.) Hertel & Knoph <i>Porpidia glaucophaea</i> (Koerb.) Hertel & Knoph <i>Porpidia flavocerulescens</i> (Hornem.) Hertel & Schwab <i>Porpidia hydrophila</i> (Fr.) Hertel & Schwab <i>Porpidia glaucophaea</i> (Koerb.) Hertel & Knoph <i>Porpidia glaucophaea</i> (Koerb.) Hertel & Knoph
<i>Lecidea alboflavescens</i> Vain. L. <i>suastiana</i> Räs. L. <i>caesicloride</i> Zahlbr. L. <i>caliengensis</i> Zahlbr. L. <i>galactochrysea</i> Zahlbr. L. <i>ochropolia</i> Zahlbr.	L. <i>overeendi</i> Zahlbr. L. <i>pindorensis</i> Räs. L. <i>polynesica</i> Zahlbr. L. <i>roseococinerea</i> Zahlbr. L. <i>subrubella</i> Stirn. L. <i>yazoenensis</i> Zahlbr.
<i>Lecidea contraponenda</i> Arnold <i>Lecidea speirea</i> (Ach.) Ach. var. <i>trullinata</i> (Kromph.) Arnold) ^{**}	<i>Porpidia contraponenda</i> (Arnold) Knoph & Hertel <i>Porpidia speirea</i> (Ach.) Kromph. <i>Porpidia trullinata</i> (Kromph.) Koerb.
<i>Hudzia macrocarpa</i> (DC.) Hertel var. <i>trullinata</i> (Arnold) Hertel)	<i>Porpidia macrocarpa</i> (Arnold) Knoph & Hertel

*) Die Orthographie bei den Epitheta lässt "albocauulescens" und
 "flavocerulescens".
 **) Diese Veröffentlichung ist höchst von (lat.) "trullinatus" (= mit Körnchen) abgeleitet, schreibt KROMPHOLZ und ARNOLD schwäbisch
 "trullata". Wie folgen auch weiterhin diese Orthographie.

br = braun (neutrale Braun-Töne, ohne Grün-Anteil)
gb = grünbraun (stumpfe, oft schmutzig wirkende Färbung,
wie sie durch Mischen der Farben Grün, Braun und
Grau entstehen)
sm = smaragdgrün (leuchtendes Blaugrün bis Grünblau)

Excipularhyphen-Durchmesser. An Wasser- oder Lactophenol-
Präparaten im mittleren Teil des Excipulums zu messen (zum
Randsaum und zum Hymenium hin werden Excipularhyphen oft
dünner). Die Werte beziehen sich auf den Gesamtdurchmesser
(Zell-Lumen + -Wand).

K-Reaktion des Excipulums. Beim Durchsaugen von Kalilauge
(KOH) kann sich die Färbung des Excipulum-Innenbereichs
schwach bis stark in Richtung Rot, Rotbraun oder Rotviolett
verändern. Die dieser Reaktion zugrundeliegenden chinoiden
Stoffe sind unbekannt.

Ascuswand-J-Reaktion. G. RAMBOLD (unveröffentlicht) fiel
kürzlich auf, daß nach Behandlung mit konzentrierter LUGOL-
scher Lösung (2g KJ und dann 1 g J in 100 ml aqua dest. -
Wasser im Präparat vorher absaugen, dann erst LUGOLSche
Lösung zugeben!) der äußere Bereich der Ascus-Wand sich bei
einigen Arten von *Porpidia* mehr blau (auch braun-blau), bei
anderen Arten aber kräftig orangebraun färbt. - Dieses Merk-
mal bedarf noch dringend der kritischen weiteren Prüfung.

Umkombinationen

Eine ausführlichere Darstellung vor allem der mitteleuro-
päischen *Porpidia*-Arten soll, nach Klärung einiger noch
offener Fragen, später erfolgen. An dieser Stelle sollen
aber im Vorriff zwei in die Merkmals-Tabellen aufgenommene
Sippen neu kombiniert werden:

Porpidia contraponenda (Arnold) Knoph & Hertel comb.
nova

Basionym: *Lecidea contraponenda* Arnold, Verhandl. zool.-
bot. Ges. Wien, 36: 79 (1886).

Porpidia secoroides (Anzi) Knoph & Hertel comb. nova

Basionym: *Lecidea secoroides* Anzi, Comment. Soc. Critt.
Ital. 2(1): 17 (1864).


Syn.: *Ruilia macrocarpa* (DC.) Hertel var. *trullisata*
(Arnold) Hertel,
Lecidea platycarpa Ach.f. *trullisata* Arnold.

Verbreitung der *Porpidia alboceruleoalba*

Karte 1 zeigt die Lage der uns derzeit bekannten Fundorte.
Durch Schraffur sind weitere Gebiete ausgewiesen, in denen
uns das Auftreten dieser Art wahrscheinlich erscheint.

Karte 2 zeigt, nochmals in größerem Maßstab, die in Europa bekannten Fundorte. Wahrscheinlich erscheint uns, daß *Porpidia albocerulescens* auch in den Vogesen aufgefunden (und damit für Frankreich nachgewiesen) werden kann, nachdem sie aus dem gegenüberliegenden Schwarzwald bekannt ist. Von der klimatischen Situation her wäre auch ein Vorkommen auf den Azoren, in den Gebirgen Nord-Portugals, in Teilen der Pyrenäen, in den Gebirgen der Balkanhalbinsel und im Kaukasus denkbar.

Karte 3 zeigt die Lage der wenigen, von uns überprüften Funde aus dem atlantischen Nordamerika. Dieses Teilareal dürfte sich wohl tiefer in das Hinterland hinein erstrecken, als angegeben. Daß *Porpidia albocerulescens* auch im Bereich der Staaten Washington und British Columbia vorkommt, wäre denkbar.



EUROPA

Belgien: Ad saxa in sylvis Ardennarum, ?J.P. MONTAGNE (UPS).

Deutschland: Nordrhein-Westfalen: Hillbach (? bei Aachen), auf Quarzit, A. FÖRSTER no. 6 (M). - Hessen: auf Granit in den Bergwäldern bei Darmstadt, P. BAUER (GJO, M - RABENH., Lich. Eur. 232); Darmstadt, am Fuß des Herrgottsberges, an der Westseite, leg. ? (M). - Baden-Württemberg: zerstreut und selten um Heidelberg, 1849, Ph. ZWACKH (M, UPS); Heidelberg, an Sandstein, Ph. ZWACKH (M - ZWACKH, Lich. exs. 129b); Heidelberg, auf Sandstein am Königsthül, selten auf Granit, VIII.1857, W. AHLES (M, W - JACK, LEINER, STIEZENB., Krypt. Badens 25); Heidelberg, an Porphyrr. Ph. ZWACKH (M - ZWACKH, Lich. exs. 129a); Leimen bei Heidelberg, an Sandsteinblock im Laubwald, 1903, G. LETTAU (BERN); aus dem Albtal bei Ettlingen, 1859, W. BAUSCH (M, UPS); Odenwald, Ziegelhausen, Mansbach, feuchter Laubwald, große, schattige Granithölzer, 150 m, 16.VIII.1953, O. BEHR (B - als *Lecidea sorodisoides*); Schwarzwald-Vorberge, Scheinberg bei Maulburg, Wiesental, an beschatteten Sandsteinblöcken im obersten Alsbachtal, 500 m, 14.V.1922, G. LETTAU (B); Schwarzwald, Albtal bei Wilfingen südlich St. Blasien, an Granithölzern bei der Teufelsküche, 570 m, 26.IV.1914, G. LETTAU (B); Schwarzwald, Kreis Lörrach, nördlich Schönau, am Weg nach Holzinshaus, am Grunde feuchter, beschatteter Steinflächen, 600-700 m, 17.V.1967, J. POELT 4446 (Poelt). Bayern: Oberbayern, lkr. Garmisch-Partenkirchen, Steinkogl im Murnauer Moos, NW Eschenlohe, ca. 650 m, 15.VIII.1971, H. HERTEL 12 174 (M); ebendort, auf nur knapp die Bodenvegetation überragendem, niedrigen Sandsteinblock im lichten Wald nahe dem Gipfel, ca. 690 m, 3.VIII.1983, J.-G. KNOPH (Knoph) und H. HERTEL 25 541 (M); Starnberg, Haarkirchen, 1847, F. KUMMER (M); Starnberg, an kleinen Gneisblöcken im Walde zwischen Haarkirchen und Farchach, 1.VI.1895, F. ARNOLD (M, W - ARNOLD, Lich. Monac. 401); Starnberg, Glimmerstein am Waldgehänge südlich bei Haarkirchen, 29.VII.1890, F. ARNOLD (M); Starnberg, Gneis-Stein auf der bewaldeten Höhe zwischen Neufahrn und Merlbach, 19.IX.1890, F. ARNOLD (M); Starnberg, Findling im Buchenwald östlich von Berg, ca. 1 km von der Kreuzung des Bachjägerwegs mit dem Manthahammerweg entfernt, 12.XII.1982, J.-G. KNOPH (Knoph).

Schweiz: Ohne Lokalität: J. SCHLEICHER (M). - Kanton Zürich: an Alpenfindlingen, Ph. SCHÄFER (BERN, M, W - SCHÄFER, Lich. Helvet. 471 und HEPP, Pl. Eur. 243). - Kanton Tessin: Arogno, südlich Lago di Lugano, Hügel SW davon, Porphyrblocke im Jungwald, 5.X.1936, E. FREY 1424 (BERN); Locarno, ob Pte. Brolla, in Wiesen unter Kastanien, 600 m, 6.VIII.1919, E. FREY (UPS).

Österreich: Steiermark: Sausal-Gebirge, Bez. Leibnitz, tiefer bewaldeter Graben zwischen Mitteregg und Koregg, Felsen in und am Bach, 10.IV.1983, R. FILSON & J. POELT (M); Fossruck-Gebirge, Bez. Leibnitz, Heilig-Geist-Klamm südlich



Karte 2: Bisher bekannte Fundorte von *Porpidia albocerulescens* in Europa.

Leutschach, Blöcke im feuchten Schluchtwald, 500-600 m., 13.V.1973, J. POELT (GZU, M, Poelt); Koralpe, Bez. Voitsberg, linke Hänge des Teigitschgrabens südlich Voitsberg, Schrägfächen vom Gneisfelsen, 6.V.1973, J. POELT (GZU, M, Poelt); Koralpe, Deutschlandsberg, VII.1876, E. KERNSTOCK 1423 und 1425 (W); Laßnitzklause bei Deutschlandsberg, leg. ? (M); Deutschlandsberg, an Gneisfelsen, J. GLOWACKI 5038 (GJO); Teigitschklamm bei Köflach, Gneisfels 25.VI. ?, leg. ? (GZU, M); Gneisfelsen der Teigitschklamm, ca. 700-900 m, VI.1933, M. STIPPL (GZU); Fischbacher Alpen, Schlucht östlich Pöllau gegen Pöllauberg, ca. 430 m, 4.V.1978, J. POELT (GZU); Grazer Bergland, Schöcklgebiet, Buchgraben NE Überschöckl, kleine Glimmerschieferfelsen nahe dem Bachbett, ca. 540 m, 26.IV.1983, Ch. SCHEUER (GZU); Tschemeritzer Graben, leg. ? (GJO), ohne Lokalität, E. KERNSTOCK 1427, 1428 (W). - Kärnten: auf einem Chloritschieferfelsen im Walde des Kreuzbergs oberhalb Ziguin bei Klagenfurt, 29.VII.1881, F. ARNOLD (ARNOLD, Lich. exs. 894. M: Neotypus; GJO, M, W: Iso-Neotypen); ebendort, am Waldbach und auf Chloritschiefer der Wiesennauer, VII.1881, F. ARNOLD (M); Sekirn am Wörther See (46° 36' N, 14° 12' E), J. STEINER (GJO, UPS, W - STEINER, Lich. Karinthiae 135); Klagenfurt, Wolfnitztal, J. STEINER (W), Gurkitesch, westlich Klagenfurt, (46° 37' N, 14° 14' E), J. STEINER (W).

Tschechoslowakei: Slowakei: Kleine Karpaten, an überschatteten Granitblöcken am Fuße des Großen Ahornberges bei St. Georgen (ca. 15 km NE Bratislava), III.1894, A. ZAHLBRUCKNER (W). "Hungaria, comit. Sáros: "ad saxa trachytica prope Eperies" (heute Prešov) et Ungvar (siehe unter Sowjetunion), F. HAZSLINSZKY (M, W - KOERB, Lich. sel. 224). "Hungaria, comit. Sáros: Abos" (ca. 15 km N Košice), in Rupibus quartzosis, F. HAZSLINSZKY (W). "Hungaria, comit. Abauj-Torna:" Stoz, F. HAZSLINSZKY (UPS). Slowakei: "Felsö-Remece, Oberungarn" (heute Vyšné Remetské Hamre), IX.1889, F. VESLSKY (W).

Sowjetunion: Ukrainsche S.S.R., Zakarpatskaja Oblast: Ungvar (heute Ufgorod), ad saxa trachytica, H. LOJKA (W); ad lapides trachyticas in monte Ostaszek prope pagum Kapuszó (Vorvező, heute: Voroncov), ca. 300 m, VIII.1916, O. SEATALA (GZU, M, W - Flora Hung. exs. 712).

Rumänien: supra saxa micaceous-schistosa vallis Riu mare infra alpem Retezat, com. Hunyad in Transsylvania, H. LOJKA (M, UPS, W); Vulkán prope Petroșeny in Transsylvania, supra saxa micaceous-schistosa, H. LOJKA (W).

Italien: Prov. Novara: Sul gneis al ponte di Santino in Valle Intrasca, Lago Maggiore, F. BAGLIETTO (M - Erb. Critt. Ital. 84). Prov. Sondrio: ad saxa granitica erratica in silvis umbrosis, in vadice montium prov. Sondriensis et Novo-Conensis, M. ANZI (M - ANZI, Lich. Ital. super. 282). Prov. Vicenza: ad rupes trachyticas Euganeorum et basalticas montis Gazzo Bassanensium (M - TREVISAN, Lichenotheca Veneta 128). Prov. Trieste: Rojana bei Triest, 30.XI.1859, M. TOMMASINI (W).

Digitized by Google



Karte 3: Verbreitung von *Porpidia albocrenulata* im atlantischen Nordamerika aufgrund überprüfter Belege. Die Art ist in diesem Gebiet sehr verbreitet. Ihr nordamerikanisches Areal dürfte wesentlich größer sein, als durch diese Punkte abgesteckt.

Jugoslawien: Istrien: Kirchheim-Verhcev (unleserlich), Sandstein, IX.1869, J. GLOWACKI 475 (M). - Hrvatska: Zagrebacka Gora, Zeleni Skriljavei, 700 m, 25.III.1927, F. KUSAN (UPS).

AMERIKA

Kanada: Umgebung von Ottawa - nach BRODO (1981:45).

U.S.A.: Maine: Warren, G.K. MERRILL (S). - New Hampshire: Chocorua, 1911, W.G. PARLOW (UPS - Reliquiae Farlowianae, s.n.). - Massachusetts: Worcester Co., West Boylstone, plentiful on vertical face of rock outcrop on moist slope to River Road with morning sun, Fitchburg granite ledge, 1.VIII.1960, B. GATER (Poelt). - Connecticut: West Gorham, on granitic rock, 3.VIII.1895, H.A. GREEN (W). - New York: Warrensburg, on rocks in shade, 13.VII.1932, J.L. LOWE s.n. (UPS); Bronx Park, 1.IX.1896, A. SCHNEIDER (M); Long Island, zahlreiche Funde: BRODO (1968:166). - Pennsylvania: supra saxa in Pennsylvania, 1883, J. ECKFELDT (M, W). - Maryland: Near Baltimore, on various rocks, 1909, C. PLITT (W, W - MERRILL, Lich. exs. 178); Frederick Co., 6.VII.1924, on outcropping rock in woods, Seyer Lock, Mt. ?(unleserlich), C. PLITT (UPS). - Illinois: Cobden, on sandstone, F.S. EARLE (W). - Indiana: Parke Co., Swordnose Gorge, 22 km S.W. of Greencastle, c. 230 m, 23.VIII.1958, S. SHUSHAN S 9073 (S); Pretty Bay Creek (oder ähnlich; schwer leserlich), Baltimore Co., 4.VII.1928, C. PLITT (UPS). - West Virginia: Clover Lick, 9.VII.1929, F.W. GRAY (UPS). Virginia: Giles Co., Mountain Lake, At the Cascades, 4000 ft., VIII.1963, W. CULBERSON 11463 (UPS). Shenandoah National Park: Madison Co., Hawksbill Mountain, nordseitige Felssabbrüche, ca. 1300 m, 27.III.1970, M.E. HALE & J. POELT (Poelt 8128); Page Co., Skyline Drive of Thornton Gap, Crescent Rock Overlook, 1000 m, 13.IX.1977, J. HAFELLNER (GZU). - Kentucky: Near Besca (?), sandstones along bluff, 29.X.1908, B. FINK (UPS). - Tennessee: Great Smoky Mts.: Cherokee Orchard, 760 m, 11.IX.1939, G. DEGELIUS (UPS); North Carolina: Crowdens, supra saxa syenitica-schistosa, 25.VII.1883, H.A. GREEN (UPS); Davidson Co., 3 mi. n. of Silver Valley, 2.VIII.1957, W.L. CULBERSON 6403 (UPS); Stanly Co., Yadkin River, just above the lower power dam E of Baden, on rocks, shaded hillside, 10.V.1963, W.L. CULBERSON 10946 (M); Orange Co., Durham, Duke Forest, Korstian Division, Compartment no. 37, Piney Mountain, near New Hope Creek, 110 m, 6.XI.1975, K. & B. AMMANN (BERN); Haywood Co., Great Smoky Mountains National Park, Big Creek, Cove Hardwood-Forest, 600-700 m, 25.VIII.1977, J. POELT (GZU); ebendorf, L. TIBELL 7491 (UPS); Stokes Co., Hanging Rock State Park, Window Falls, unterhalb Hanging Rock, Laubmischwald, ca. 450 m, III.1970, W.L. CULBERSON & J. POELT 8301 (Poelt). - South Carolina: Blackstock, on rocks, 14.II.1893, H.A. GREEN (M - CUMMING, Decad. North Am. Lich., ed. I, 84).

Asien

Die in der umseitigen Verbreitungskarte markierten asiatischen Fundorte finden sich ausführlich zitiert bei HERTEL (1977: 205-210), der Fund von Hunan bei HERTEL (1981b:451). Die Angaben für Japan stützen sich zusätzlich auf INOUE (1983:125, 126).

Australien und Neuseeland

Australien: Queensland: Brisbane, 1878, J.M. BAILEY (BM, Isotypus von *Lecidea subnubila* Stirb.) - *New South Wales, North Coast*: below Waihou Trig Station, 25 km NW of Coffs Harbour, 30° 06' S, 153° 02' E. On coastal hillside moderately steeply sloping. On small sandstone outcrops with *Parmelia* and *Leptogium*. 340 m, in *Fristania-Ficus* closed forest with *Akasia lucens* and *Orites excelsa* understorey, 12.X.1978, D. VERDON 3821 (M ex CBG 7.809.302).

Neuseeland: North Island: Auckland, Three Kings Islands: Great Island, Tasman Valley, 13.XI.1979, D. GALLOWAY (BM). Auckland, Bay of Islands, Maitangi, X.1874, S. BERGGREN (S). Auckland, Hauraki Gulf, Rangitoto Island, 36° 50' S, 9.XI.1982, J.K. BARTLETT 20.698 (M). Auckland, Waitakere Coast, Whatipu, 37° 04' S, 174° 10' E, on andesitic rock, 25 m, 27.X.1983, J.K. BARTLETT 27.025 (M), 27.026 (M), 27.021 (M). East Cape, Mt. Hikurangi, 1200 m, 29.XII.1982, J.K. BARTLETT 26.996 (M), 27.009 (M). South Ruahine, Manawatu Gorge, 400 m, 8.X.1983, J.K. BARTLETT 26.995 (M). - South Island: Nelson, ultramafic area near summit of Dunn Mt., c. 1000 m, 15.VII.1979, J.K. BARTLETT 27.923 (M). Marlborough, Kaikoura Coast, 20 km south of Kaikoura, 30 m, 14.IX.1978, J.K. BARTLETT 27.039 (M). - Ohne Lokalität (vielleicht aus der Umgebung von Wellington), Ch. KNIGHT (B, M, W - ZWACKH, Lich. exs. 1204); desgleichen (M - ZWACKH, Lich. exs. 1205).

- ACHARIUS, E. 1798: *Lichenographiae Sveciae Prodromus.* - *Lincopiae.*
- BRODO, I.M. 1968: The Lichens of Long Island, New York: A Vegetational and Floristic Analysis. - Bull. New York State Museum and Sci. Service, 410.
- 1981: Lichens of the Ottawa Region. - *Syllogeus* (Ottawa), No. 29.
- CULBERSON, Ch.P. & K. AMMANN, 1979: Standardmethode zur Dünnschichtchromatographie von Flechtensubstanzen. - *Herzogia*, 5: 1-24.
- DEGELIUS, G. 1941: Contributions to the Lichen Flora of North America. II. The Flora of the Great Smoky Mountains. - *Arkiv för Botanik* 30A no. 3.
- 1982: The Lichen Flora of the Island of Vega in Nordland, Northern Norway. - *Acta Reg. Soc. Sci. Litt. Gothoburg. Botanica* 2.
- DOMBROVSKAJA, A.V. 1970: Konspekt flory lischajnikov Murmanskoj oblasti i severo-vostotschnoj Finljandii. - Akademia Nauk SSSR, Leningrad.
- DOUGLAS, G.W. 1974: Lichens of the North Cascade Range, Washington. - *Bryologist* 77: 582-592.
- DUNCAN, U.K. 1970: Introduction to British Lichens. - Arbroath.
- FINK, B. 1935: The Lichen Flora of the United States. - The University of Michigan Press, Ann Arbor.
- HALE, M.E. 1950: The Lichens of Atom Forest, Connecticut. - *Bryologist* 53: 181-213.
- HAWKSWORTH, D.L., JAMES, P.W., COPPINS, B.J. 1980: Check-list of British lichenforming, lichenicolous and allied fungi. - *Lichenologist* 12: 1-115.
- HELLBOW, P.J. 1896: Lichenaea Neo-Zeelandica seu Lichenes Novae Zealandiae a Sv. Berggren annis 1874-75 collecti. Additis ceteris speciebus indidem huc usque cognitis, breviter commemoratis. - *Bihang til Svenska Vet.-Akad. Handlingar* 21, Afd. III, No. 13.
- HERTEL, H. 1977: Gesteinsbewohnende Arten der Sammelgat-tung *Lecidea* (Lichenes) aus Zentral-, Ost- und Süd-asien. Eine erste Übersicht. - *Khumbu Himal*, 6(3): 145-378.
- 1981a: Die Flechte *Scutellaria albococcinea* in Südbayern. - *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 52: 225-226.
- 1981b: Beiträge zur Kenntnis der Flechtenfamilie *Lecideaceae* VIII. - *Herzogia* 5: 449-463.

- HERTEL, H. 1984: Über saxicole, lecideoide Flechten der Subantarktis. - Beih. Nova Hedwigia 79: 399-499 (Festschrift J. Poelt).
- INOUE, M. 1983: Japanese species of *Ruwilia* (Lichenes) (1). - Journ. Japan. Botany 58: 113-128.
- KLEMENT, O. 1965: Zur Kenntnis der Flechtenvegetation der Kanarischen Inseln. - Nova Hedwigia 9: 503-582.
- LETTAU, G. 1954: Flechten aus Mitteleuropa IX. - Feddes Repert. spec. nov. regni veget. 3(2): 172-278.
- MAGNUSSON, A.H. 1952: Lichens from Tornes Lappmark. - Arkiv för Botanik 2(2): 45-248.
- MAURER, W., POELT, J. & J. RIEDL 1983: Die Flora des Schöckl-Gebietes bei Graz (Steiermark, Österreich). - Mitt. Abt. Bot. Landesmus. Joanneum Graz 11/12: 1-104.
- MIGULA, W. 1931: Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch-Österreich und der Schweiz. Band IV: Flechten, 2. Teil: Gymnocarpeae (Schluß), Pyrenocarpeae (kernfrüchtige). - Berlin-Lichterfelde.
- MÜLLER-ARGAU, J. 1891: Lichenes Brisbanensis, a cl. F.M. Bailey, Government Botanist, prope Brisbane (Queensland) in Australia orientali lecti. - Nuovo Giorn. Bot. Ital. 23: 385-404.
- 1893: Lichenes Wilsoniani s. Lichenes a cl. Rev. F.-R.-M. Wilson in Australiae prov. Victoria lecti. - Bull. Herb. Boissier 1: 33-65.
- 1894: Conspectus systematicus lichenum Novae Zelandiae. - Bull. Herb. Boissier 2 (Appendix No. 1) p. 1-113.
- NYLANDER, W. 1888: Lichenes Novae Zelandiae. - 156 pp. - Parisii (Paul Schmidt).
- & M.I. NEWTON 1888: Lichened du nord du Portugal. - Bol. Soc. Brot. 6: 198-249 (sep. (1)-(53)).
- OTTO, G.P. 1968: Lichens of British Columbia I. Species Not Previously Recorded from the Province. - Bryologist, 71: 368-368.
- & T. ANTI 1967: Lichens of British Columbia. Preliminary Checklist. - Vancouver, Helsinki.
- OSENDA, P. & G. CLAUZADE 1970: Les Lichens, étude biologique et flore illustrée.-Paris.
- PLITT, Ch.C. 1909: Lichens of Baltimore and Vicinity. - Bryologist 12: 33-34.
- SAMPAIO, G. & L. CRESPI 1927: Liqueñes de la provincia de Pontevedra. - Bol. Real Soc. Espanola Hist. Nat. 136-151.

- SANTESSON, R. 1984: The lichens of Sweden and Norway. - Stockholm and Uppsala.
- SERVIT, M. 1931: Bearbeitung der von K.H. Rechinger (fil.) im Jahre 1927 auf den Ägäischen Inseln gesammelten Flechten. - Ann. naturhist. Mus. Wien, 46: 77-90.
- SEZATALA, O. 1943: Lichenes. p. 16-58 in K.H. Rechinger, Flora Aegaea. - Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 105.
- TAVARES, C.N. 1952: Contributions to the lichen flora of Macaronesia. I. Lichens from Madeira. - Portugal. Acta Biol. (B), 3(3): 308-391.
- THOMSON, J.W. 1969: A Catalogue of Lichens of the State of Washington. - Madison, Wisconsin.
- TUCKERMAN, E. 1847: A synopsis of the Lichens of the northern United States and British America. - Proc. Amer. Acad. Arts and Sci. 1: 195-285.
- VAINIO, E.A. 1934: Lichenographia Fennica IV, Lacideales II. - Acta Soc. Fauna Flora Fennica 57(2).
- WEBER, W.A. & C.M. WETMORE 1972: Catalogue of the lichens of Australia exclusive of Tasmania. - Beih. Nova Hedwigia 41.
- WIRTH, V. 1980: Flechtenflora. Ökologische Kennzeichnung und Bestimmung der Flechten Südwürttembergs und angrenzender Gebiete. - Stuttgart.
- WULFEN, F.X.v. 1788: Plantae rariores Carinthiaceae. - In: N.J. JACQUIN: Collectanea ad Botanicam, Chemiam et historiam naturalem spectantia. vol. II.-Vindobonae.

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: 20

Autor(en)/Author(s): Hertel Hannes, Knoph
Johannes-Günther

Artikel/Article: PORPIDIA ALBOCAERULESCENS
NE WEIT VERBREITETE, DOCH IN EUROPA
SELTENE UND VIELFACH VERKANNTE
KRUSTENFLECHTE 467-488