

Usnea smaragdina Mot. (161, FREY 465)

Schlierseer Berge, Weg vom Krotental zur Rotwand, 11. 1950.

Usnea soreidiifera (Auct.) Mot. (286, FREY 474)

Berchtesgadener Alpen, Ettlerlehen oberhalb Ramsau, 1000 - 1100 m, 12. 1947.

Usnea substerilis Mot. (291, FREY 475)

Ammergauer Alpen, Notkarspitze, 10. 1950.

NOTIZ ZUR GATTUNG CARISSA (APOCYNACEAE)

von

H. MERXMÜLLER

Carissa bispinosa (L.) Merxm., comb. nov.

(Syn.: *Arduina bispinosa* L. Mant. Pl. 52. 1767 - *Carissa bispinosa* Desf. Tabl. Ecol. Bot. 78. 1804, nom. nud. - *Arduinina bispinosa* "Willd. sp." ex Desf. Tabl. Ecol. Bot. ed.2. 93. 1815 - *Carissa arduina* Lam. Enc. Méth. Bot. 1:555. 1783, nom. abortivum - *Jasminonereum bispinosum* (L.) O. K. Rev. Gen. Pl. 2:415, 1891 - *Carissa bispinata* Lewin, Virchow's Arch. Path. Anat. u. Physiol. 134, 246. 1893, nomen nudum)

Carissa edulis Vahl, Symb. Bot. 1:22 (1790)

var. tomentosa (A. Rich.) Stapf in Thiselton-Dyer,
Fl. Trop. Afr. 4 (1):9 (1902)

(Syn.: *Azima pubescens* Suesseng. Mitt. Bot. Staats-samml. (8):334. 1953)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München](#)

Jahr/Year: 1958

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Merxmüller Hermann

Artikel/Article: [NOTIZ ZUR GATTUNG CARISSA \(APOCYNACEAE\) 399](#)