jenigen entwicklungshemmenden Faktoren, die bei manchen Ulmenformen die Asymmetrie der Spreiten fast völlig verschwinden lassen können: die oben erwähnte schmalblättrige bunte Ulme läßt an ihren blassen Blättern kaum noch Asymmetrie erkennen, während an den grünen Blättern derselben Form die Asymmetrie sehr sinnfällig wird.¹⁾

Wenn auch *Nordhausen* den Einfluß äußerer Faktoren auf die Ausbildung der Asymmetrie dartun konnte, so scheint doch auch nach seinen Untersuchungen der determinierende Faktor in inneren Bedingungen zu liegen (Exotrophie). Aus den Beziehungen, die sich zwischen Farbenverteilung und morphologischem Bau, insbesondere der Asymmetrie der Blättern feststellen ließen, darf daher zunächst nur geschlossen werden, daß dieselben uns noch unbekannteren inneren Bedingungen, die auf dem Wege der Selbstdifferenzierung asymmetrische Spreiten entstehen lassen, unmittelbar oder mittelbar auch auf die inäqualen Teilungen — ihre Häufigkeit, den Zeitpunkt ihres Auftretens oder anderes — entscheidenden Einfluß haben.

Nachdem uns die Beziehungen der Panaschierung zur Asymmetrie der Spreiten deutlich geworden sind, darf ich nochmals auf die früher erwähnte Grün-Weißrand-Ulme zurückkommen. An den von mir beschriebenen Zweigen war stets das grüne Feld auf der geförderten Spreitenhälfte größer (zuweilen bis zum 10fachen, in andern Fällen nur um geringe Werte) als auf der andern Hälfte. Wie gesagt, war die Zahl der beobachteten Zweige und Blätter klein; nachdem aber an Ulmenformen anderer Art die Beziehungen der Farbenverteilung zur Asymmetrie als gesetzmäßig sich erkennen ließen, läßt sich vermuten, daß auch bei der Grün-Weißrand-Ulme die gleiche Gesetzmäßigkeit im Spiele ist.

Populus canadensis Moench und P. monilifera Aiton.

Von **Karl Gustav Hartwig**, Bremen.

(Mit Tafel 3 und 4.)

Aus Anlaß meiner Ausführungen über *P. canadensis* und *monilifera* im Jahrbuch 1922, S. 170 u. f. sandte unser verehrter Präsident mir einige Druckbogen aus *Sargents* »Journal of the Arnold Arboretum«, April 1923, Number II, S. 111 ff., in denen *A. Rehder* sich ebenfalls mit diesen beiden Pappeln beschäftigt. Ich lasse hier die Übersetzung folgen und behalte *Rehders* Schreibweise auch in der Übersetzung bei.

* * *

Populus canadensis Moench, Verz. Bäume & Sträuch, Weißenstein, 81 (1785). — *Ascherson*, Fl. Prov. Brandenb. I, 646 (1864). — *Koehne*, Deutsch. Dendr. 81 (1893). — *Mathieu*, Fl. Forest. 495 (1897). — *Ascherson & Graebner*, Syn. Mitteleur. Fl. IV 34 (1908).

? *P. helvetica* Poederlé, Man. de l'Arb. II, 148 (1792), *P. latifolia* Moench, Méth. 338 (1794).

P. nigra b) *helvetica* Poiret, Encycl. Méth. v. 234 (1804).

P. deltoides Schneider, III. Handb. Laubholz. I, 7, fig. 1 d—f, 3 o—p, 9 g—m (1904), non Marshall.

P. pseudocanadensis Schneider, l. c. 8 (1904).

¹⁾ Von den verschiedenartigen Panaschierungen, die sich bei Ulmen finden, war bereits oben die Rede. Mir sind auch bunte Ulmen bekannt, bei den die blassen Blätter ungefähr ebenso groß sind wie die grünen; der Grad der Asymmetrie ist bei ihnen derselbe wie bei den normal grünen.

Moenchs *Populus canadensis* ist augenscheinlich der älteste Name für den Bastard *P. nigra* L. $\times$ *P. balsamifera* L. (*P. deltoidea* Marsh.). Obgleich die Originalbeschreibung sehr mager ist, das Hauptmerkmal, das Fehlen der Drüsen an der Basis des Blattes, das *Moench* zur Unterscheidung der *P. canadensis* von *P. caroliniensis* (*P. balsamifera* L.) angibt, ist genau das Merkmal, durch das die Blätter dieses Bastardes sich von denen der *P. balsamifera* unterscheiden.¹⁾ Eine Anzahl Varietäten, die sich mehr oder minder in nebensächlichen Merkmalen unterscheiden, sind in Kultur entstanden.

1. ***P. canadensis* var. *serotina* comb. nov. Rehder.**

P. serotina Hartig, Naturgesch. Forstl. Kulturpfl. 437 (1851). — *Henry* in *Elwes & Henry*, Trees Great Brit. Irel. VII, 1816, t. 409, fig. 16 (1913).

P. angulata a) *serotina* Dippel, Handb. Laubholz. II, 202 (1892). — *Koehne*, Deutsch. Dendr. 82 (1893).

Diese Varietät scheint in Frankreich um die Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden zu sein und ist wahrscheinlich der Typus der *P. canadensis*. Sie ist nur in der männlichen Form bekannt. Zu dieser Varietät gehören die beiden folgenden Formen²⁾:

1a) ***P. canadensis* var. *serotina* f. *erecta*, comb. nov. Rehder.**

P. monilifera *erecta*, Selys-Longchamps in Bull. Soc. Bot. Belg. II, 11, 13 (1864).

P. canadensis b. *erecta* Dippel, Handb. Laubholz. II, 200 (1892), excl. syn. of *Carrière*.

P. deltoidea f. *erecta* Schneider, III. Handb. Laubholz. 1, 7 (1904), excl. syn. of *Carrière*.

P. serotina var. *erecta* *Henry* in *Elwes & Henry*, Trees Great Brit. Irel. VII, 1817, t. 385 (1913).

Eine Form mit aufsteigenden Ästen, einen ziemlichen pyramidalen Baum bildend.

1b) ***P. canadensis* var. *serotina* f. *aurea*, comb. nov. Rehder.**

P. canadensis *aurea* van *Geertii* André in III. Hort. XXIII, 26, t. 232 (1876).

P. canadensis d) *aurea* van *Geert* apud *Dippel*, Handb. Laubholz. II, 200 (1892).

P. serotina var. *aurea* *Henry* in *Elwes & Henry*, Trees Great Brit. Irel. VII, 1817 (1913).

Eine Form mit gelben Blättern.

2. ***Populus canadensis* var. *regenerata* comb. nov. Rehder.**

»*Peuplier régénéré*« *Carrière* in Rev. Hort. 1865, 58, 276.

P. canadensis f. *grandifolia* h. bot. apud *Diek*, Nachtr. Haupt. Verz. Zoeschen, 1887, 16, nomen nudum.

¹⁾ In diesem Satze finden sich zwei Ungenauigkeiten, die unwidersprochen eine Quelle noch größerer Verwirrungen werden können. 1. Im Kew Index lautet der Name *Populus deltoidea* Marshall, nicht *P. deltoidea* Marsh., 2. nicht *P. balsamifera* Linné ist das Synonym zu *P. deltoidea* Marsh., sondern *P. balsamifera* Miller. *P. balsamifera* L., die echte Balsampappel gehört einer ganz anderen Gruppe an. —

²⁾ (Rehders Anmerkung:) *Henry* (in *Elwes & Henry*, Trees Great Brit. Irel. VII 1807, footnote) sagt, daß die Identität v. *P. canadensis* Moench zweifelhaft sei und daß sie möglicherweise mit *P. angulata* Aiton zusammenfalle. Aber die Tatsache, daß Moench besonders betont, ihre Winterhärte sei gleichzusetzen derjenigen seiner *P. heterophylla*, die er als empfindlich bezeichnet, unterstützt *Henry*'s Vermutung nicht. Ich bin jedoch geneigt, zu glauben, daß Moench's *P. heterophylla*, die sicher nicht die *P. heterophylla* Linné's ist, identisch mit *P. angulata* Aiton ist.

P. canadensis regenerata hort. ex Schelle in Beißner, Schelle & Zabel, Handb. Laubholz Ben. 16 (1903), als synonym.

P. regenerata hort. ex Schneider, III. Handb. Laubholz. I, 7 (1904), als synonym. von *P. deltoidea*. — *Henry in Elwes & Henry, Trees Great Brit. Irel. VII, 1824* (1913).

Diese Varietät entstand nach *Carrière* im Jahre 1814 in der Umgegend von Paris. Sie ist der vorhergehenden Varietät *serotina* sehr ähnlich, entfaltet jedoch ihre Blätter etwa 14 Tage eher und ist nur in der weiblichen Form bekannt.

3. *P. canadensis* var. *marylandica*, comb. nov. Rehder.

P. marylandica Bosc apud Poiret, Encycl. Méth. Suppl. IV, 378 (1816). — *Henry in Elwes & Henry, Trees Great Brit. Irel. VII, 1828, t. 409, f. 19* (1913).

P. canadensis Hartig, Natugesch. Forstl. Kulturpfl. 436 (1851).

P. euxylon Dode in Mém. Soc. Hist. Nat. Autun, XVIII, 41, 69 (Extr. Mon. Populus), (1905).

Diese Varietät, deren Entstehungsgeschichte unbekannt ist, hat wahrscheinlich die gleiche Entstehung wie die Var. *serotina*. Sie ist ein wenig wüchsiger Baum von mehr ausgebreitetem Habitus und ähnelt mehr der *P. nigra* als ihrer amerikanischen Abstammung (*P. deltoidea*), wohingegen var. *serotina* und var. *regenerata* der letzteren näher stehen.

4. *P. canadensis* var. *Eugenei* hort. Simon-Louis frères apud Schelle in Schelle, Beißner u. Zabel, Handb. d. Laubholz.-Benennung, S. 16, 1903.

»Peuplier Eugène« *Carrière* in Rev. Hort. 1885, 58. — *P. Eugenei* *Simon-Louis* ex *K. Koch*, Dendr. II, 1, 493 (1872), pro forma *P. canadensis*. — *Mathieu* in Gartenfl. XLVI, 675 (1887), sine descript. — *Schneider*, III. Handb. I, 9 (1904). — *Sargent in Trees & Shrubs*, II, 212 (1913). — *Henry in Elwes & Henry, Trees Great Brit. & Irel. VII, 1826, f. 409, f. 17* (1913).

P. pyramidalis meetensis *Mathieu* in Gartenfl. XXXVI, 674 (1887), pro synonym. *P. Eugenei*.

? *P. charkoviensis* *Schroeder* in *Moellers Deutsche Gärtn.-Zeit.* XVIII, 393, fig. (1902).

P. canadensis × *nigra* *P. Eugenei* *Ascherson et Graebner*, Syn. Mitteleurop. Fl. IV, 45 (1908).

Es wird behauptet, diese Varietät sei eine Kreuzung zwischen *P. canadensis* und *P. nigra* var. *italica* und sei entstanden in den Baumschulen von *Simon-Louis* zu Plantières bei Metz im Jahre 1832. Sie nähert sich der Lombardischen Pappel (*P. nigra italica* = Pyramidenpappel, Anm. des Übersetzers) in ihren kleineren Blättern und deren mehr keilförmigem Blattgrunde und ihrem nahezu pyramidalen Habitus. Sie ist die »Carolina-Pappel« der amerikanischen Gärten.

Zu dieser Gruppe von Bastarden, *P. balsamifera* (lies *P. deltoides* Marsh.! Anm. d. Übersetzers) × *P. nigra*, scheint auch *P. Lloydii* *Henry* und *P. Henryana*, *P. Krauseana* und *P. ramulosa* *Dode* zu gehören. Nähere Aufschlüsse über die verschiedenen Formen finden sich in *Elwes et Henry, Trees Great Brit. and Irel. VII, 1814—1831*.

* * *

Soweit *A. Rehder*. Was zunächst, trotz aller Abstempelung der aufgezählten Varietäten und Formen zu Bastarden, in die Augen springt, ist die Tatsache, daß neben *P. monilifera* *Aiton*, der kanadischen oder Rosenkranzpappel, eine zweite kanadische Pappel, *P. deltoides* *Marsh.* von *Rehder* angenommen wird. Sonst könnte die *P. canadensis* *Moench* nicht als Bastard einer solchen bezeichnet werden. (*P. canadensis* *Moench* = *P. nigra* *L.* × *P. deltoides* *Marsh.*)

Charakteristischer Kronenbau der *Populus monilifera* Aiton.
(Bremen, am schwarzen Meer.)

Charakteristischer Kronenbau der *Populus canadensis* Moench.
(Bremen, Bahnhofplatz.)

(Text: Seite 191.)

Populus canadensis
(mit schwach keilförmiger Basis).

Populus monilifera
(mit gerade abgeschnittener Basis).

Einjähriger Trieb von *Populus monilifera*.

Einjähriger Trieb von *Populus canadensis*.

(Text: Seite 191.)

Daß eine ganze Anzahl von Bastarden *deltoides* $\times$ *nigra*? *deltoides* $\times$ *monilifera*? *monilifera* $\times$ *nigra*? in Deutschland sich findet, ist mir, seit ich meine Zeilen über *P. canadensis* veröffentlichte (Mitt. d. DDG. 1922, S. 170), besonders auf die Mitteilungen von *Lauche-Muskau* hin, klar geworden. Ob hierunter aber meine *P. canadensis* fällt, ist mir noch heute zweifelhaft.

Man vergleiche nun *Rehders* leider etwas dürftige Ausführungen mit den meinigen (1922, S. 170) und den Angaben von *Breton-Bonnard* (1921, S. 55). *Rehder* zieht nicht nur die *P. canadensis* Moench zu dem Bastard *P. deltoides* $\times$ *nigra*, sondern auch die *P. monilifera* der deutschen Dendrologen. Er stellt oben die gelbblättrige Pappel zu *P. canadensis* var. *serotina* als *forma aurea*. Nun ist diese gelbblättrige Form eine typische *P. monilifera* im Sinne *Koehnes*, *Schneiders*, *Breton-Bonnards* und nach meiner Auffassung. Laubform, später Austrieb, rote Blattstiele (in Späths Katalog, dem »Späth-Buch«, S. 193, wird die gleiche Ansicht ausgesprochen), also dürfte seine *P. canadensis* var. *erecta* nichts anderes sein als *P. monilifera* der oben genannten Dendrologen. Auch *Rehders* wenige Angaben: nur männlich bekannt, Äste aufstrebend, passen genau auf unsere *P. monilifera*. Die *P. canadensis* Moench und der oben genannten Dendrologen deckt sich mit seiner *P. canadensis* var. *regenerata*: entfaltet ihre Blätter etwa 14 Tage eher, Blüten nur weibliche bekannt.

Da nun sowohl *Breton-Bonnards* wie meine *P. canadensis* und *P. monilifera* durchaus auf *Koehnes* und *Schneiders* Diagnosen passen, so ergibt sich folgende Gruppierung:

P. canadensis var. *serotina* A. Rehder = *P. monilifera* Schneider, Laubholzkunde 1906, I, S. 7, *Koehne*, Dendrologie 1893, S. 82, *Breton-Bonnard*, Mitt. DDG. 1921, S. 55, *Hartwig*, Mitt. DDG. 1922, S. 170.

P. canadensis var. *regenerata* A. Rehder = *P. canadensis* Koehne, Dendrologie 1893, S. 81, *Breton-Bonnard* 1921, S. 55, *Hartwig* 1922, S. 170 und = *P. deltoides* Schneider (nicht Marshall!). Laubholzkunde 1906, I, S. 7.

Demnach müßten *Schneiders* und *Koehnes* *P. monilifera* nicht identisch sein mit *P. monilifera* Aiton, *Koehnes* *P. canadensis* und *Schneiders* *P. deltoides* ebenso nicht mit *P. deltoides* Marshall (oder wie *Rehder* schreibt *P. deltoidea* Marsh.). *Rehder* bestreitet nirgends deren beider Vorhandensein. So wäre denn alles, was hier in Deutschland als kanadische Pappeln bekannt und beschrieben, als *P. deltoides* $\times$ *nigra* Bastard anzusprechen!

Ich muß aber auf Grund der Spannblätter von *P. monilifera* Aiton, die hier im Bremer Herbar liegen und Originale aus Kansas (»distributed by the Botanical Departement of the State Agriculture College, Coll. J. B. Norton 1895«) sind, annehmen, daß in *Rehders* Auffassung irgend etwas nicht stimmt. Wenn *Rehder* Recht hat, was ist dann die *P. monilifera* Aiton und die *P. deltoides* Marshalls? Wie gesagt: beider Existenz ist von *Rehder* nirgends bestritten.

In *Ascherson* und *Graebner*, Synopsis der mitteleuropäischen Flora 1908/13, Band N, S. 34 wird unter *P. canadensis* Moench neben *P. deltoides* Marsh. auch *P. monilifera* Nouv.-Duhamel, nicht Aiton!, laut Dode, als Synonym aufgeführt. S. 35 steht *P. monilifera* Ait. als Synonym zu *P. virginiana* Fougereux. Die Beschreibung der letzteren deckt sich auf das genaueste mit dem, was *Koehne*, *Schneider*, *Breton-Bonnard* und ich unter *P. monilifera* Aiton verstehen.

Britton und *Brown* hingegen (An illustrated Flora of the Northern United States, Canada and the British Possessions, 1896, I, 493), führen nur *Populus deltoides* Marsh. mit den Synonym: *P. monilifera* Aiton, *P. carolinensis* Moench, *P. angulata* Aiton.

Schlimmer kann das Durcheinander eigentlich kaum noch werden. Und weil wir Formen und Bastarde nicht eher werden sichten können, ehe wir nicht ganz klar und scharf umrissen sehen, was eigentlich *P. deltoides* Marsh., *P. monilifera*

Aiton und *P. angulata* Aiton ist, so bleibe ich einstweilen bei meiner Auffassung, daß *P. canadensis* Moench, wie *Koehne*, *Schneider* usw. sie verstehen, keine *P. nigra* $\times$ *deltoides* Hybride ist. Gleichzeitig bringe ich die Lichtbilder der beiden Pappeln, die den scharf unterschiedenen Wuchs deutlich zeigen. Man mache sich die kleine Mühe, die betreffenden Aufsätze in den Mitteilungen 1921, S. 55 und 1922, S. 170, nachzulesen.

Wenn *Breton-Bonnard* das Holz seiner (und meiner) *P. canadensis* als »ausgezeichnet, widerstandsfähig und gesund« bezeichnet, so ist diese Feststellung ein Grund mehr für mich, für diesen Baum nicht an eine Beimischung von *Populus nigra*, deren Holz alles andere als gesund ist, zu glauben. Keine Pappel wird derart von allen Holzschädlingen heimgesucht wie *P. nigra*. Und darauf kommt es an: Holz von kanadischen Pappeln, die kein *P. nigra*- (Schwarzpappel)-Blut führen; dahin zielen meine ganzen Untersuchungen.

Mir hat in diesem Jahr die Zeit gefehlt, mich nachhaltig mit den fraglichen Pappeln zu beschäftigen. Außer Herrn Direktor *Lauche*-Muskau, hat leider kein einziges Mitglied Beobachtungen angestellt, geschweige denn mir Herbar-Material gesandt, um das ich 1922 bat. Ich werde aber diesen Stoff noch lange nicht fahren lassen und bitte, unter Hinweis auf den Schluß (1922, S. 172) meiner Zeilen nochmals um Material von »kanadischen« Pappeln.

Nachschrift: Seit etwa 2 Jahren ist mir aufgefallen, daß die *P. canadensis* (meiner Auffassung) die jüngsten 2—3 Blätter eines jeden Langtriebes abweichend bildet. Diese Blätter haben nicht den breit-keilförmigen, sondern einen wagerecht abgestutzten Blattgrund. Besonders deutlich tritt diese Tatsache bei weit vorgeschrittenem Laubfall zu Tage. Ich will mit meinem Urteil, ob hier eine Kreuzung vorliegt, zurückhalten, bis ich das mir freundlichst von Herrn *A. Rehder* versprochene Herbarmaterial von *P. deltoides* Marsh. und *P. monilifera* Aiton erhalten habe.

Berberis stenophylla Lindl., Art oder Bastard?

Von Hermann Martin, Zürich.

Nach Gardeners Chronicle 1864, 460 soll *Berberis stenophylla* Ldl. ein in englischen Gärten entstandener Bastard von *Berb. empetrifolia* $\times$ *Darwinii* sein. Der Züchter selbst ist anscheinend nicht bekannt. Es wird dort nur erwähnt, daß dieser prächtige Strauch zuerst in den Baumschulen von *Fisher and Holmes* kultiviert wurde.

Diese Abstammung hat zuweilen unter Botanikern und Dendrologen Zweifel aufkommen lassen. So hat *Usteri* sogar versucht, *Berb. stenophylla* als selbständige Art aufzustellen (*Usteri*, Monographie der Berberitzen). Eine gewisse Ähnlichkeit der Laubblätter von *Berb. stenophylla* mit denen der angeblichen Eltern gibt er zu, sowie auch eine Übereinstimmung der Blüten, mit Ausnahme der Kelchblätter. Die Dornen und der Blütenstand sind bei allen drei Pflanzen verschieden. Hauptsächlich letzteres bestimmt *Usteri* zu seinem endgültigen Entscheid, daß *Berb. stenophylla* kein Bastard der beiden genannten Arten sein kann, sondern daß sie als selbständige Art zu betrachten sei. Ferner hebt *Usteri* noch die große Fruchtbarkeit von *Berb. stenophylla* hervor. Übrigens eine Eigenschaft, die mir noch nie besonders aufgefallen ist, ich komme darauf später noch zurück. Diese große Fruchtbarkeit gibt *Usteri* noch mit als indirekten Beweis für die Richtigkeit seiner Behauptung, daß *Berb. stenophylla* als selbständige Art aufzufassen sei. Er stützt sich hier, und das wohl etwas allzu fest, auf die *Fockeschen* Regeln (*Focke*, Pflanzenmischlinge), nach denen ein Bastard zwischen zwei so grundverschiedenen Arten wie

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Hartwig Karl Gustav

Artikel/Article: [Populus canadensis Moench. und Populus monilifera Aiton. 188-192](#)