

TRAUTNER, J. (1986): Die Laufkäfer im Landkreis Böblingen (Coleoptera, Carabidae). Jh.Ges.Naturkde.Württ. 141 (im Druck).

WASNER, U. (1974): Die Carabidae des Federseerieds. - Beih. Veröff.Naturschutz Lndtschaftspflege Bad.-Württ. 4: 136-161; Karlsruhe.

Jürgen Trautner
Kimbernstraße 53
7036 Schönaich

HOLZKÄFERFUNDE AUS DEM STROMBERG

Von Johannes Reibnitz, Stuttgart

Das öfter von mir besammelte Gebiet liegt am südlichen Rande des Naturparkes Stromberg-Heuchelberg, exakt zwischen Illingen und Schützingen. "Fier Leit, dia sich net so guat em Ländle auskenna" sei gesagt, daß der Stromberg eine durch lange Täler stark zerschnittene Hügellandschaft nordwestlich Stuttgarts ist. Die steileren Südhänge sind vielfach mit Wein bepflanzt. Nordabfälle und Höhenrücken werden von Wald bedeckt.

Mein Untersuchungsgebiet beherrscht älterer Eichen-Hainbuchenforst. Hier wird fleißig Holz gefällt. Auf einem südexponierten Hang blieben nach einem Kahlschlag ausnahmsweise alle Kronenäste liegen. Also ein idealer Platz, um u.a. akrodendrische Holzkäfer zu klopfen. Auch lagernde Stämme, abgestorbene oder anbrüchige Bäume, sowie morsches Holz wurde von mir untersucht. Nachfolgend die nach Lebensräumen aufgliederte Fundliste, welche einige recht seltene Arten aufweist.

Kronenäste (hauptsächlich Eiche)

Dromius notatus Steph. 21.6./12.8.79, einzeln

Tilloidea unifasciata F. 3.6.78, 3 Ex.

Laemophloeus kraussi Gglb. 14.5.79, mehre Ex.; weitere 8 Stück unter Hainbuchenrinde.

Synchita humeralis F. 21.6.79, 5 Ex.

- Xylopertha retusa* Oliv. 8./21.5.77, 17.6.78 in Anzahl
- Vincenzellus ruficollis* F. 14.5./21.6.79, 8 Ex.
- Phymatodes pusillus* F. 29.4./14.5.79, 25.4.83, insgesamt
4 Ex. Nicht durch Klopfen erhalten! Aus dünnen Eichen-
ästen gebrochen.
- Phymatodes alni* L. 8.6./21.6.77, 3.6.78 in Menge
- Xylotrechus antilope* Schönh. 16.7.78 mehrere Ex.
- Exocentrus adpersus* Muls. 21.6.77, 3.6./17.6.78 sehr
zahlreich.
- Pogonocherus hispidulus* Pill. 21.6.77, 2 Ex.
- Phaenochrotes cinctus* Payk. 21.6.79, ein Pärchen. In der
Württemberg-Fauna bei A.v.d.Trappen nicht aufgeführt.
Dürfte neu für Württemberg sein.
- Dissoleucas niveirostris* F. 12.8.79, 1 Ex.; 5.6.80 2 Ex.
an Buchenastbündeln.
- Opanthribus tessellatus* Boh. 3.6.78, 21.6.79, 5.6.80, je
ein Ex. In Freude/Harde/Lohse (Band 10) wird noch ein
sicherer Nachweis für Deutschland gesucht! Von Chr.
Rieger bekam ich ein Tier von Nürtingen/Neckar, 12.5.85.

Die vorangegangenen Arten wurden fast ausschließlich von
Eichenzweigen geklopft, nur wenige Stücke wie auch

- Acanthoderes clavipes* Schrk. 16.7.78 von Hainbuche, 2 Ex.

Lagernde Eichenstämme

- Lyctus linearis* Goeze 8.6.77, 3.7.78, je ein Ex. auf der
Schnittfläche.
- Bostrychus capucinus* L. 8.6.77, 3.6.78, in Anzahl.
- Strangalia revestita* L. 3.6.78, 1 Ex.
- Plagionotus arcuatus* L. 8.6.77, 3.6.78, 4.6.79, in größe-
rer Anzahl. Vereinzelt auch auf Hainbuchenklaffern.
- Lucanus cervus* L. 3.6.78, Kopf eines großen Männchens;
am 5.6.80 ein kleineres Männchen auf dem Weg.

Rinde

- Diplocoelus fagi* Guër. 15.4.82, 1 Ex. von trockener Bu-
che. Horion kannte aus Baden-Württemberg nur einen
fragwürdigen Fund. Bei uns selten.
- Isorhipis melasoides* Cost. 15.4.82, viele tote Ex. in
ihren Bohrlöchern unter trockener Buchenrinde. Bei
Kürnbach unter gleichen Umständen gefunden, 18.2.84.
Aber noch kein lebendes Stück. Vielleicht doch nicht
so selten?

Platydema violaceum Fabr. 26.3.80, 1.2.86, jeweils 2 Ex.
unter loser Rinde von anbrüchigen Eichen. Von Baden-
Württemberg sind nur wenige Funde bekannt.

Faulholz

Ampedus quercicola Buyss. 25.4.83, 3 Ex.; 4.2.84, 4 Ex.
In weißmorschen Ästen und Stämmen, die am Boden liegen.
2.1.86, 1 Ex. aus einem Erlenstumpf.

Ischnodes sanguinicollis Panz. 25.4.83, 8 Ex. im weiß-
faulen Holz einer alten, hohlen Buche. Sehr selten.

Hypoganus cinctus Payk. 28.5.82, 1 Ex.

Pentaphyllus testaceus Hellw. 25.4.83, 1 Ex.

Aesalus scarabaeoides Panz. 25.4.83, 3 Ex. zus. mit der
vorigen Art im rotfaulen Holz einer fußhohlen Eiche.
Sehr selten.

Liocola lugubris Hbst. Im Frühjahr 1978 mehrere Larven
im Mulm eines gefälltten Obstbaumes.

Potosia aeruginosa Drury 20.4.78, Körperreste und leere
Kokons in einer hohlen Eiche.

Fichtenklafter

Callidium violaceum L. 8.6.77, 1 Ex.

Baumpilze

Tetratoma fungorum Fabr. 4.2.84, 1 Ex. Nicht bei v.d.Trap-
pen genannt, aber bei uns wohl überall vorhanden.

Blüten

Anthaxia salicis F. 16.7.78, 3 Ex.

Leptura sexguttata F. 4.5./21.6.79, ein paar Stück.

Chlorophorus figuratus Scop. 16.7.78, 3 Ex.

Fundumstände ???

Melasis buprestoides L. 15.4.82, 1 Ex.

Acalles hypocritus Boh. 15.4.82, 1 Ex. In der Württem-
berg-Fauna nicht gemeldet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [21_1986](#)

Autor(en)/Author(s): Reibnitz Johannes

Artikel/Article: [Holzkäferfunde aus dem Stromberg. 18-20](#)