Dorcatoma-Funde (Col., Anobiidae) aus Baden-Württemberg

Die Arten der Gattung *Dorcatoma* leben in Baumschwämmen oder in morschem, von Pilzen durchwachsenem Holz.

Die meisten Arten gelten, zumindest im südwestdeutschen Raum, als selten. Hat man aber erst einmal Brutpilze entdeckt, so können die Käfer meist in größerer Zahl gezüchtet werden.

Dorcatoma setosella Muls.Rey

Breisach, Rheinwald, 21.3.1987. 8 Ex. schlüpften aus einem harten, zimtbraunen Erlenschwamm.

Dorcatoma chrysomelina (Strm.)

Stuttgart, Solitude, 16.3.1986. In großer Zahl aus verpilztem Eichenholz gezüchtet.

Dorcatoma serra Panz.

Geisingen bei Donaueschingen, 28.7.1986. Zucht aus hartem Laubholzschwamm zusammen mit *D. dresdensis*.

Taubertal, Bronnbach, 9.8.1986. 30 Ex. aus einem toten Obstbaumschwamm gezogen zusammen mit *D. dresdensis*.

In der Faunistik von HORION (1961) lagen noch keine Funde für Baden-Württemberg vor.

Dorcatoma punctulata Muls.

Schwäbische Alb, Albstadt-Laufen, 19.4.1987. In Anzahl aus einem großen Schwamm gezüchtet, der an einer alten, abgestorbenen Fichte in ca. 3 m Höhe wuchs.

Die Art lebt sporadisch und selten in Gebirgsgegenden. Wahrscheinlich n e u für Baden-Württemberg.

Dorcatoma dresdensis Hbst.

Geisingen bei Donaueschingen, 28.7.1986. 3 Ex. von hartem Baumschwamm abgelesen. Weitere Tiere durch Zucht erhalten. Bronnbach, siehe bei *D. serra*.

Breisach, Rheinwald, 21.3.1987. Ebenfalls in größerer Zahl aus einem Schwamm gezüchtet.

Oberschwaben, Bad Schussenried, Bannwald bei Aichbühl, 23.5.1987. In Schwämmen an abgestorbenen Birken nicht selten (Zucht).

Johannes Reibnitz
Ohmstraße 10
7000 Stuttgart 40

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [22 1987](#)

Autor(en)/Author(s): Reibnitz Johannes

Artikel/Article: [Dorcatoma-Funde \(Col., Anobiidae\) aus Baden-Württemberg. 99](#)