

Lepidopterologischer Jahresbericht 1985/1986/1987

Von Dietrich Hein, Schönaich

Wie einige von Ihnen festgestellt haben, fehlten in den letzten zwei Jahren die Jahresberichte. Dies lag nicht an der Faulheit des Bearbeiters sondern am Eingang der Meldungen. Sie waren so dürftig, daß sich eine Auswertung nicht anbot. Die geringen Meldungen mögen verschiedene Gründe haben. Einer der gravierendsten dürfte die Artenschutzverordnung sein. Der größte Teil der Mitglieder traute sich aus Angst vor dieser Artenschutzverordnung nicht mehr etwas zu melden. Jeder hat Angst, es könnten durch die Meldung irgendwelche Repressalien auf ihn zukommen.

Der Ausweg, mit einer Ausnahmegenehmigung aus dieser Situation herauszukommen, wird von den meisten gescheut, weil die Regierungspräsidien mit vielen Auflagen und einer fast einjährigen Bearbeitungszeit die Hobbyentomologen vor den Kopf stoßen. Hier wird übersehen, daß die Hobbyentomologen die meisten Daten zu unserem heutigen Kenntnisstand beigetragen haben. Die anschließende Ausarbeitung wird wohl die letzte sein, sollte sich die Situation nicht grundlegend ändern.

Die Meldungen folgender Mitglieder wurden ausgewertet: Otto Ehmann (Ehm), Heinz Fröhlich (Frö), Dietrich Hein (Hei), Albrecht Hermann (Her), A. Kühnl (Küh), Markus Salmen (Sa), Ludwig Schnell (Schn), Reiner Schidlowski (Sch), Walter Uebel (Ue).

D I U R N A

Iphiclides podalirius L.

1986 u. 1987 wieder am Venusberg (Krs.BB) beobachtet.
Mündliche Meldung Herr Schüle.

Papilio machaon gorganus Fruhst.

Von allen Mitgliedern beobachtet. Im Raum Ludwigsburg große Raupenfunde Sept.-Okt.1986 (Sch). Ebenso in Schönaich (Hei).

Pieris brassicae L.

Normale Flugjahre. Allerdings 1985 u. 1986 stark geschädigt durch die naßkalten Frühjahre.

Pieris rapae L. und Pieris napi L.

Siehe vorhergehende Art. Allerdings muß für den Raum Böblingen-Schönaich-Naturpark Schönbuch ein starker Rückgang von *P. napi* L. festgestellt werden (Hei).

Anthocharis cardamines L.

1985 starke Raupenfunde im Leudelsbachtal (Markgröningen). Allerdings 1986 im Verhältnis zu den Raupenfunden wenig Falter geschlüpft.

Gonepteryx rhamni L.

Normale Flugjahre. 1986 am 29.5. noch Eiablagen beobachtet (Hei,Ue).

Colias hyale L.

Normale Flugjahre. 2.6.1985 mehrere Tiere bei Weissach (Krs. BB) (Ehm). In Schönaich im September 1986 auf Kleeefeldern recht zahlreich (Hei).

Leptidea sinapis L.

1986 wurde die Art durch das naßkalte Frühjahr im Raum Böblingen stark geschädigt.

Erebia ligea carthurianorum Fruhst.

Nur eine Beobachtung. 23.7.1985 mehrere frische Exemplare bei Lichtenstein-Holzelfingen (Schw.Alb) (Frö).

Agapetes galathea L.

Nimmt anscheinend in den letzten Jahren an den Flugstellen etwas zu.

Pararge aegeria egerides Stgr.

Im Naturpark Schönbuch 1987 in allen Generationen recht zahlreich festgestellt (Sa,Hei).

Maniola jurtina L.

Eine Art, die fast jedes Jahr in gleicher Anzahl anzutreffen ist.

Coenonympha arcania L.

1986 im Siebenmühlental bei Waldenbuch sowie auf dem Rotenacker (Markgröningen) recht zahlreich (Hei).

Coenonympha pamphilus L.

Von allen Mitgliedern als recht häufig gemeldet.

Apatura iris L.

Im Naturpark Schönbuch, Goldersbachtal 1986 u. 1987 wieder recht zahlreich (Sa,Hei). Am Truppenübungsplatz in Böblingen nimmt die Art anscheinend wieder zu (Hei).

Apatura ilia Schiff.

Ganz vereinzelt bei Schönaich 1986 u. 1987 (Hei).

Limenitis camilla L.

In den letzten Jahren im Naturpark Schönbuch und am Waldfriedhof Böblingen recht zahlreich mit zunehmender Tendenz (Sa,Her,Hei).

Limenitis populi L.

Nur 1 Meldung 13.7.1985, Tiefental bei Blaubeuren (Frö).

Vanessa atalanta L.

Dieser Wanderfalter konnte wieder an vielen Orten beobachtet werden. 1987 im September sehr zahlreich an Fallobst (Küh,Hei).

Vanessa cardui L.

Recht wenige Meldungen, 11.7.1985 1 Raupe, Großes Lautertal (Frö).

Aglais urticae L.

Diese Art hat nach den schlechten Jahren 1986 und 1987 wieder etwas zugenommen.

Inachis io L.

Am 7.9.1986 am Rotenackerwald (Markgröningen) 1 Raupenest (L2 + L3). Ablage einer 2.Generation?

Nymphalis polychloros L.

Die Ausbreitung dieser Art vom Naturpark Schönbuch aus hat sich gefestigt, ist aber in der jetzigen Ausbreitung (Venusberg Krs. BB, südlich Stuttgart-Neckartenzlingen) anscheinend zum Stillstand gekommen.

Araschnia levana L.

1986 in folgenden Gebieten recht viele Raupennester festgestellt: Bernbachtal (Öhringen), Schönaich, Böblingen-Waldfriedhof und Gutswiesenwald, Goldersbachtal (Naturpark Schönbuch) (Hei, Sa, Sch).

Argynnis paphia f. valesina Esp.

Am 21.9.1986 konnte 1 Weibchen am Truppenübungsplatz beobachtet werden. Erste Beobachtung für dieses Gebiet.

Procllossiana eunomia Esp.

1986 ungewöhnlich häufig am Hölzer See bei Magstadt.
1987 wieder normaler Flug (Hei).

Celastrina argiolus L.

Am 29.5.1986 konnte diese Art am Hammelrain (Markgröningen) in ungewöhnlicher Häufigkeit beobachtet werden.
1987 die 2. Generation am Waldfriedhof in Böblingen auch so häufig. Sonst die Jahre immer nur 1-2 Tiere im Jahr beobachtet (Ue, Hei).

Polyommatus icarus Rott.

1986-1987 im Raum Böblingen recht häufig. Besonders die 2. Generation (Her, Hei).

Maculinea nausithous Bergstr.

6.6.1985 Waiblingen-Talaue (Ehm).

Pyrgus malvae L.

Die Form *taras* konnte in den letzten Jahren nicht wieder beobachtet werden.

BOMBYCES UND SPHINGES

Lymantria dispar L.

1986 die Raupen am "Rotenacker" (Markgröningen) recht zahlreich. Der Falter dann allerdings recht selten (Hei, Ehm).

Arctinia caesarea Goeze

20.5.1987 am Rotenacker (Markgröningen) 5 Männchen am Licht. Ungewöhnlich viel (Hei, Sch).

Panaxia quadripunctaria Poda

25.5.1986 Raupe gefunden an Lithospermum purpureo-coeruleum (Hei).

Smerinthus ocellata L.

20.8.1985 1 Raupe an Salise. Grüner Heiner (Stuttgart-Korntal) (Ehm).

Acherontia atropos L.

14.9.1985 1 erw. Raupe an Flieder. Magstadt (bei BB) (Ehm).

Deilephila elpenor L.

Diese Art nimmt im Schönbuch in den letzten Jahren wieder merklich zu.

Proserpinus proserpina

Diese Art nimmt in den letzten 5 Jahren im Großraum Stuttgart-Schönbuch-Naturpark sichtlich zu (Schn,Ehm,Her,Hei).

Eudia pavonia L.

Meldungen liegen vom Venusberg (Krs.BB), Markgröningen, Schönaich vor (Ehm,Her,Hei).

Eriogaster lanestris L.

Meldungen liegen vom Venusberg (Krs.BB), Flacht, Weissach vor. (Hei,Ehm).

Lasiocampa quercus L.

1985 u. 1987 wieder mehrere Raupenfunde am Rotenackerwald bei Markgröningen (Ehm,Hei).

Macrothylatia rubi L.

1987 bei Leonberg und am Venusberg im Oktober recht zahlreich.

NOCTUIDEN

Die Listen der Leuchtabende sind noch nicht ausgewertet. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Dietrich Hein
Böblingerstr. 79
7036 Schönaich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [23 1988](#)

Autor(en)/Author(s): Hein Dietrich

Artikel/Article: [Lepidopterologischer Jahresbericht 1985/1986/1987. 61-65](#)