

Literatur

- GRUSCHWITZ, M. & KOCH (1988): Erstnachweis des Laufkäfers *Harpalus stictus* STEPH. in der Bundesrepublik Deutschland. Ent.Z. 98: 233-238.
- HEILIGMANN, W. (1970): Beitrag zur Insektenfaunistik Südwestdeutschlands; Scarabaeidae I. - Mitt.ent.V.Stuttgart 5, Sonderheft 5.
- HORION, A. (1954): Beitrag zur Käferfauna des badischen Bodenseegebietes, I. - Beitr.naturkundl.Forschung Südwestdeutschlands 13: 51-61.
(1955): Beitrag zur Käferfauna des badischen Bodenseegebietes II. Beiträge z.naturkundl. Forschung Südwestdeutschlands 14: 57-69.
(1957): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland. III. Reihe. - Dtsch.ent. Z. N.F. 4: 431-444.
- KLESS, J. (1983): Die Käferfauna des Mindelseegebietes. In: Der Mindensee bei Radolfzell. Monographie eines Naturschutzgebietes auf dem Bodanrück. - Natur u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 11: 645-659.
- KÖSTLIN, R. (1973): Beitrag zur Insektenfauna Südwestdeutschlands; Gattung Apion. - Mitt.ent.V.Stuttgart 8, Sonderheft 12.
- PERSOHN, M. (1988): Eine neue Laufkäferart für Deutschland: *Harpalus stictus* STEPH. übersehen, verkannt oder neu für Deutschland? -Ent. Bl. 84: 10.
- SCHMID, G. (1965): Bemerkenswerte Käfer und Wanzen aus Baden-Württemberg - Veröff.Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspflege Bad.-Württ. Heft 33: 248-257.

Bernhard Kleß
Werner-Sombart-Str. 1
7750 Konstanz

Kleine Mitteilungen

107. Calathus mollis erythroderus in der Pfalz

Anmerkung zu *Calathus mollis erythroderus* (Col., Carabidae) in Mitt.ent. Ver.Stuttgart, 24: 50-57. Die Art wurde von PERSOHN (1988, in: Pfälzer Heimat, 39 (1): 37) auch für die Südpfalz bei Herxheim gemeldet, worauf mich der Autor jenes Artikels hinzuweisen bat.

Jürgen Trautner (Ludwigsburg)

108. Agrilus guerini Lac. (Col., Buprestidae)

Bisher erst ein Fund für Württemberg, Malzacher leg. 13.6.1966 (Jahrh. vaterlVer.Naturkde.Württ. 1966, 121. 281-283). Am 2.5.1989 schlüpfte bei mir 1 Exemplar aus einem 25 mm starken *Salix*-Stämmchen, eingetragen vom Autobahnrand bei Stuttgart-Rohr. Die "Krone des Zweitentdeckers" gebührt eigentlich den pfälzer Kollegen, die durch gründliche Suche rund 80(!) Fundorte dieser bisher als seltenes Relikt geltenden Art kennen. Dank einer Unterweisung dort durch Dr.M. Niehuis konnte ich das obige Tier mit relativ wenig Aufwand finden. Lit: VOGT, W. (1987): Das Vorkommen von Guérins Salweidenprachtkäfer *Agrilus guerini* in Rheinland-Pfalz. - Pfälzer Heimat 38: 28-32. NIEHUIS, M. (1988): Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz. Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, Beiheft 9.

Hans U. Kostenbader (Stuttgart)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [24 1989](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. 119](#)