

- RIBAUT, H. (1936): Homoptères Auchénorhynques I (Typhlocyidae). Faune de France 31: 1-231; Paris.
- SCHIEMENZ, H. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Homoptera-Auchenorrhyncha (Cicadina), Teil II. - Faun.Abh.Staatl.Mus.Tierk. 16 (5): 37-94; Dresden.
- VIDANO, C. (1965): Sulle Forcipata transalpina e cisalpina con descrizione di specie nuova (Hom. Typhlocyidae). Boll.Zool.agr.e Bachie 11 (6): 38-60.
- WAGNER, W. & FRANZ, H. (1961): Die Nordostalpen im Spiegel ihrer Landschaft: II 34. Rhynchota, Auchenorrhyncha. 2: 74-158; Innsbruck.

Friedrich R. Heller
Holteiweg 46
7000 Stuttgart 80

Kleine Mitteilungen

109. Cyaniris semiargus Rott. (Lep., Lycaenidae)

Im Juli 1989 konnte nach 5 Jahren auf der Gemarkung 7036 Schönaich wieder C. semiargus Rott. beobachtet werden. Ist dies schon außergewöhnlich, so ist es noch außergewöhnlicher, daß diese Art in einer Häufigkeit auftrat, wie ich sie auf dieser Gemarkung in 15jähriger Beobachtungszeit noch nicht beobachtet hatte. Auf "einen Blick" konnten an manchen Tagen 10 bis 15 Stück beobachtet werden.

Dietrich Hein (Schönaich)

110. Celastrina argiolus L. (Lep. Lycaenidae)

Vom 21.7. bis 13.8.1987 wurde auf dem Waldfriedhof in Böblingen ein außergewöhnlich starker Flug von C. argiolus beobachtet. Bei gutem Wetter konnten täglich 20-30 Falter beobachtet werden. Sie "tanzten" immer um die Abgrenzungshecken. Eiablagen konnten nicht beobachtet werden. Die Eiablage- und Raupenfutterpflanze ist hier sehr wahrscheinlich Symphoricarpos orbiculatus, da im weiteren Umkreis kein Faulbaum wächst.

Dietrich Hein (Schönaich)

111. Argynnis paphia L. (Lep. Nymphalidae)

In der Gefangenschaft legen A. paphia-Weibchen auch an folgenden Veilchenarten ab: Viola odorata, Viola silvestris (reichenbachiana) und Viola canina. Herr H.J. Weidemann verneint dies in seinem Buch Tagfalter.

Dietrich Hein (Schönaich)

112. Smerinthus ocellata L. (Lep., Spingidae)

Die Männchen finden ihre Weibchen sogar im Keller eines Hauses. So fand am 24.7.1988 ein Männchen ein frisch geschlüpftes Weibchen in meinem Hauskeller und kopulierte mit diesem. Dazu muß gesagt werden, daß sich die S. ocellata-Population ca. 5 km entfernt befindet.

Dietrich Hein (Schönaich)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [24_1989](#)

Autor(en)/Author(s): Hein Dietrich

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. 125](#)