

Notizen zum Vorkommen einiger Apion-Arten in Baden

Von Joachim Rheinheimer, Ludwigshafen

- Apion sedi** (14) bei Bruchsal am 28.9.1980, im Kaiserstuhl im Mai und Oktober 1980. Ich habe die Art aber auch andernorts im Rheintal nachweisen können. Kaiserstuhl, Mai 1980.
- A. rufirostre** (21) bei Bruchsal an *Genista tinctoria* nicht selten.
- A. formaneki** (33) wie der Vorige.
- A. difficile** (34) Singen/Hegau, 5.7.1980.
- A. corniculatum** (35) zwischen Karlsruhe und Mannheim an *Sarothamnus scoparius* häufig.
- A. fuscirostre** (38) in Buchenwäldern an *Mercurialis perennis* nicht überall, aber dann oft in Anzahl.
- A. pallipes** (40) an *Mercurialis annua* an trocken, sonnenexponierten Stellen lokal.
- A. semivittatum** (41) Singen/Hegau, im September 1981 an *Prunella vulgaris*.
- A. millum** (46) an *Origanum vulgare* in der Umgebung von Karlsruhe.
- A. flavimanum** (47) an *Origanum vulgare* am Westabfall des Kraichgaus bei Karlsruhe überall, aber einzeln, besonders im Herbst.
- A. orlgani** (49) Singen/Hegau, 5.7.1980.
- A. hoffmanni** (53) nördlich von Karlsruhe auf ehemaligen Rheinsönden an verschiedenen Stellen auf Kamillen (Juli - September 1980).
- A. confluens** (54) Kaiserstuhl, Mai 1981.
- A. stolidum** (55) an *Artemisia campestris* im Kaiserstuhl mehrfach im Herbst gefunden (1980/81).
- A. sulcifrons** (57) kommt im Rheintal und am Westrand des Kraichgaus an etlichen Stellen an *Centaurea* vor.
- A. penetrans** (62) trotz intensiver Suche an vielen Stellen nie gefunden!
- A. alliariae** (63) nördlich von Karlsruhe an sandigen, trockenen Stellen auf *Anthemis* (neueste Funde: Mai 1989 und 1990).
- A. laevigatum** (67) wie *laevigatum*, aber verbreiteter.
- A. dispar** (69) an *Onobrychis viciaefolia* bei Bruchsal 1980.
- A. intermedium** (84) um Bruchsal nicht selten an *Lathyrus pratensis*.
- A. afer** (90) bei Bruchsal ziemlich häufig an verschiedenen *Lathyrus*-Arten, besonders an *L. latifolius*.
- A. columbinum** (98) bei Bruchsal recht selten. Ich habe die Art bisher nur an *Vicia sepium* gefunden. In der Literatur werden aber auch andere Futterpflanzen angegeben.
- A. punctigerum** (100) Kaiserstuhl, 22.10.1980; Umg. Bruchsal, 22.10.80; Singen/Hegau, 5.7.1980; Werbach/Tauber, 25.6.1989. An *Hippocrepis comosa* vielerorts häufig.
- A. curtisi** (105) überall häufig an *Coronilla varia*.
- A. pavidum** (108) bemerkenswerterweise immer nur einzeln.
- A. vorax** (109) bei Bruchsal ziemlich häufig an *Astragalus glycyphylum*.
- A. astragal** (125) im Kaiserstuhl an *Trifolium alpestre*, ebenso bei Crailsheim, knapp außerhalb Baden-Württembergs.
- A. ruficrus** (132) einmal bei Wiesental (nordwestlich von Bruchsal) gefunden (28.9.1980), außerdem am 15.5.1980 im Kaiserstuhl.
- A. interjectum** (133) an *Trifolium arvense* auf sandigen, kargen Flächen bei Bruchsal 1980 und am 24.7.1988.
- A. dissimile** (140)

Joachim Rheinheimer, Merziger Straße 24, 6700 Ludwigshafen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [25_1990](#)

Autor(en)/Author(s): Rheinheimer Joachim

Artikel/Article: [Notizen zum Vorkommen einiger Apion-Arten in Baden. 110](#)