ben Guayabas. Fast ausschließlich werden Männchen beobachtet; die Weibchen meiden eher das offene Gelände der Waldränder und Flußufer. Einigkeit besteht auch darüber, daß die große Mehrzahl der Arten in den tiefgelegenen Urwaldgebieten Mexicos, Mittel- und Südamerikas vorkommt, gehäuft im tropischen Regenwald, z.B. des Amazonasbeckens und der andinen Westkordillere Kolumbiens und Ecuadors. In Ausnahmen werden aber auch "extremely dry areas of Mexico" (DE VRIES 1987) sowie Gebirge über 2000 m Höhe besiedelt. Ich selbst sah Morphos auf rund 2000 m nahe der bolivianischen Stadt Cochabamba, wo die Straße ins Amazonas-Tiefland, die "Yungas", hinunterführt und auf den Sekundärwald trifft. VELEZ & SALAZAR (1991) nennen als gebirgsbewohnende Morphos die Arten *M. sulkowskyi* sowie *M. rodhoipteron*, die kleinste bekannte Art, einen Endemiten des höchsten Küstengebirges der Erde, der Sierra Nevada de Santa Marta an der kolumbianischen Karibikküste.

Bemerkenswert ist schließlich ein Hinweis von VELEZ & SALAZAR (1991), daß sich 6 bis 7 Arten ein und denselben Lebensraum teilen können, da sie unterschiedliche (Tages-)Flugzeiten haben und da sich ihre Präimaginalstadien in verschiedenen "Etagen" der Urwaldvegetation finden. Da der von Tagfaltern in den Tropen bevorzugte Lebensraum "Waldrand" bzw. "Flußufer" nicht in beliebiger Menge zur Verfügung steht, leuchtet es ein, daß Einnischungen der beschriebenen Art sich herausgebildet haben. Details bei DE VRIES (1987) bestätigen dies.

Literatur

- DE VRIES, P. J. (1987): The Butterflies of Costa Rica and their natural history (Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae). - xii, 327 pp., 50 Tafeln; Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- LE MOULT, E. (1946): Études préliminaires sur le genre *Apatura* s. str. (Lep., Nymphalidae). - Misc. Ent. 43: 58-75.
- LE MOULT, E. (1950): Revision de la Classification des Apaturinae de l'Ancien Monde. - Misc. Ent., Suppl. 1.
- LE MOULT, E. & Real, R. (1962): Les Morpho d'Amérique du Sud et Centrale. - Novitates Entomologicae, Suppl.: 1-296.
- SMART, P. (1977): Kosmos-Enzyklopädie der Schmetterlinge. - 279 pp.; Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart.
- VELEZ, J. & SALAZAR, J. (1991): Mariposas de Colombia. - Bogotá.

Ekkehard Friedrich, Colegio Alemán de Medellín, Apartado Aéreo, 90581 Itagui - Antioquia, Kolumbien

Korrigenda zu „Mitteilungen Jg. 31, 1996, Heft 2“

Seite 85: 3. Zeile: Der Wohnort ist **Eningen**, nicht Ehingen; dasselbe gilt für Seite 94, letzte Zeile.

Seite 104: „169. *Dicronychus equisetioides* Lohse“, 3. Absatz; der letzte Satz ist nur rudimentär abgedruckt worden, hier die vollständige Fassung: Der **verwandtschaftlich equisetioides nächststehende equiseti (Herbst)** kommt nach HORION (1953) in Deutschland im ganzen Gebiet im allgemeinen nur stellenweise und meist vereinzelt vor, ist jedoch aus Baden-Württemberg noch nicht bekannt (Wurst i. l.).

Seite 110: „175. *Abdera quadrifasciata* (Curt.)“, 2. Absatz, 8. Zeile: Hier muß es heißen *Conopalpus testaceus* (Ol.), nicht *brevicollis* Kr.! Der letzte Satz des 2. Absatzes ist deshalb zu streichen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [32_1997](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Korrigenda zu "Mitteilungen Jg. 31, 1996, Heft 2". 85](#)