© Entomologischer Verein Stuttgart e.V.;download www.zobodat.at

Neubeschreibungen

Airaphilus doramas n.sp., Wurst & Lange, 31, 1996, 59; Abb 63, 64, Gen 64
Ampedus tingitanus n.sp., Wurst, 30, 1995, 30; Abb + Gen 33
Anostirus nubilosus n.sp., Wurst & Schimmel, 30, 1995, 25; Abb 27, 28, Gen 28
Anthaxia chaerodrys n.sp., Szallies, 36, 2001, 125; Abb + Gen 127
Brachygonus hadullanus n.sp., Wurst, 30, 1995, 31; Abb + Gen 34
Elaphropus paulinae n.sp., Szallies, 36, 2001, 65, Abb 65
Elathous rufobasalis n.sp., Wurst, 29, 1994, 59; Abb + Gen 60
Pseudocrepidophorus concavifrons n.sp., Wurst, 29, 1994, 59; Abb + Gen 60
Rybinskiella heinzi n.sp., Frank, 29, 1994, 81; Abb 27, 28, Gen 28

Liste der nicht ausgewerteten Artikel

BERNHAUER, Dieter: Das Sammeln von Cerambyciden in Jugoslawien im Monat August, Jg. 2, S. 70
KLEß, Jürgen: Die Käferfauna des Landschaftsschutzgebietes Taubergießen, Jg. 4, S. 12
ALLENSPACH, V.: Arten der Mittelmeerfauna unter den Melolonthinae, Jg. 4, S. 40
BLUMENTHAL, Carl L.: Über einige Carabus aus der Türkei, Jg. 28, S. 47
BRAUN, Andreas R.: Die Wasserkäfer aus den Sammlungen des Naturkundemuseums in Freiburg (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia et Dryopoidea), Jg. 28, S. 47
DÖBERL, Manfred: Zur Alticinenfauna von Azerbaijan (Coleoptera: Chrysomelidae), Jg. 34, S. 129

Literatur

KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (1998): Hrsg.: Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Ent. Nachr. & Ber., Beiheft 4, 185 S., Dresden.
KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Ent. Nachr. & Ber. 44 (1), 60 - 84.
LUDWIG, CHRISTOPH (1999): 34 Jahre „Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V." Bibliographie. Mitt. ent. Ver. Stuttgart 34: 79 - 107

Horst Knapp, Schinnrainstr. 15, 76227 Karlsruhe

122. *Malvapion malvae* (F.) (Col., Apionidae) in Tamm nachgewiesen

Auch in dieser Saison habe ich verstärkt Malven in Kleingärten der mir in Tamm (ca. 6 km nordwestlich von Ludwigsburg) bekannten Stellen auf Apioniden abgesucht. Hier war *Rhopalapion longirostre* (Ol.) praktisch an allen abgesuchten Malvenpflanzungen anwesend (siehe Mitteilungen vom 19.09.01, 36. Jg., Seite 140). Die Vermutung liegt nahe, dass *R. longirostre* im Raum Ludwigsburg mittlerweile eingebürgert ist. Auch war dieser Apion nach meinen Beobachtungen die eindeutig dominierende Art.

Am 11.06.02 fiel mir ein rotbrauner Apion auf, den ich in 4 Ex. erbeuten konnte und der sich aufgrund seiner Auffälligkeit eindeutig als *Malvapion malvae* identifizieren ließ. Diese Art gilt als thermophil und wurde mit mehreren Funden im Rheintal belegt. Für Württemberg sind mir dagegen nur folgende drei Funde bekannt: VI.1991, Bisingen bei Hechingen, Kreis BL, leg. U. Weber. 1994, Ludwigsburg-Schlößlesfeld, 8 Ex., leg. E. Konzelmann. IX.1996, Umgebung Storzingen (Schmeietal), Kreis SIG, leg. U. Weber. Obiger Fund in Tamm wäre demnach der Vierte.

Thomas Gutknecht, Tamm

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: 37_2002

Autor(en)/Author(s): Gutknecht Thomas

Artikel/Article: 122. Malvapion malvae (F.) (Col., Apionidae) in Tamm nachgewiesen. 54