

## Wenig gemeldete Käferarten aus Baden-Württemberg (Coleoptera)

Horst Knapp, Karlsruhe

### ***Pterostichus aterrimus*** Herbst (Carabidae) – Neufund für BW nach 100 Jahren

Bei der Gemeinschaftsexkursion 2002 der AG SWD Koleopterologen in das Gebiet bei Konstanz, entdeckte ich am 10. Juni *P. aterrimus* unter einem Brett im Wollmatinger Ried, Gierenmoos (MTB 8320NO) (eine Sammelausnahmegenehmigung liegt vor).

HORION, A. (1941) für Baden: Bisher keine Meldung! Für Württemberg: Cannstadt und Ulm, nach v. D. TRAPPEN 1930. HORION, A. (1959) nennt nur noch Belege von Ulm in der coll. HÜBER (um 1900). Aus dem dem Bodensee angrenzenden schweizer Kanton St. Gallen ist ein Fund bei Altenrhein vom 4. und 7. April 1966 bekannt (HUGENTOBLE, H. (1966)). Auch MARGGI, W. (1992) nennt für die Schweiz nur diesen aktuellen Fund neben zwei weiteren aus der Westschweiz vor 1900. Die Hinweise gab mir Kollege JÜRGEN KLEß, dem an dieser Stelle herzlich gedankt sei für seine umfangreiche Literaturrecherche.

### ***Selatosomus cruciatus*** (Linné) (Elateridae) – Sicherer Neufund für BW nach 50 Jahren

Der Nachweis dieser schönen und bei uns seltenen Elateridae gelang mir bei der Gemeinschaftsexkursion am 1./2.7.1995 der AG SWD Koleopterologen in den Landkreis Ravensburg/Oberschwaben, bisher unveröffentlicht. *S. cruciatus* befand sich unter loser Rinde eines Fichtenstubbens am Waldsaum unter einer mächtigen Rotbuche im Hartobel/Rotachtal bei Horgenzell-Sießen, 500 m (MTB 8122SO).

FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002) verzeichnet neben den alten Meldungen nur einen unsicheren neueren Nachweis für BW.

Bei FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002) gibt es von verschiedenen Arten aus der Familie **Latridiidae** nur wenigen Nachweise. Nachfolgend Funddaten von vier Arten:

#### ***Corticarina inconspicua*** Wollaston (Latridiidae)

Karlsruhe-Grötzingen, Bruchwald (MTB 6917SW), September + Oktober 1996: von abgesägtem Efeu geklopft, 3 Ex. det. Gladitsch.

Karlsruhe-Durlach, Dornwaldsiedlung (MTB 6916SO), November 1996: aus morschem Ahorn (*Acer saccharinum*), 1 Ex. det. Rücker + 2 Ex. det. Knapp. Februar 1997: w.o., jedoch aus eingetragenen Substrat im Zuchtbehälter, 1 Ex. det. Knapp.

#### ***Enicmus brevicornis*** Mannerheim (Latridiidae)

Karlsruhe, nördlicher Hardtwald (MTB 6916 SW), April 1997: aus trockenem Efeu gezogen, 3 Ex. det. Rücker.

#### ***Melanophthalma suturalis*** (Mannerheim) (Latridiidae)

Ettlingen, Hedwigsquelle Umg., 130 m (MTB 7016NO), April 1996: aus Gesiebe unter anbrüchiger Pappel, 1 Ex. det. Rücker.

Karlsruhe-Grötzingen, Bruchwald (MTB 6917SW), Oktober 1996: von abgesägtem Efeu geklopft, 1 Ex. det. Rücker.

Karlsruhe-Durlach, Rückhaltebecken (MTB 7016NO), Februar 1997: aus Gesiebe von Detritus bei Hochwasser, 2 Ex. det. Rücker. Ein Nachweis bei BENSE, U. et al. (2000).

***Melanophthalma maura*** Motschulsky (Latridiidae)

Karlsruhe-Neureut, Tiefgestade (MTB 6916NW), Juli 1996: unter Rinde einer morschen Pappel, 1 Ex. det. Rücker. Zwei Nachweise bei BENSE, U. et al. (2000).

***Sacium pusillum*** (Gyllenhal) (Corylophidae) – Neu für BW

Nach BOWESTEAD, S. (1999) muß die Gattung *Clypastraea* Haldeman, 1842 heißen. Somit wird aus *S. pusillum*: ***Clypastraea pusilla* (Gyllenhal), 1810 comb. n.**

LANGE, F. (2001) meldet den „selten gefangenen“ *S. pusillum*, gezogen aus Tannenmistel. Dieser für BW neue Nachweis (FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002)) kann durch weitere Belege ergänzt werden. Alle Tiere stammen aus eingetragenen Totholz, teilweise mit Misteln besetzt. Das Material wurde in Zuchtbehältern im Zimmer bei Raumtemperatur und gelegentlicher Befuchtung gelagert.

Karlsruhe, nördlicher Hardtwald (MTB 6916SO)

März bis Mai 1997: Kiefernäste mit Mistel besetzt, etwa 100 Ex. von denen die Hälfte nicht ausgehärtet und daher nicht präparierbar war. Belege im SMNK und SMNS. April 1998: Kiefernäste mit Mistel besetzt, 3 Ex. Mai 1998: Eichenäste, 6 Ex. März 1999: Kiefernäste, 3 Ex.

Karlsruhe-Durlach, Oberwald (MTB 7016 NO)

März 1999: Hainbuchenäste, 3 Ex.

***Orthoperus atomus*** (Gyllenhal) (Corylophidae)

*O. atomus* wurde im April 1996 einem Gesiebe aus verpilztem Heu entnommen, Karlsruhe-Neureut, Tiefgestade (MTB 6916NW). Für Baden 1 Fund bei FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002), bei RHEINHEIMER (2000) sind 4 weitere Funde erwähnt.

***Orthoperus nigrescens*** Stephens (Corylophidae)

Beim Abklopfen von abgesägtem Efeu im Bruchwald bei Karlsruhe-Grötzingen (MTB 6917SW) 2 Ex. Oktober 1996. Nachweise aus Baden: Einer bei FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002) sowie zwei bei BENSE, U. et al. (2000).

***Oenopia impustulata*** (Linné) (Coccinellidae)

Zu dem bei RHEINHEIMER, J. (2000) aufgelisteten Fund noch folgende Anmerkung:

Diese Art wurde bisher in verschiedenen Moorgebieten Baden-Württembergs nachgewiesen (ZIEGLER, H. 1989). 1 Ex. *O. impustulata* (vid. Ziegler) konnte ich im November 1995 aus einem Gesiebe unter einer Kastanie im nördlichen Hardtwald/Karlsruhe (MTB 6916SW) entnehmen. Möglicherweise wurde das Tier aus dem ca. 8 km östlich gelegenen Weingartener Moor verdriftet.

***Litargus balteatus*** Leconte (Mycetophagidae)

Den bisherigen Meldungen aus den südlichen Landesteilen Baden-Württembergs (BRITZ, R. et al. (2001), LANGE, F. (2001)), BENSE, U. et al. (2000) und REIBNITZ, J. (1996) kann nun auch eine Meldung aus Nordbaden hinzugefügt werden: Karlsruhe-Durlach, Untermühsiedlung (MTB 6916SO), am Fuße eines Pappelstammes unter einem großen Baumpilz der Gattung *Ganoderma* im darunter befindlichen Material aus Pilzresten, Lehm Boden und Gras. Vom 29.10. bis 13.11.2001 erschienen im Ausleseapparat bei Zimmertemperatur ohne zusätzliche Wärmequelle 15 Tiere.

**Corticeus bicoloroides** (Roubal) (Tenebrionidae)

Von der von *C. bicolor* (Olivier) abgetrennten Art gibt es für Baden nur einen über 50 Jahre alten Nachweis: Stutensee NO Karlsruhe, leg. NOWOTNY März 1948 (REIBNITZ (1996)). Dem kann jetzt ein aktuellerer Fund angefügt werden: Februar 1996, Karlsruhe, nördlicher Hardtwald, Fasanengarten (MTB 6916SW), in dicker Eichenborke 1 Exemplar zusammen mit mehreren *C. bicolor*.

**Thamnurgus kaltenbachi** Bach (Scolytidae)

Vom Rande des Hardtwaldes in Eggenstein bei Karlsruhe (MTB 6916 NW) trug ich am 3.7.2001 die abgestorbenen, gallig verdickten Stängelpartien von *Teucrium scorodonia* (Salbei-Gamander) ein. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub konnte ich am 1.8.2001 dem Zuchtbehälter 8 tote Exemplare entnehmen. In Baden-Württemberg sind bisher nur zwei weitere Funde aus dem Rheintal bekannt (FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002)).

**Nanomimus circumscriptus** (Aubé) (Apionidae)

Die Art wurde im Februar 1997 im Rückhaltebecken von Karlsruhe-Durlach (MTB 7016NO) bei Hochwasser aus Detritus gesiebt. Nachweise für Baden-Württemberg: Überlingen, leg. Horion August 1953 2 Ex. und Exkursion Taubergießen, leg. Bernhauer Mai/Juni 1968.

**Camptorhinus statua** (Rossi) (Curculionidae)

Beim Ableuchten der rindenlosen Stammpartie einer lebenden Stieleiche im nördlichen Karlsruher Hardtwald (MTB 6916SW) konnte ich 1 Ex. an einem warmen Sommerabend des 14.6.2002 entdecken. Aus BW sind bisher nur zwei weitere Funde aus dem Rheintal bekannt (FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002)).

**Corticeus fraxini** Kugelann (Tenebrionidae) – **Nicht in BW**

Der bei RHEINHEIMER, J. (2000) versehentlich gemeldete *C. fraxini* ist *C. longulus* Gyllenhal. Die Determination war ungeklärt, wurde aber in der Datenbank nicht geändert.

**Literatur**

- BENSE, U. et al. (2000): Die Käfer der Markgräfler Trockenaue: 347-460; in: Vom Wildstrom zur Tockenaue, LfU BW, Karlsruhe.
- BOWESTEAD, S. (1999): A Revision of the Corylophidae (Coleoptera) of the West Palearctic Region: 30-35; Muséum d'histoire naturelle Genève.
- BRITZ, R. et al. (2001): Seltene und faunistisch bemerkenswerte Käferfunde aus Württemberg. – Mitt. ent. V. Stuttgart 36: 31-34; Stuttgart.
- FRANK, J. & KONZELMANN, E. (2002): Die Käfer Baden-Württembergs 1950-2000; LfU BW, Karlsruhe.
- HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer I, Adephega. – Caraboidea: 282-283.
- HORION, A. (1959): Bemerkungen zur Faunistik der württembergischen Käfer. – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 114: 187-189 und 198.
- HUGENTOBLER, H. (1966): Der schweizerische Bodenseeraum als Refugium einiger seltener Käferarten. – Entomologische Blätter 62: 125-127; Goecke&Evers, Krefeld.
- LANG, F. (2001): Interessante Käferbeobachtungen in Baden-Württemberg und Südhessen. – Mitt. ent. V. Stuttgart 36: 109-112; Stuttgart.
- MARGGI, W. (1992): Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz I und II, Documenta Faunistica Helvetiae Bd. 13.
- REIBNITZ, J. (1996): Über einige neue Arten aus dem Supplementband zwei und drei der Käfer Mitteleuropas. – Mitt. ent. V. Stuttgart 31: 57-58; Stuttgart.
- RHEINHEIMER, J. (2000): Die Käferfauna des Landkreises Karlsruhe und einiger angrenzender Gebiete. – Mitt. ent. V. Stuttgart 35; Stuttgart.

Horst Knapp, Schinnrainstr. 15, 76227 Karlsruhe

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [38 2003](#)

Autor(en)/Author(s): Knapp Horst

Artikel/Article: [Wenig gemeldete Käferarten aus Baden-Württemberg \(Coleoptera\).  
27-29](#)