

Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Coleoptera) aus Süddeutschland (Baden, Württemberg, Bayern)

Klaus Renner, Bielefeld

Das „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) mit seinen Nachträgen (KÖHLER 2000, 2011) gilt als Standardwerk für das nachgewiesene Vorkommen von Käferarten in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Seit Ende 2012 ist es auch online als „Entomofauna Germanica“ verfügbar und wird laufend durch Literatur-Recherchen und Materialrevisionen aktualisiert.

Der Verfasser hat seit mehreren Jahrzehnten in vielen Regionen Deutschlands entomologische Untersuchungen zur Käferfauna durchgeführt und faunistische Besonderheiten publiziert (z. B. RENNER 2001, RENNER 2005, RENNER 2011). Jetzt sind sämtliche Funde des Autors mit dem Internet-Katalog Entomofauna Germanica (<http://www.coleokat.de/de/fhl/>) abgeglichen worden. Dadurch sind neue und auch ältere Funde direkt als Erst- oder Wiederfund nach >50 oder >100 Jahren zu erkennen. Für die automatisierten Abgleich-Arbeiten gilt mein besonderer Dank Frank Köhler (Bornheim).

Das Abgleichen der Funde des Autors mit dem Katalog Entomofauna Germanica hat für die süddeutschen Faunengebiete die tabellarisch aufgeführten Funde ergeben, die einen Statuswechsel der jeweiligen Art im Katalog zur Folge haben.

In der nachfolgenden Zusammenstellung wird den Käfernamen der Identifizierungscode nach LUCHT (siehe KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) vorangestellt. Die Erstfunde für die jeweilige Region sind besonders gekennzeichnet (*). Die Nachweise der übrigen hier aufgeführten Arten sind Wiederfunde nach >50 Jahren, in einem Fall nach >100 Jahren. Die Mehrzahl aller Funde gelang durch den Einsatz des Autokeschers. Diese Fangmethode erweist sich immer wieder als äußerst effektiv und rationell, falls es nicht um spezielle Fragen zur Biotopbindung der Arten geht.

W. SCHAWALLER (Stuttgart) und M. SCHÜLKE (Berlin) danke ich für Bestimmungshilfen.

Baden (Ba)			
* 16-003-030-.	<i>Leiodes ferruginea</i> (FABRICIUS, 1787)	Wyhl/Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher	2010
* 18-005-007-.	<i>Neuraphes rubicundus</i> (SCHAUM, 1841)	Zastler/Schwarzwald, Autokescher	2000
* 21-009-005-.	<i>Ptiliolum spencei</i> (ALLIBERT, 1844)	Elzach, Umgebung, Autokescher	1983
21-019-009-.	<i>Acrotichis silvatica</i> ROSSKOTHEIN, 1935	Elzach, Umgebung, Autokescher	1983
23-024-001-.	<i>Deliphrum tectum</i> (PAYKULL, 1789)	Elzach, Katzenmoos, Autokescher	2001
* 23-045-013-.	<i>Ochtheophilus praepositus</i> (MULSANT & REY, 1878)	Wyhl/Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher	2006
* 23-046-028-.	<i>Carpelimus exiguus</i> (ERICHSON, 1839) det. SCHÜLKE 2010	Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher	2001
23-130-012-.	<i>Gyrophaena munsteri</i> STRAND, 1935	Wyhl/Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher	2010
* 23-156-003-.	<i>Gnypeta carbonaria</i> (MANNERHEIM, 1830)	Niederrotweil, Rhein-Auwald, Autokescher	2001
23-156-003-.	<i>Gnypeta carbonaria</i> (MANNERHEIM, 1830)	Wyhl/Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher	2010
* 23-1881.0061.	<i>Acrotona pseudotenera</i> (CAMERON, 1933). Adventivart, vom Verfasser aus zahlreichen Regionen gemeldet.	Wyhl/Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher	2010
* 23-213-003-.	<i>Meotica pallens</i> (REDTENBACHER, 1849)	Elzach, Obersimonswald, Autokescher	1997
* 24-015-007-.	<i>Batrissodes oculatus</i> (AUBÉ, 1833)	Wyhl/Rhein, Rhein-Auwald, Autokescher	2006
* 34-0292.002-.	<i>Mosotalesus nigricornis</i> (PANZER, 1799)	Baden-Oos, NSG Bruchbraben	2011
58-009-008-.	<i>Melanophthalma fuscipennis</i> MANNERHEIM, 1844. Erstfund durch GUTKNECHT 2011b	Sasbach, Lützelberg	2012
88-051-053-.	<i>Longitarsus parvulus</i> (PAYKULL, 1799)	Sasbach, Lützelberg	2010

	Württemberg (Wt)		
* 23-.088-.052.-	<i>Philonthus ventralis</i> (GRAVENHORST, 1802)	Stuttgart, Beutelsbach	2006
* 23-.1881.0061.	<i>Acrotona pseudotenera</i> (CAMERON, 1933)	Stuttgart, Beutelsbach	2006
381.002-.0011.	<i>Clambus simsoni</i> BLACKBURN, 1902 Siehe GUTKNECHT 2011a.	Blaubeuren, Berghülen, Autokescher	2007
50-.009-.024.-	<i>Epuraea distincta</i> (GRIMMER, 1841) Gleicher Fundort wie bei GUTKNECHT 2011a.	Blaubeuren, Arnegg, Blautal	2012
55-.014-.009.-	<i>Atomaria peltata</i> KRAATZ, 1853. Siehe GUTKNECHT 2011a.	Blaubeuren, Berghülen, Autokescher	2007
* 55-.014-.0431.	<i>Atomaria punctithorax</i> REITTER, 1887	Blaubeuren, Berghülen, Autokescher	2007
* 93-.026-.008.-	<i>Trachyphloeus bifoveolatus</i> (BECK, 1817)	Neresheim, Stadtgebiet	2007
93-.092-.001.-	<i>Notaris bimaculata</i> (FABRICIUS, 1787) Siehe KLESS & KLESS 2005	Konstanz, Wollmatinger Ried	2002
* 93-.102-.001.-	<i>Ellescus scanicus</i> (PAYKULL, 1792)	Konstanz, Dettingen	2002
	Bayern (By)		
21-.004-.001.-	<i>Oligella foveolata</i> (ALLIBERT, 1844)	Falkenstein, Frankenberg, Autokescher	1998
21-.009-.005.-	<i>Ptilium spencei</i> (ALLIBERT, 1844) Wiederfund nach >100 Jahren, gemeldet von SCRIBA (SINGER 1955)	Kallmünz, Waldgebiet RAFFA, Autokescher	1998
23-.064-.001.-	<i>Pseudomedon obscurellus</i> (ERICHSON, 1840)	Falkenstein, Frankenberg, Autokescher	1998
23-.1262.005.-	<i>Cypha laeviuscula</i> (MANNERHEIM, 1830) gemeldet von FLACH (SINGER 1955)	Falkenstein, Rettenbach, Autokescher	1998
* 23-.1881.0061.	<i>Acrotona pseudotenera</i> (CAMERON, 1933)	Würzburg, Erlabrunn, Autokescher	2006
* 58-.009-.0011.	<i>Melanophthalma transversalis</i> (MANNERHEIM, 1844). Wegen taxonomischer Änderungen sind alte Meldungen nicht sicher zuzuordnen.	Kallmünz, Schwaighauser Forst, Autokescher	1998
* 83-.025-.001.-	<i>Tribolium madens</i> (CHARPENTIER, 1825) det. SCHAWALLER 2013	Falkenstein, Frankenberg, Autokescher	1998
89-.004-.009.-	<i>Bruchidius dispar</i> (GYLLENHAL, 1833)	Würzburg, Erlabrunn	2007
89-.004-.009.-	<i>Bruchidius dispar</i> (GYLLENHAL, 1833)	Gambach / Main	2007

Literatur

- GUTKNECHT, T. (2011a): Ergebnisse der Exkursion der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Koleopterologen 2007 nach Merklingen, Berghülen und ins Blautal. – Mitt. Entom. Ver. Stuttgart 46: 51-97.
- GUTKNECHT, T. (2011b): *Melanophthalma fuscipennis* (Mannerheim, 1844) – Neufund für Baden. – Mitt. Entom. Ver. Stuttgart 46:102.
- KLESS, J. & U. KLESS (2005): Käfer aus dem NSG Wollmatinger Ried am Bodensee. Ergebnisse der Exkursion 2002 der Arbeitsgemeinschaft südwestdeut. Koleopterologen (Teil 1). – Mitt. Ent. Ver. Stuttgart 40, 97-116.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44: 60–84.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 55: 109–174, 247–254.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 4: 1–185.
- RENNER, K. (2001): Ein Massenvorkommen von *Micropeplus marietti* DUVAL (Coleoptera, Staphylinidae). – Mitt. Entom. Ver. Stuttgart 36: 44.
- RENNER, K. (2005a): Einige bemerkenswerte Funde von Käfern in der Pfalz (Coleoptera). – COLEO 6, 87-90. Radevormwald.
- RENNER, K. (2005b): Faunistisch bemerkenswerte Käferfunde zwischen Schwarzwald und Rheinaue (Coleoptera). – COLEO 6, 99-116. Radevormwald.
- RENNER, K. (2011): Einige bemerkenswerte Funde von Käferarten in Baden, Rheinland-Pfalz und Westfalen (Coleoptera: Carabidae, Hydrophilidae, Leiodidae, Ptiliidae, Staphylinidae, Throscidae, Cryptophagidae, Latridiidae, Aderidae, Curculionidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55:71-72. Dresden.
- SINGER, K. (1955): Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. Naturwiss. Mus. Stadt Aschaffenburg 7, 1-272.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [48 2013](#)

Autor(en)/Author(s): Renner Klaus

Artikel/Article: [Neu- und Wiederfunde von Käferarten \(Coleoptera\) aus Süddeutschland \(Baden, Württemberg, Bayern\) 51-52](#)