© Entomologischer Verein Stuttgart e.V.;download www.zobodat.at

Reitter, E. (1894): Ueber einige bekannte und neue Borkenkäfer. Wiener Entomologische Zeitung 13: 45

Reitter, E. (1913): Bestimmungs-Tabelle der Borkenkäfer (Scolytidae) aus Europa und den angrenzenden Ländern. Wiener Entomologische Zeitung (Beiheft) 32: 1-116.

Schedl, K. E. (1980): Coleoptera, Fam. Scolytidae und Platypodidae. Catalogus Faunae Austriae, Teil XV y. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 39 pp.

Schedl, K. E. (1981): 91. Familie: Scolytidae (Borken- und Ambrosiakäfer), pp. 34-99, 280-295, In: Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. (eds.): Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Goecke & Evers, Krefeld, 310 pp.

Wichmann, H. E. (1927): Ueber die geographische Verbreitung der Ipiden (Col.), II. Die Ipidenfauna Niederösterreichs und des nördlichen Burgenlandes. Koleopterologische Rundschau 1: 42-80.

Wood, S. L. & Bright, D. E. (1992): A catalog of Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera), Part 2. Taxonomic Index, Great Basin Nat. Mem. 13: 1553 pp.

Heiko Gebhardt, Maienfeldstr. 23-1, 72074 Tübingen

Kleine Mitteilungen

Lilioceris schneideri (Weise, 1900) (Col., Chrysomelidae) – neu für Baden-Württemberg

Lilioceris schneideri (Lohse & Lucht, 1994: Die Käfer Mitteleuropas, Suplementband 14, S. 25/26) ist nach derzeitigem Kenntnisstand in Baden-Württemberg auf der Alb und im Wutachgebiet verbreitet und bisher verkannt worden. Jürgen Kleß fing die Art 1956 und 1957 in der Wutachschlucht (als *L. merdigera* publiziert), ebendort fand ich sie 1963. Weitere Funde gibt es von Frank Baum: Dreifürstenstein 1968 und Wutachflühen 1970, von Jürgen Kleß: Pault bei Sigmaringen 1983 (als *L. merdigera* in Kostenbader, 1988), von Frank Lange: Traifelberg (Gemeinde Lichtenstein), 09.05.2009, Übersberg bei Pfullingen, 14.06.2015, Roßberg bei Gönningen (Reutlingen), 14.06.2015 und von Lonie Geigle: Bad Urach 2015. Bei der Exkursion der ARGE südwestdeutscher Koleopterologen in Stühlingen 2013 (Exkursionsbericht in Vorbereitung) wurde die Art ebenfalls festgestellt.

L. schneideri lebt offenbar nur an Türkenbund (*Lilium martagon*), oft zusammen mit *L. lilii*. Eine Überprüfung der als *L. merdigera* in den Sammlungen steckenden Tiere aus dem Verbreitungsgebiet der Türkenbundlilie ergibt sicher eine Reihe weiterer Fundorte. Eine ausführliche Publikation gemeinsam mit Michael Schmitt ist in Bearbeitung.

Wolfgang Pankow, Dogern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: 50_2015

Autor(en)/Author(s): Pankow Wolfgang

Artikel/Article: Kleine Mitteilungen: Lilioceris schneideri (Weise, 1900) (Col., Chrysomelidae) - neu für Baden-Württemberg 238