

Die Ohrwurm-Sammlung (Insecta: Dermaptera) des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart

Danilo Matzke, Leipzig & Wolfgang Schawaller, Stuttgart

Einleitung

Die Dermaptera (Ohrwürmer) sind eine eher artenarme Tiergruppe. Weltweit kennt man etwa 2000–2500 Arten. Sie werden gewöhnlich als Randgruppe betrachtet und es wird Ihnen üblicherweise nicht die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet wie den großen Insektenordnungen. Deshalb besitzen die meisten Museen in ihren Sammlungen kaum oder wenige Arten.

Ohrwürmer werden meist als Beifänge von Reisen und Expeditionen mitgebracht. Bei der Bearbeitung und Neustrukturierung der Ohrwurm-Sammlung des Stuttgarter Naturkundemuseums (SMNS) in den letzten Jahren durch den Erstautor stellte es sich heraus, daß hier mehr Arten vorhanden sind als in vielen anderen Museen.

Geschichte und Umfang der Dermaptera-Sammlung

Bis etwa zum Jahr 1980 bestand die Stuttgarter Sammlung nur aus wenigen Exemplaren und Arten, teilweise zurückgehend auf die historische Sammlung des Staatsrates Karl von Roser (1812–1661). Die alten Belege waren zumeist auch geografisch begrenzt auf den südwestdeutschen Raum (siehe G. Radek, 1971, Beitrag zur Dermapteren Fauna von Württemberg, Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart, Sonderheft 10, S. 1–9). Nach 1980 mit zunehmenden Reiseaktivitäten der hauptamtlichen aber auch befristeten Mitarbeiter der Entomologischen Abteilung, sowie der Mitglieder des Entomologischen Vereins Stuttgart, insbesondere durch D. Bartsch, F. Bretzendorfer, T. Osten, A. Riedel und W. Schawaller, nahm die Zahl der Objekte sprunghaft zu, und auch die geografische Herkunft wurde immer abwechselungsreicher. So wurden neben vielen Mittelmeerlandern auch mehrfach der Nepal Himalaya, Zentralasien und Kaukasus, Borneo, Neu Guinea, Philippinen, Südamerika und das südliche Afrika bereist. Mangels taxonomischer Expertise blieben die Zugänge aber meist unbestimmt.




Abb. 1: Artenzahlen Dermaptera in deutschen Sammlungen.

Das änderte sich glücklicherweise im Laufe der letzten 10 Jahre. Spezialisten dieser Insektenordnung identifizierten die Neuzugänge, insbesondere F. Haas, und danach verstärkt D. Matzke. Letzterer stellte zudem in ehrenamtlicher Arbeit die komplette Sammlung neu auf. Durch Vermittlung von F. Haas gelangte 2006 auch eine kleine, aber sehr artenreiche Spezialsammlung von D. Borisch aus Lidingö/Schweden an das Stuttgarter Museum, und auch D. Matzke füllte danach noch einige Lücken.

Die Stuttgarter Ohrwurm-Sammlung umfasst zur Zeit 3800 Exemplare von 208 Arten in 35 Insektenkästen, drei Arten sind durch Paratypen und eine Art durch zwei Syntypen vertreten (siehe Liste). Damit beinhaltet die Sammlung gut 10% der weltweiten Dermapteren-Fauna und steht hinsichtlich der Artenzahl in Deutschland an dritter Stelle hinter den Museen in Hamburg und Berlin (siehe Abb. 1).

Artenliste		
Arixeniidae:		
<i>Hemimeri hemimerus</i>	<i>Gonolabis insita</i>	<i>Apachyus feae</i>
Pygidicranidae:	<i>Gonolabis electra</i>	<i>Apachyus javanus</i>
<i>Lobodiplatys coriaceus</i>	<i>Gonolabis umbrosa</i>	Labiduridae:
<i>Diplatys ugandanus</i>	<i>Gonolabis woodwardi</i>	<i>Allostethus indicum</i>
<i>Haplodiplatys siva</i>	<i>Gonolabis cavaleriei</i>	<i>Allostethus minor</i>
<i>Haplodiplatys triangulatus</i>	<i>Anisolabis gestri</i>	<i>Nala lividipes</i>
<i>Blandex solvendus</i>	<i>Anisolabis modesta</i>	<i>Nala nepalensis</i>
<i>Bormansia meridionlis</i>	<i>Anisolabis littorea</i>	<i>Nala ornata</i>
<i>Dacnodes frontalis</i>	<i>Anisolabis excisa</i>	<i>Labidura japonica</i>
<i>Tagalina burri</i>	<i>Anisolabis maritima</i>	<i>Labidura riparia</i>
<i>Cranopygia mamoricrura</i>	<i>Aborolabis mauritanica</i>	<i>Labidura bengalensis</i>
<i>Cranopygia picta</i>	<i>Aborolabis nepalensis</i>	<i>Labidura tuncata</i>
<i>Pyragra fuscata fuscata</i>	<i>Aborolabis nigrescens</i>	
<i>Pyragra fuscata dohrnia</i>	<i>Parisopsis spryi</i>	<i>Forcipula graiazzii</i>
<i>Pyragropsis emarginata</i>	<i>Euborellia annulipes</i>	<i>Forcipula decolyi</i>
<i>Echinosoma fuscum</i>	<i>Euborellia brunneri</i>	<i>Forcipula trispinosa</i>
<i>Echinosoma sumatranum</i>	<i>Euborellia plebeja</i>	<i>Forcipula yunnanea</i>
<i>Echinosoma concolor</i>	<i>Euborellia moesta</i>	Labiidae / Spongiphorinae:
<i>Echinosoma occidentale</i>	<i>Euborellia andreinii</i>	<i>Nesogaster amoenus</i>
<i>Echinosoma convolutum</i>	<i>Euborellia femoralis</i>	<i>Nesogaster dolichus</i>
<i>Echinosoma wahlbergi</i>	<i>Euborellia arcanum</i> (Paratypus)	<i>Nesogaster aculeatus</i>
<i>Echinosoma insulanum</i>	<i>Euborellia cincticollis</i>	<i>Nesogaster cristata</i>
<i>Echinosoma grossum</i>	<i>Carcinophora americana</i>	<i>Auchenomus javanus</i>
<i>Echinosoma horridum</i>	<i>Carcinophora robusta</i>	<i>Auchenomus intermedius</i>
<i>Espalmenus lativentris</i>	<i>Carcinophora percheroni</i>	<i>Auchenomus setulosus</i>
Carcinophoridae:	<i>Epilandex burri</i>	<i>Auchenomus minutus</i>
<i>Titanolabis colossea</i>	<i>Ctenisolabis ruficollis</i>	<i>Chaetospania mandex</i>
<i>Canarilabis maxima</i>	<i>Ctenisolabis fletcheri</i>	<i>Chaetospania villica</i>
<i>Canarilabis alata</i>	<i>Brachylabis geniculata</i>	<i>Chaetospania volcania</i>
	<i>Brachylabis canaca</i>	<i>Chaetospania feae</i>
	<i>Gonolabina trinodosa</i>	<i>Chaetospania fallax</i>
	Apachyidae:	<i>Chaetospania feuernborni</i>
	<i>Apachyus chartaceus</i>	<i>Spongiphora croceipennis</i>
	<i>Apachyus depressus</i>	<i>Irdex chapmani</i>
		<i>Irdex litus</i>

<i>Irdex wittmeri</i>	Forficulidae:	<i>Pseudochelidura sinuata</i>
<i>Irdex elongatus</i>		<i>Pseudochelidura montouosa</i>
<i>Irdex stella stella</i>		<i>Perirrtytus maderiensis</i>
<i>Irdex papuanus</i>		<i>Anechura bipunctata</i>
<i>Spongovostox ochropus</i>		<i>Anechura japonica</i>
<i>Spongovostox marginalis</i>		<i>Anechura zubovskii</i>
<i>Spongovostox semiflavus</i>		<i>Apterygida media</i>
<i>Spongovostox alter</i>		<i>Guanchia pubescens</i>
<i>Spongovostox osellai</i>		<i>Guanchia obtusangula</i>
<i>Spongovostox assiniensis</i>		(2 Paratypen)
<i>Spongovostox quadrimaculatus</i>		<i>Skalistes lugubris</i>
<i>Cirolabia arcuata</i>		<i>Doru lineare</i>
<i>Labia minor</i>		<i>Doru taeniatum</i>
<i>Labia tricolor</i>		<i>Doru aculeatum</i>
<i>Marava luzonia</i>		<i>Doru luteipes</i>
<i>Marava nitida</i>		<i>Doru albipes</i>
<i>Paralabella stigma</i>		<i>Afrocosmia brunnea</i>
<i>Paralabella curvicauda</i>		<i>Pterygida gracilis</i>
<i>Prolabia (Marava) arachides</i>		<i>Pterygida buergersi</i>
<i>Homotages feae</i>		<i>Paralax nieuwenhuisi</i>
<i>Isolaboides kosswigi</i>		<i>Metesura ruficeps</i>
<i>Isolabella graeca</i>		<i>Forficula lucasi</i>
<i>Chaetolabia canaca</i>		<i>Forficula senegalensis</i>
<i>Springolabis hawaiensis</i>		<i>Forficula lesnei</i>
Chelisochidae:		<i>Forficula aetolica</i>
<i>Chelisochella superba</i>		<i>Forficula auricularia</i>
<i>Adiethetus shelfordi</i>		<i>Forficula calmar</i>
<i>Chelisoches morio</i>		<i>Forficula smyrnensis</i>
<i>Chelisoches australicus</i>		<i>Forficula vicaria</i>
<i>Schizoporeus ritsemae</i>		<i>Forficula lurida</i>
<i>Schizoporeus vulcanus</i> (Paratypus)		<i>Forficula tomis</i>
<i>Proreus simulans</i>		<i>Forficula beelzebub</i>
<i>Proreus fuscipennis</i>		<i>Forficula schlagintweiti</i>
<i>Proreus laetior</i>		<i>Forficula decipiens</i>
<i>Euenkrates variegatum</i>		<i>Forficula beebei</i>
<i>Hamaxas nigrorufus</i>		<i>Forficula bhutanensis</i>
<i>Hamaxas semiluteus</i>		<i>Forficula planicollis</i>
		<i>Forficula ornata</i>
		<i>Forficula picta</i>
		<i>Forficula interrogans</i>
		<i>Forficula brolemani</i>
		<i>Proforficula peringueyi</i>

Danilo Matzke, Stöckelstr. 19, D-04347 Leipzig – E-Mail: danilo.matzke@arcor.de

Dr. Wolfgang Schawaller, Staatliches Museum für Naturkunde,
Rosenstein 1, D-70191 Stuttgart – E-Mail: wolfgang.schawaller@smns-bw.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [50_2015](#)

Autor(en)/Author(s): Matzke Danilo, Schawaller Wolfgang

Artikel/Article: [Die Ohrwurm-Sammlung \(Insecta: Dermaptera\) des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart 270-272](#)