

# Nomenklatorische Änderungen in der Gattung *Coenobius Suffrian*

(Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae)

Matthias SCHÖLLER

**Abstract:** *Cryptocephalus jacobyi* (Clavareau, 1913) **comb. nov.** was transferred from *Coenobius*. The following new names are proposed: *Coenobius discoideus nom. nov.* for *C. discoidalis* Pic, 1953 not Baly, 1877; *Coenobius azureus nom. nov.* for *C. cyaneus* Lopatin, 1979 not Pic, 1930; *Coenobius medvedevi nom. nov.* for *C. puncticollis* L. N. Medvedev & Samoderzhenkov, 1987 not Weise, 1909; *Coenobius formosus nom. nov.* for *C. babai* Kimoto, 1991 not Chûjô, 1963; *Coenobius choanus nom. nov.* for *C. collaris* Kimoto, 1996 not Gressitt, 1965; *Coenobius badius nom. nov.* for *C. puncticollis* Lopatin, 1997 not Weise, 1909.

**Key words:** Monachulini, afrotropical region, oriental region, nomenclature

## Einleitung

Die Gattung *Coenobius* Suffrian, 1857 ist mit 149 Arten in der afrotropischen Region, der Palaearktis, der Orientalis und der Australis verbreitet. Bei Vorbereitungen zu einer Revision der 36 afrotropischen Arten der Gattung zeigte sich die Notwendigkeit, Homonyme zu beseitigen und eine Art in eine andere Gattung zu stellen. Im folgenden werden die neuen Namen und Kombinationen vorgeschlagen. Grundlage für diese taxonomische Arbeit waren Typenstudien im Natural History Museum, London, England, und der Zoological Record.

## Ergebnisse und Diskussion

***Cryptocephalus jacobyi* Clavareau, 1913 comb. nov.**

*Coenobius sulcicollis* Jacoby, 1902, Entomolog. 35: 203

*Coenobius jacobyi* Clavareau, 1913, Col. Cat.: 123 syn nov.

Die oberen Hälften der Augen sind bei dieser Art der Gattung *Cryptocephalus* stark genähert, daher beschrieb sie JACOBY vermutlich in der Gattung *Coenobius*. CLAVAREAU gab ihr 1913 den neuen Namen *jacobyi*, da *sulcicollis* in der Gattung *Coenobius* bereits vergeben worden war. *C. jacobyi* gehört in eine Gruppe von Arten, die im Osten Afrikas und in Madagaskar verbreitet ist.

***Coenobius discoideus* nom. nov.**

*Coenobius discoidalis* Pic, 1953 (nec Baly, 1877: 212), Bull. Inst. Sci. nat. Belg. 29:6 syn. nov.

Der Name *discoidalis* ist in der Gattung *Coenobius* bereits 1877 von BALY vergeben worden, der von PIC (1953) beschriebene ruandische *Coenobius* muß somit umbenannt werden.

***Coenobius azureus* nom. nov.**

*Coenobius cyaneus* Lopatin, 1979 (nec Pic, 1930: 350), Entomol. Basiliensia 4: 437 syn. nov.

Der Name *cyaneus* ist in der Gattung *Coenobius* bereits 1930 von PIC vergeben worden, der von LOPATIN 1979 beschriebene indische *Coenobius* muß somit umbenannt werden.

***Coenobius medvedevi* nom. nov.**

*Coenobius puncticollis* L. N. Medvedev & Samoderzhenkov, 1987 (nec WEISE, 1909: 174), Insect fauna of Vietnam: 25 syn. nov.

Der Name *puncticollis* ist in der Gattung *Coenobius* bereits 1909 von WEISE vergeben worden, der von L.N. MEDVEDEV & SAMODERZHENKOV 1987 beschriebene vietnamesische *Coenobius* muß somit umbenannt werden.

***Coenobius formosus* nom. nov.**

*Coenobius babai* Kimoto, 1991 (nec CHÛJÔ, 1963: 21), Entomol. Rev. Japan 46:13 syn. nov.

Der Name *babai* ist in der Gattung *Coenobius* bereits 1963 von CHÛJÔ vergeben worden, der von KIMOTO 1991 beschriebene taiwanesische *Coenobius* muß somit umbenannt werden.

***Coenobius choanus* nom. nov.**

*Coenobius collaris* Kimoto, 1996 (nec GRESSITT, 1965:400), Entomol. Rev. Japan 51:36 syn. nov.

Der Name *collaris* ist in der Gattung *Coenobius* bereits 1965 von GRESSITT vergeben worden, der von KIMOTO 1996 beschriebene taiwanesische *Coenobius* muß somit umbenannt werden.

***Coenobius badius* nom. nov.**

*Coenobius puncticollis* Lopatin, 1997 (nec WEISE, 1909: 174), Zoosystematica Rossica 6:273 syn. nov.

Der Name *puncticollis* ist in der Gattung *Coenobius* bereits 1909 von WEISE und 1987 von L. N. MEDVEDEV & SAMODERZHENKOV vergeben worden, der von LOPATIN 1997 beschriebene philippinische *Coenobius* muß somit umbenannt werden.

## Schriften

- CLAVAREAU, H. (1913): Chrysomelidae: 8. Cryptocephalinae. In: SCHENKLING, S., Coleopterorum Catalogus. - W. Junk, Berlin:85-209.
- GRESSITT, J. L. (1965): Chrysomelid beetles from the papuan subregion, 2 (Clytrinae, Cryptocephalinae, Chlamisinae). - Pacific Insects 7:387-449.
- KIMOTO, S. (1991): Descriptions of a new genus and six new species of Chrysomelidae (Coleoptera) collected by Dr. Kintaro Baba in Taiwan, China. - Entomol. Rev. Japan 46:13-20.
- (1996): Notes on Chrysomelidae from Taiwan, China, 13. - Entomol. Rev. Japan 51:27-51.
- LOPATIN, I. K. (1979): Neue und wenig bekannte Chrysomeliden (Coleoptera) von Nord-Indien aus der Sammlung des Naturhistorischen Museums Basel. - Entomol. Basiliensia 4:431-441.
- (1997): New species of Cryptocephalinae from the Philippine and Fiji Islands (Coleoptera: Chrysomelidae). - Zoosyst. Rossica 6:269-274.
- MEDVEDEV, L. N. & SAMODERZHENKOV, E. V. (1987): Cryptocephaline fauna (Coleoptera, Chrysomelidae) from Vietnam. In: MEDVEDEV, L. N. (Hrsg.) Insect fauna of Vietnam. - Nauka, Moscow:20-40. (in Russ.)
- PIC, M. (1930): Cryptocéphalides africains en partie nouveaux. - Rev. Zool. Bot. Afr. 18:344-357.
- (1953): Coléoptères divers nouveaux, du Congo Belge. - Inst. Sci. nat. Belg. 29:1-7.

**Verfasser:**

Dr. Matthias SCHÖLLER, Gabriel-Max-Straße 18, D-10245 Berlin.  
E-Mail: mschoell@tricho.b.shuttle.de

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [24\\_1-2\\_1999](#)

Autor(en)/Author(s): Schöller Matthias

Artikel/Article: [Nomenklatrorische Änderungen in der Gattung Coenobius Suffrian 73-75](#)