# Dipteren

von

Herrn Dr. **Fr. Stuhlmann** in Ost-Afrika

gesammelt.

Von

*V. v. Röder,* Hoym in Anhalt.

---

Aus dem

Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. X. 2.

Hamburg 1893.

Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern.

1. **Notacanthe** (unvollständig erhalten). Quilimane 11. I. 1889.

2. **Tabanus** biguttatus Wied. 2 Ex. Quilimane, 16. II. 1889; Sansibar, 4. VI. 1888.

3. **Tabanus** subelongatus Mcq. Quilimane, 6. II. 1889; desgleichen 16. III. 1889.

4. **Haematopota** spec. Usegua, 24. VIII. 1888.

5. **Systoechus** ferrugineus Mcq. Mbusini (Usegua), 27. VIII. 1888.

6. **Microstylum** acutirostre Lw. Quilimane. 16. I. 1889.

7. **Hoplistomera** serripes Fabr. Quilimane, 16. I. 1889; desgleichen II. 1889.

Diese Exemplare sind kleiner als gewöhnlich.

8. **Laxenecera** Stuhlmanni n. spec. ♂.

Atra, nitida; antennis pedibusque concoloribus; alis hyalinis, venis dimidii anterioris brunneo-ochraceis, posterioris obscurius brunneis. Pili occipitis, tertii antennarum articuli mystacisque superioris nigri; verticis genarum, menti mystacisque inferioris pili albi; frons et primus antennarum articulus albo-pilosi, pilis nigris intermixtis; in thoracis dorso adsunt pili longiores nigri et multo breviores albidi; scutellum et abdomen nigro-pilosa in lateribus marginis postici segmentorum abdominalium singulorum albo-pilosis; forcipe anali albo-piloso; pedibus (nigris) albo-pilosis. — Long. 17 millim.

Patria: Africa, Quilimane. 2 Ex. 18. I. 1889. et 15. II. 1889. von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann entdeckt und von mir zur Ehre desselben nach ihm benannt.

9. **Megaspis** natalensis Mcq. = curtus Lw. Sansibar, 23. V. 1888.

10. **Plagiocera** nigrita Bigot = Plagiocera haemorrhoa Gerst. Sansibar, 26. IV. 1888.

11. **Hypoderma** bovis Deg. Cairo, 21. III. 1888.

12. **Glossina** morsitans Westw. Mbusini (Usegua), 27. VIII. 1888.

13. **Lucilia** putoria Wied. Sansibar, I. VI. 1888.

14. **Musca** spec. Quilimane, 18. I. 1889.

15. **Musca** spec. Pangani, 7. XII. 1889.

16. **Diopsis** thoracica Westw. = longicornis Mcq. Sansibar, VII. 1888. und 7. VIII. 1888.

17. **Ornithoica** Podicipis [1]) n. spec.

Nigra; humeris, lateribus thoracis pedibusque flavis, alis dilute fuscis. Long. corp. 2½ millim., long. alar. 3 millim. Exemplaria in Sansibar lecta 29. X. 1888. (Podicipis avis parasita).

Ich habe das Genus Ornithoica Rondani in den Entomologischen Nachrichten von Dr. F. Karsch 1890, p. 311, genauer beschrieben. Das Flügelgeäder ist auch bei dieser Art, wie bei den anderen beiden Arten fast gleich. Die dritte Längsader vereinigt sich im letzten Drittel mit der Vorderrandader. Die Analzelle ist sehr deutlich. Was die Unterscheidung der 3 Ornithoica-Arten anbelangt, so ist die vordere Basalzelle bei O. Beccariina Rond. erweitert, während bei O. Podicipis und Turdi Latr. die vordere Basalzelle gleichbreit verläuft. Der Unterschied zwischen O. Podicipis und Turdi Latr. besteht in der viel längeren Vereinigung der dritten Längsader mit der Randader bei O. Podicipis, während diese Vereinigung bei O. Turdi Latr. viel kürzer ist. Die hintere Basalzelle ist etwas kürzer als die vordere bei O. Podicipis; bei O. Turdi sind beide Basalzellen fast gleich lang.

Cellula basalis prima alarum dilatata.
Ornithoica Beccariina Rond.

Cellula basalis prima alarum aequilata. — 1.

1. Vena tertia longitudinalis alarum longe conjungens cum margine anteriore. — O. Podicipis n. spec.
   Vena tertia longitudinalis alarum breviter conjungens cum margine anteriore. — O. Turdi Latr.

---

[1]) Aus einer mir zur Verfügung gestellten, durch den vorliegenden Fall veranlassten, eingehenden fachmännischen Erörterung über den Namen Podiceps und seine Genitivbildung gebe ich hier folgende Sätze wieder: „Die moderne Form Podiceps ist eine Missbildung, wie so viele andere in der Naturgeschichte, Medicin etc. Sie ist aus Missverständniss zweier Arten von Composita entstanden:

1. mit ceps, Gen. cipis (von capio nehmen)
   z. B. parti-ceps, cipis theilnehmend;
2. mit ceps, Gen. cipitis (von caput Kopf)
   z. B. triceps, cipitis (dreiköpfig).

Da nun aber einmal das unglückliche Podiceps eingebürgert ist, so muss man, wenn man einen Genitiv setzen soll, nolens volens die Form Podicipis wählen, die allerdings für Philologen ein Monstrum ist.“

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum in Hamburg

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Röder Victor Eduard von

Artikel/Article: Dipteren von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann in Ost-Afrika gesammelt. 1-4