

Dipteren

von

Herrn Dr. Fr. Stuhlmann in Ost-Afrika

gesammelt.

Von

V. v. Röder, Hoym in Anhalt.

Aus dem

Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. X. 2.

Sm Hamburg 1893.

Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern.

1. **Notacanze** (unvollständig erhalten). Quilimane 11. I. 1889.
2. **Tabanus biguttatus** Wied. 2 Ex. Quilimane, 16. II. 1889; Sansibar, 4. VI. 1888.
3. **Tabanus subelongatus** Mcq. Quilimane, 6. II. 1889; desgleichen 16. III. 1889.
4. **Haematopota** spec. Usegua, 24. VIII. 1888.
5. **Systoechus ferrugineus** Mcq. Mbusini (Usegua), 27. VIII. 1888.
6. **Microstylum acutirostre** Lw. Quilimane. 16. I. 1889.
7. **Hoplistomera serripes** Fabr. Quilimane, 16. I. 1889; desgleichen II. 1889.

Diese Exemplare sind kleiner als gewöhnlich.

8. **Laxenecera** Stuhlmanni n. spec. ♂.

Atra, nitida; antennis pedibusque concoloribus; alis hyalinis, venis dimidii anterioris brunneo-ochraceis, posterioris obscurius brunneis. Pili occipitis, tertii antennarum articuli mystacisque superioris nigri; verticis genarum, menti mystacisque inferioris pili albi; frons et primus antennarum articulus albo-pilosi, pilis nigris intermixtis; in thoracis dorso adsunt pili longiores nigri et multo breviores albidii; scutellum et abdomen nigro-pilosa in lateribus marginis postici segmentorum abdominalium singulorum albo-pilosis; foreipe anali albo-piloso; pedibus (nigris) albo-pilosis. — Long. 17 millim.

Patria: Africa, Quilimane. 2 Ex. 18. I. 1889. et 15. II. 1889. von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann entdeckt und von mir zur Ehre desselben nach ihm benannt.

9. **Megaspis natalensis** Mcq. = *curtus* Lw. Sansibar, 23. V. 1888.
10. **Plagiocera nigrita** Bigot = *Plagiocera haemorrhoea* Gerst. Sansibar, 26. IV. 1888.
11. **Hypoderma bovis** Deg. Cairo, 21. III. 1888.
12. **Glossina morsitans** Westw. Mbusini (Usegua), 27. VIII. 1888.
13. **Lucilia putoria** Wied. Sansibar, I. VI. 1888.
14. **Musca** spec. Quilimane, 18. I. 1889.
15. **Musca** spec. Pangani, 7. XII. 1889.
16. **Diopsis thoracica** Westw. = *longicornis* Mcq. Sansibar, VII. 1888. und 7. VIII. 1888.

17. *Ornithoica Podicipis* ¹⁾ n. spec.

Nigra; humeris, lateribus thoracis pedibusque flavis, alis dilute fuscis. Long. corp. 2½ millim., long. alar. 3 millim. Exemplaria in Sansibar lecta 29. X. 1888. (*Podicipis avis parasita*).

Ich habe das Genus *Ornithoica* Rondani in den Entomologischen Nachrichten von Dr. F. Karsch 1890, p. 311, genauer beschrieben. Das Flügelgeäder ist auch bei dieser Art, wie bei den anderen beiden Arten fast gleich. Die dritte Längsader vereinigt sich im letzten Drittel mit der Vorderrandader. Die Analzelle ist sehr deutlich. Was die Unterscheidung der 3 *Ornithoica*-Arten anbelangt, so ist die vordere Basalzelle bei *O. Beccariina* Rond. erweitert, während bei *O. Podicipis* und *Turdi* Latr. die vordere Basalzelle gleichbreit verläuft. Der Unterschied zwischen *O. Podicipis* und *Turdi* Latr. besteht in der viel längeren Vereinigung der dritten Längsader mit der Randader bei *O. Podicipis*, während diese Vereinigung bei *O. Turdi* Latr. viel kürzer ist. Die hintere Basalzelle ist etwas kürzer als die vordere bei *O. Podicipis*; bei *O. Turdi* sind beide Basalzellen fast gleich lang.

Cellula basalis prima alarum dilatata.

Ornithoica Beccariina Rond.

Cellula basalis prima alarum acquilata. — 1.

1. Vena tertia longitudinalis alarum longe conjungens cum margine anteriore. — *O. Podicipis* n. spec.

Vena tertia longitudinalis alarum breviter conjungens cum margine anteriore. — *O. Turdi* Latr.

¹⁾ Aus einer mir zur Verfügung gestellten, durch den vorliegenden Fall veranlassten, eingehenden fachmännischen Erörterung über den Namen *Podiceps* und seine Genitivbildung gebe ich hier folgende Sätze wieder: „Die moderne Form *Podiceps* ist eine Missbildung, wie so viele andere in der Naturgeschichte, Medicin etc. Sie ist aus Missverständniß zweier Arten von *Composita* entstanden:

1. mit *ceps*, Gen. *cipis* (von *capio* nehmen)
z. B. *parti-ceps*, *cipis* theilnehmend;
2. mit *ceps*, Gen. *cipitis* (von *caput* Kopf)
z. B. *triceps*, *cipitis* (dreiköpfig).

Da nun aber einmal das unglückliche *Podiceps* eingebürgert ist, so muss man, wenn man einen Genitiv setzen soll, nolens volens die Form *Podicipis* wählen, die allerdings für Philologen ein Monstrum ist.“

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum in Hamburg](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Röder Victor Eduard von

Artikel/Article: [Dipteren von Herrn Dr. Fr. Stuhlmann in Ost-Afrika gesammelt. 1-4](#)