

# Staphylinides de Java,

recueillis par M. le Dr. **K. Kraepelin**

et M. le Dr. **Koningsberger** en 1904.

Par

**Albert Faurel**, Caen.



La faune des régions basses et moyennes dans l'île de Java n'offre pas de caractère spécial, en ce qui concerne les Staphylinides. C'est, d'une manière générale, la même faune que celle des régions semblables en Birmanie, à Sumatra etc. jusqu'à Celebes. J'ai noté d'ailleurs, pour chacune des espèces recueillies par M. le Dr. KRAEPELIN et par M. le Dr. KONINGSBERGER<sup>1)</sup> l'extension géographique déjà connue. Quelques espèces seulement n'ont été trouvées encore qu'à Java; mais il est très probable quelles seront signalées plus tard des autres régions de la faune indo-malaise.

### Piestini.

1. *Leptochirus unicolor* LAP. (*L. coronatus* SACHSE).

Tjibodas, mars.

Sumatra, îles Banguey, Mentawai, Bodjo, Borneo, Malacca, Cambodge.

2. *Leptochirus minutus* LAP. (*L. bispinus* ER., *L. borneensis* BERNH.).

Buitenzorg, Borobudur, mars.

Région orientale, du Sikkim à la Malaisie. — Gilolo, Nouvelle-Guinée.

3. *Leptochirus (Thoracochirus) piestoïdes* FVL., var.  
*L. cribrellus* n. v.

A. *Leptochiro piestoïde* FVL. typico (Sumatrensi) thoracis punctura ocellata duplo densiore, hujus lateribus magis crenulatis; elytris etiam fortius rugosulis, rugis extus asperulis, lateribus magis crenulatis unice distinctus.

Buitenzorg, Jardin botanique, février—mars.

Obs. 1. — Dans ma description du *L. piestoïdes* (Rev. d'Ent., 1902, 20), au lieu de: fronte lata excavata, il faut lire: fronte late excavata. J'ajoute que plus récemment j'ai reçu deux autres exemplaires du type, provenant de la région de Deli (Sumatra), dont un à les elytres légèrement râpeuses en dehors et légèrement crênelées sur le bord externe;

<sup>1)</sup> Les espèces citées du Jardin botanique de Buitenzorg ont été remises à M. le Dr. KRAEPELIN par M. le Dr. KONINGSBERGER.

le corselet offre aussi deux ou trois crénélures latérales. Cet exemplaire indique assez bien le passage à la var. *L. cribrellus* de Java.

Obs. 2. — Le *Leptochirus (Thoracochirus) Foersteri* BERNH. (Deutsche Ent. Zeitschr., 1903, 156), de Sumatra, paraît synonyme du *L. piestoides* d'après la description, bien que l'auteur indique les pénultièmes articles des antennes comme très fortement transverses (sehr stark quer). Mais cette indication doit être fausse; au moins elle est contredite formellement par le tableau, où le *L. Foersteri* figure parmi les espèces où ces articles sont non ou à peine transverses.

#### 4. *Holosus tachyporiformis* MOTS.

Tjibodas, mars.

Lombok, Sumatra, Borneo, Malacca, Birmanie.

#### 5. *Lispinus coriaceus* FVL. (*L. curticollis* BERNH.).

Buitenzorg, février—mars.

Malacca, Pulo-Pénang, Tenasserim, Birmanie, Tonkin.

#### 6. *Lispinus specularis* (FVL.) BERNH.

Buitenzorg, février—mars.

Sumatra, île Nias, Singapore.

#### 7. *Eleusis Kraatzi* FVL. (*E. apicipennis* KR. non FAIRM.).

Buitenzorg, Jardin botanique.

Celebes, Lombok, îles Engano, Nias, Sumatra, Chine méridionale, Ceylan. — Ile Woodlark.

### Oxytelini.

#### 8. *Trogophloeus (Thinodromus) arciteneus* n. sp.

Minutus, brevis, latinsculus, subdepressus, subopacus, abdomine nitidulo, antice glaber, elytris abdomenque subtilissime sat dense griseo-pubescentibus, squalide rufo-ferruginens, thorace paulo dilutiore, palpis, antennarum articulis 2 primis pedibusque rufo-testaceis. Antennae graciles, capite thoraceque paulo longiores, articulis 3—6 inter se aequalibus, haud transversis, 7<sup>o</sup> paulo crassiore et longiore, 8<sup>o</sup> adhuc latiore, transverso, 9—10 paulo latioribus, minus transversis, 11<sup>o</sup> longiore, pyriformi. Caput breve, transversum, quasi alutaceum, fronte biimpressa, oculis sat magnis, genis post hos sat longis, parallelis, angulis posticis rotundatis. Thorax capite tertia parte latior, brevis, transversus, hexagonalis, quasi alutaceus, lateribus ante medium angulatis, antice et postice fortiter angustatis, angulis anticis rotundatis, posticis obtusis, disci impressione media antice circumflexa, impressione alia basali arcuata, utrinque anterius producta ibique quasi bifurcata. Elytra thorace tertia parte latiora, quadrata, dense subtilissime punctulata. Abdomen obsoletissime punctatum. — Long. 2 mm.

Buitenzorg, février—mars.

Je ne connais rien d'analogie à cette espèce, qui se place à la fin du groupe des *Thinodromus*.

9. ***Trogophloeus foreicollis*** KR.

Buitenzorg, février—mars.

Sumatra, Cochinchine, Birmanie, Ceylan. — Nouvelle-Guinée.

10. ***Oxytelopsis pseudopsina*** FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique, février—mars.

Sumatra, Borneo, Malacca, Birmanie.

11. ***Oxytelus megaceros*** FVL.

Buitenzorg, février—mars.

Sumatra, Malacca, Birmanie.

12. ***Oxytelus tenuicornis*** FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

13. ***Oxytelus uncifer*** FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

14. ***Oxytelus pulcher*** KR.

Tjompea, mars; Buitenzorg, Jardin botanique, février—mars.

Sumbawa, Sumatra, Birmanie.

15. ***Oxytelus occipitalis*** FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

16. ***Oxytelus Raffrayi*** FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Singapore.

17. ***Oxytelus thoracicus*** MOTS. (*O. testaceus* MOTS. — *O. celebensis* FVL.)

Buitenzorg, Jardin botanique.

Celebes, Sumatra, Borneo, Philippines, Siam, Birmanie.

18. ***Oxytelus extensicornis*** n. sp.

♂. In vicinitate *Ox. exasperati* KR. collocandus, licet totus alius.

Dimidio minor, etiam angustior, corpore antico opaco, abdomine nitido, niger, antennarum basi, tuberculis antennariis et aliquando elytris plus minusve rufulis, palpis pedibusque testaceis. Antennae praelongae, robustae, articulis penultimis duplo longioribus quam latioribus, 11° permagno, triplo fere longiore quam latiore. Caput breviter ovatum, subtilissime strigellum, medio longitudinaliter impressum ibique alutaceum, vertice medio longe sulcatulo, oculis minutis, genis post hos parum ampliatis, angulis posticis omnino rotundatis. Thorax capitis latitudine, antice vix tertia parte latior quam longior, subsemilunaris, subasperato-strigellus, sulco longitudinali medio tenui, duobus externis sat obsoletis, a basi versus apicem oblique convergentibus, antice deletis, disco utrinque obsolete licet late

transversim impresso. Elytra fortiter transversa, thorace fere breviora, vix subtilius strigella. Abdomen impunctatum, segmento 7<sup>o</sup> ventrali apice late vix emarginato. ♀. Capite minore, oculis paulo majoribus distincta.

— Long. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm.

Buitenzorg, Jardin botanique.

19. *Oxytelus bigemmatus* n. sp.

♂. In vicinitate praecedentis, licet omnino diversus. Fere dimidio minor, corpore antico opaco, abdomine nitido, nigro-piceus, tuberculis antennariis antennarumque articulis 4 primis dilutioribus, ore pedibusque testaceis. Antennae breves, robustae, claviformes, articulo 3<sup>o</sup> minuto, pyramidali, 4<sup>o</sup> adhuc minore, fortiter transverso, 5—10 sensim latioribus, transversis, 11<sup>o</sup> magno, conico, tribus praecedentibus longitudine aequali. Caput transversim orbiculatum, sat convexum, omnium subtilissime creber-rinne strigellum, medio longitudinaliter parum depresso ibique alutaceum, callis duobus nitidulis medio disco approximatis, oculis mediocribus, genis post hos parallelis, angulis posticis omnino rotundatis. Thorax capite paulo angustior, subsemilunaris, tertia fere parte latior quam longior, capite paulo fortius strigellus, trisulcatus, sulco medio antice dilatato, duobus lateralibus arcuatis, antice interruptis. Elytra thorace parum latiora et longiora, fere quadrata, subsimiliter strigella. Abdomen parce vix perspicue punctulatum, segmento 7<sup>o</sup> ventrali apice late parum emarginato. ♀. Capite minore, oculis sat majoribus distincta. — Long. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> mm.

Buitenzorg, Jardin botanique.

20. *Oxytelus glareosus* WOLL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

La Réunion, Maurice. — Antilles. — Canaries, Madère.

21. *Oxytelus longicornis* n. sp.

*Ox. glareoso* WOLL. proximus, paulo minor, praesertim gracilior, antennarum structura praecipue distinctus. Similiter coloratus, sed capite rufulo, parum infuscato. Antennae longiores, paulo graciliores, articulis 3—10 paulo longioribus quam latioribus. Caput angustius, praesertim antice latius impressum, oculis paulo majoribus. Thorax angustior, magis trapeziformis, subtilius asperulus, sulcis tribus profundioribus. Elytra paulo subtilius asperata. Abdomen subtilius punctulatum. — Long. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> mm.

Sexns differentia latet.

Buitenzorg, février—mars.

22. *Platystethus crassicornis* MOTS.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra, Birmanie, Hindoustan.

23. *Osorius frontalis* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra.

24. *Paragonus heterocerus* FVL.

Buitenzorg, février—mars.

Sumatra.

25. *Paragonus acuticollis* FVL.

Buitenzorg, février—mars.

Sumatra, Penang.

## Stenini.

26. *Edaphus cribricollis* SCHAUF.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra, Celebes.

27. *Edaphus densatus* n. sp.

*Ed. cribricollis* SCHAUF. vicinus, sed angustior, rufo-testaceus, elytris praeter basin abdomineque praeter apicem fuscescentibus; antennarum clava biarticulata paulo crassiore; capite angustiore, punctis aliquot subtilissimis notato; thorace subtilius duplo fere densius punctato, foveis basalibus externis obsoletis; elytris omnium subtilissime vix perspicue sat dense punctulatis distinguendus. — Long.  $1\frac{1}{4}$  mm.

Tjibodas, mars.

28. *Edaphus dentiventris* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

29. *Stenus bispinus* MOTS.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra, Annam, Birmanie, Hindoustan.

## Paederini.

30. *Stilicopsis breviceps* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Borneo.

31. *Medon chinensis* BOH. (*M. dimidiatus* MOTS. — *M. specabilis* KR. — *M. obliquus* WALKER).

Buitenzorg, Jardin botanique.

Région orientale jusqu'à Celebes.

32. *Medon auripilis* FVL.

Tjompea, guano de caverne, mars.

Borneo, Birmanie.

33. *Medon vittis* KR.

Tjompea, guano de caverne, mars.

Région orientale jusqu'à Celebes. — La Réunion, Madagascar. — Guadeloupe, Brésil, Pérou. — Iles Hawaï. — Canaries, Madère.

34. *Medon ochraceus* GRAV. (*M. brunneiceps* FAIRM. — *M. nigriceps* KR. — *M. fastidiosus* FAIRM. — *M. parviceps* SHARP.)

Buitenzorg, Jardin botanique.

Cosmopolite.

35. *Medon latecinctus* FVL.

Tjibodas, mars.

Tenasserim.

36. *Medon nanus* FVL.

Buitenzorg, détritus de fougères, février—mars.

Borneo.

37. *Medon praecustus* FVL.

Buitenzorg, détritus de fougères, février—mars.

Birmanie.

38. *Scopaeus nitidulus* MOTS. (*S. subfasciatus* KR.)

Buitenzorg, février—mars.

Sumatra, Borneo, Philippines, Siam, Birmanie.

39. *Paederus Kraepelini* n. sp.

Apterus, angustus, subparallelus, convexus, nitidulus, parce, fusco-pubescent, capite, thorace scutelloque opacis, omnino alutaceis, niger, elytris coeruleis, palpis antennisque testaceis, his medio rufulis, mandibulis pedibusque plus minusve piceis vel squalide rufo-piceis. Antennae capitis thoracisque longitudine, articulo 2° 3° dimidio breviore, sequentibus inter se fere longitudine aequalibus, 11° acuminato. Caput ovatum, parce subtiliter punctatum, antice quasi bifovealatum, fronte antice nitidula, parum biimpressa, oculis mediocribus, genis post hos oblique parum arcuatim angustatis. Thorax ovatus, capitis latitudine, fere tertia parte longior quam laticius, sicut caput punctatus, spatio medio longitudinali angusto impunctato, leviter sulcato. Scutellum impunctatum. Elytra thorace angustiora, quarta parte breviora, paulo fortius punctata, parum obconica, punctis oblique hinc inde striolis connexis. Abdomen subtiliter parce punctatum. ♂. Segmento 7° ventrali profunde inciso, incisura basi parum obtusa. — Long. 10 mm.

Tjibodas, mars.

Je me fais un devoir de dédier cette jolie espèce à M. le Dr. KRAEPELIN, en reconnaissance de ses très importantes communications.

### Staphylinini.

40. *Leptacinus gracilis* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Birmanie, Hindoustan.

41. *Leptacinus cibricollis* n. sp.

Species capite parvo, basi truncato, antennis robustis, brevissimis, oculis magnis puncturaque praecipue distincta. Gracilis, parce longius fulvo-pilosellus, nigro-piceus, capite nigritudo, fronte antica, ore, antennis, segmentorum marginibus apicalibus anoque aurantiaco-testaceis, elytrorum basi squalide rufescente. Antennae capite paulo longiores, crassae, clavatae, articulo 3° sat transverso, 4—10 gradatim latioribus, 11° breviter conico. Caput sat dense subtiliter punctatum, spatio medio longitudinali laevi, genis post oculos fere parallelis, basi truncata, licet angulis posticis rotundatis. Thorax capite angustior, tertia parte longior quam latior, parallelus, antice tantum fortiter attenuatus, collo tenuissimo, sicut caput punctatus, spatio medio longitudinali simili. Elytra thorace plus quam tertia parte latiora, haud breviora, parce subtilissime punctulata. Abdomen vage vix perspicue punctulatum. — Long. 3 $\frac{1}{4}$  mm.

Buitenzorg, février—mars.

42. *Xantholinus anachoreta* ER. (*X. hongkongensis* REDT.).

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra, Birmanie, Annam, Tonkin, Chine méridionale, Inde, Ceylan.

— Maurice, La Réunion, Madagascar.

43. *Staphylinus marmorellus* FVL.

Buitenzorg, février—mars.

Sumatra, Birmanie, Mts. Khasia, Tonkin.

44. *Actobius flavicornis* FVL.

Tjibodas, mars.

Birmanie.

45. *Philonthus crassicornis* FVL.

Buitenzorg, février—mars.

Lombok, Sumatra, Singapore, Tenasserim, Birmanie, Tonkin, Ceylan.

— Maurice, La Réunion.

46. *Philonthus gemellus* KR.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Inde méridionale, Ceylan.

47. *Philonthus idiocerus* KR.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Celebes, Sumatra, Cochinchine, Birmanie, Annam, Inde méridionale, Ceylan.

48. *Philonthus thermarum* AUBÉ (*P. angustatus* KR. —

*P. pygmaeus* KR. — *P. fusco-laterus* MOTS. — *P. inclinans* WALKER.

— *P. sulcifrons* SHARP).

Buitenzorg, Jardin botanique.

Cosmopolite.

49. *Anchocerus birmanus* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Tenasserim, Birmanie.

50. *Tanygnathus terminalis* ER. (*T. pictus* MOTS. — *T. ruficollis* KR. — *T. variicornis* WOLL.).

Tjompea, mars.

Subcosmopolite. (Manque dans le Nouveau-Monde).

## Tachyporini.

51. *Tachinomorphus fulvipes* ER. et var. *T. niger* FVL.

Buitenzorg, février—mars.

Indo-Chine et Malaisie jusqu'à Lombok.

52. *Erchomus planus* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra, Birmanie, Tonkin.

53. *Erchomus minimus* MOTS. (*E. tantillus* MOTS. — *E. granulum* MOTS. — *E. rubiginosus* MOTS. — *E. pygmaeus* KR. — *E. orientalis* SOLSKY.).

Région orientale jusqu'à Celebes. Séchelles. — La Réunion.

## Aleocharini.

54. *Atheta dilutipennis* MOTS. (*A. mucronata* KR. — *A. putrescens* WOLL. — *A. subputrescens* WOLL. — *A. destituta* WATERH.).

Buitenzorg, Jardin botanique.

Régions chaudes de l'Ancien-Monde.

55. *Atheta (Amischa) lineola* KR. (*A. exigua* KR.).

Buitenzorg, Jardin botanique, février—mars.

Borneo, Birmanie, Ceylan.

56. *Atheta (Amischa) virgula* n. sp.

*A. lineola* KR. vicina, adhuc minor et angustior, sat nitida, subparallela, rufula, capite, elytris abdominisque segmento 5° piceis, abdomine caeterum, ore, antennis pedibusque testaceis. Antennae adhuc breviores, articulis 4—10 etiam magis transversis, 11° breviter obconico. Caput breviter ovatum, convexum, aequale, fere haud perspicue punctulatum, quasi alutaceum licet nitidum. Thorax capite paulo latior, fortiter transversus, undique fortiter-rotundatus, aequalis, sat convexus, omnium subtilissime dense punctulatus. Elytra thorace paulo longiora, sat transversa, creberrime subtilissime punctulata. Abdomen paulo fortius et parcus punctulatum, punctis apice tantum sat dispersis. — Long. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> mm.

Buitenzorg, détritus de fougères, février—mars.

57. *Amaurodera Kraepelini* n. sp.

*A. veluticollis* MOTS. affinis, sed antennarum structura sicut colore praecipue distinguenda. Ferruginea, elytris praeter basin fuscis, antennarum articulis 3—8 abdominisque segmentis 3—5 6° que praeter apicem piceis, antennarum articulis 1—2 et 8—10, palpis, abdominis basi, ano pedibusque testaceis. Antennae quam in *A. veluticollis* crassiores et multo breviores, articulis omnibus, praesertim penultimis, tertia parte brevioribus, 1° etiam crassiore. Caput brevius et paulo latius, minus nitidum, oculis paulo majoribus. Thorax similiter opacus et rugellus, sed postice minus fortiter strangulatus. Elytra minus nitida, subtilius punctulata, adhuc breviora. Abdomen segmentis 2—3 paulo densius punctulatis. ♂. Segmento 7° dorsali apice truncato ibique crenulis 8 armato, externis 2 minoribus. — Long. 4 mm.

Tjompea, mars.

58. *Eustenia aspera* FVL.

Tjibodas, mars.

59. *Eustenia opacicollis* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Birmanie.

60. *Zyras compressicornis* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra, Borneo, Chine méridionale.

61. *Zyras sulcicollis* n. sp.

♂. *Z. Indorum* FVL. vicinus, sed angustior, minus nitidus, rufus, capite abdomeque parum infuscatis. Antennae breviores, articulo 4° sat fortiter transverso, sequentibus fortius transversis, 11° crassiore, conico. Caput magis opacum, multo subtilius obsolete punctulatum, oculis convexioribus. Thorax angustior, paulo subtilius punctatus, sulco medio longitudinali profundiore, crebrius punctato. Elytra vix subtilius punctata. Abdomen minus nitidum, segmentis 5—6 opaculis; 3° margine apicali 4-angulato, angulis parum acutis, spatio inter angulos 2 medios parum emarginato; 6° medio ante apicem lamella opaca obtuse triangulari armato, hac extus serie transversa punctorum aliquot asperulorum notata; 7° utrinque sat dense fortiter asperato, apice crenulis 6 armato. ♀. Capite nitidulo; abdome simplici, nitido, in fundo crebre subtilissime punctulato, segmento 3° transversim triseriatim asperulo; 4° et 5° etiam transversim biseriatim asperulisi; 6° uniseriatim ante apicem asperulo, punctis aliquot aliis ante seriem asperatis; 7° utrinque sat dense asperato, apice multicrenulato. — Long. 9 $\frac{1}{2}$  mm.

Buitenzorg, février—mars.

62. *Diestota testacea* KR. (♀ *Mayeti* REY).

Buitenzorg, Jardin botanique.

Lombok, Sumatra, île Nias, Birmanie. — France méridionale (importé).

63. *Silusa (Stenus) leptocera* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique; Tjibodas, mars.

64. *Homalota tuberculicollis* KR.

Tjibodas, mars; Buitenzorg, Jardin botanique.

Borneo, Ceylan.

65. *Homalota nigrescens* FVL.

Buitenzorg, Jardin botanique.

Sumatra, île Nias.

66. *Homalota variiventris* KR. (*H. pectinalis* FVL.).

Buitenzorg, février—mars.

Île Nias, Ceylan. — Ternate, Nouvelle-Guinée. — Maurice.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum in Hamburg](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Fauvel Charles Adolphe Albert

Artikel/Article: [Staphylinides de Jaca, recueillis par M. le Dr. K. Kraepelin et M. le Dr. Koningsberger an 1904 75-86](#)