

Nachtrag zu den Großschmetterlingen

von Dr. A. Gramann in Elgg und H. Ziegler-Reinacher in Aadorf.

Die seit der Publikation des ersten Verzeichnisses in Heft 18 dieser Mitteilungen im Gebiet neu entdeckten Arten und Formen, sowie die neuen Fundorte seltener Arten sind durch *Kursivschrift* hervorgehoben.

1. Fam. **Papilionidæ.**

Papilio L.

Machaon L. ab. *Bimaculatus* Gram. 1 Stück in Elgg.

3. Fam. **Nymphalidæ.**

Melitæa F.

Aurinia Rott var. *Dubia* Krul in Elgg.

Phoebe Knoch. *Elgg.*

Athalia Rott ab. *Navarina* Selys in Aadorf.

Dictynna Esp. ab. *albida* Scala in Elgg.

Argynnis F.

Selene Schiff ab. *Selenita* Frr., unter der zweiten Generation vorkommend, in Elgg.

Euphrosyne L. *Varietät*: Auf dem Vorderflügel symmetrisch je zwei helle Flecken, auf dem linken Hinterflügel ein heller Fleck, auf dem rechten nur die Andeutung eines solchen. Aadorf.

Paphia L. ab. *Valesina* Esp. *Elgg.*

Erebia Dal.

Medusa F. ab. *mantoides* Gramann. Elgg.

ab. *dilucescens* Gramann. Elgg.

ab. *pherusa* Schultz. Elgg.

ab. *procopiani* Horm. Elgg.

Satyrus Latr.

Dryas Sc. var. *Tripunctatus* Nbgr. *Elgg.*

5. Fam. **Lycænidae.****Lycæna** F.

Semiargus Rott. ab. *Caeca* Fuchs. Elgg.

6. Fam. **Hesperidae.****Carcharodus** Hb.

Alceae Esp. *Elgg.*

Hesperia Latr.

Serratulae Rbr. Elgg.

8. Fam. **Notodontidae.****Drymonia** Hb.

Querna F. Elgg. Im Mai an Bogenlampe. — Eiche.

Dodonea Hb. *Elgg.*

Notodonta O.

Trepida Esp. Mehrmals in Elgg. — Eiche.

Lophopteryx Steph.

Carmelita Esp. Elgg. — Birke.

11. Fam. **Lasiocampidae.****Selenephora** Rbr.

Lunigera Esp. var. *Lobulina* Esp. Elgg. — Nadelholz.

17. Fam. **Noctuidae.**α. **Acronyctinae.****Panthea** Hb.

Coenobita Esp. *Elgg.*

Trichosea Grote.

Ludifica L. *Erste Generation im Mai zahlreich.* Elgg.

β. **Trifinae.****Agrotis** O.

Punicea Hb. Elgg. — Brombeer, Himbeer, Löwenzahn.

Primulae Esp. var. *Conflua* Tr. Elgg.

Birivia Hüb. Ein Stück im August in *Elgg*.

Trux Hb. ab. *olivina* Stdgr.? *Elgg*.

Cinerea Hb. Aadorf, *Elgg* (am Tage an Blüten schwärmend). —
Graswurzeln, Ampfer.

Miana Steph.

Ophiogramma Esp. *Elgg*.

Bicoloria Vill. var. *vinctuncula* Hb. *Elgg*.

Apamea Tr.

Testacea Hb. *Elgg*. — Gras.

Hadena Schr.

Monoglypha Hfn. var. *Infuscata* White. *Elgg*.

Gemina Hb. *Elgg*. — Gras, niedere Pflanzen.

Sublustris Esp. *Elgg*.

Brachionycha Hüb.

Nubeculosa Esp. *Elgg*. — Ulme, Birke, Weißbuche.

Hydrœcia Gn.

Nictitans Bkh. ab. *Erythrostigma* Hw. *Elgg*.

ab *Lucens* Frr. *Elgg*.

Leucania Hb.

Impudens Hb. Zwei Stück in *Elgg*. — Sumpfgräser.

Lythargyrica Esp. var. *Argyrites* Rbr. *Elgg*.

Rusina B.

Umbratica Goeze. *Elgg*. — Gänsedistel, Ferkelkraut.

Amphipyra O.

Pyramidea L. ab. *virgata* Tutt. *Elgg*.

Tæniocampa Gn.

Gothica L. ab. *Pallida* Tutt. *Elgg*.

ab. *Brunnea* Tutt. *Elgg*.

Stabilis View. ab. *Suffusa* Tutt. *Elgg*.

ab. *Grisea* Spul. *Elgg*.

Incerta Hfn. ab. *Pallida* Lampa. *Elgg*.

ab. *Fuscata* Hw. *Elgg*.

ab. *Atra* Tutt. *Elgg*.

Gracilis F. ab. *Pallida* Stt. *Elgg*.

ab. *Brunnea* Tutt. *Elgg*.

Munda Esp. ab. *Pallida*. Tutt. Elgg.
 ab. *Rufa* Tutt. Elgg.
 ab. *Geminata* Hw. Elgg.
 ab. *Vittata* Spul. Elgg.

Calymnia Hb.

Trapezina E. ab. *Grisea* Tutt. Elgg.
 ab. *Ochrea* Tutt. Elgg.
 ab. *Rufa* Tutt. Elgg.
 ab. *Radiofasciata* Teich. Elgg.

Plastenis B.

Subtusa F. Elgg. — Pappel, Weide.

Orthosia O.

Pistacina F. ab. *Serina* Esp. Elgg.
 ab. *Rubetra* Esp. Elgg.
 ab. *Canaria* Esp. Elgg.
 Nitida F. ab. *Obscurata* Spul. Elgg.

Xanthia O.

Fulvago L. ab. *Flavescens* Esp. Elgg.

Orrhodia Hb.

Vaccini L. ab. *Canescens* Esp. Elgg.
 ab. *Glabroides* Fuchs. Elgg.
 Rubiginea ab. *modesta* Obthr.

Scopelosoma Curt.

Satellitina L. ab. *Trabanta* Huene. Elgg.
 ab. *Unicolor* Schultz. Elgg.
 ab. *Brunnea* Lampa. Elgg.
 ab. *Juncta* Spul. Elgg.

Cucullia Schr.

Campanulae F. Elgg.

Heliothis O.

Dipsacea L. Elgg.

Pyrrhia Hb.

Umbra Hfn. Elgg.

Acontia Tr.

Luctuosa Hb. Elgg. — Winde, Malve.

δ. Quadrifinæ.

Plusia O.

Chrysitis L. ab. *Juncta* Tutt. „Lokalform“ Aadorf, Elgg.

Euclidia O.

Mi L. ab. *literata* Cyr. „Lokalform“ Aadorf, Elgg.

Pseudophia Gn.

Lunaris Schiff. Elgg, nachts an der Beize.

Catocala Schr.

Promissa Esp. Aadorf. — Eiche.

20. Fam. **Geometridæ.**

β. Acidaliinæ.

Acidalia Tr.

Dimidata Hfn. Elgg.

Pallidata Bkh. Elgg.

Inornata Hw. Var. *Deversaria* H.-S. Elgg. — Hauhechel, Ampfer u. dgl.

γ. Larentiinæ.

Minoa Tr.

Murinata Scop. ab. *Cineraria* B. Elgg.

Larentia Hb.

Firmata Hb. Elgg, 16. X. 09. — Föhre.

Suffumata Hb. Elgg, in zwei Generationen. — Labkraut.

Testacea Don. Aadorf (Sulzer), Elgg.

Tephroclystia Hb.

Insigniata Hb. Elgg. — Apfel, Weißdorn, Schlehe, Brombeer.

Scabiosata Bkh. Elgg. — Verschiedene Wiesenkräuter.

Phibalapteryx Steph.

Tersata Hb. ab. *Tersulata* Stdgr.

Aemulata Hb. Elgg, sonst alpin. — Waldrebe.

δ. Boarmiinæ.

Metrocampa Latr.

Margaritata L. Elgg. Zwei Generationen (VII, IX).

Ennomos Tr.

Quercinaria Hfn. ab. *Carpinaria* Hb. Elgg.
Alniaria L. Elgg. — Laubhölzer.

Selenia Hb.

Tetralunaria Hfn. ab. *Aestiva* Stdgr. Elgg.

Boarmia Tr.

Repandata L. ab. *Maculata* Stdg. Selten, Elgg.

Gnophos Tr.

Glaucinata Hb. *Elgg*, 20. VIII. 08.

Ematurga Led.

Atomaria L. var. *Obsoletaria* Stgr. Elgg.

21. Fam. **Nolidæ.****Nola** Leach.

Cicatricalis Tr. Elgg. — Flechten von Eichen und Buchen.

23. Fam. **Arctiidae.****Phragmatobia** Steph.

Fuliginosa L. ab. *Fervida* Hofm. Elgg.

Diacrisia Hb.

Sanio L. ab. *ohne schwarzes Saumband an den Hinterflügeln.*
 Elgg.

24. Fam. **Zygænidæ.****Zygæna** F.

Pilosellæ Esp. ab. *Polygalæ* Esp. Elgg. — Klee, Bibernell,
 Quendel.

var. *Pluto* O. Elgg.

Achilleæ Esp. ab. *Bellis* Hb. Elgg.

ab. *confluens* Dziurz. Elgg.

ab. *cingulata* Dziurz. Elgg.

ab. *dziurzynskii* Kirschke. Elgg.

ab. *Viciae* Hb. Elgg.

Filipendulæ L. ab. *Cytisi* Hb. Elgg.

ab. *Ochsenheimeri* Z. Elgg.

ab. *Confluens*. Elgg.

Ino Leach.

Statice L. var. *Crassicornis* Stgr. Elgg.

26. Fam. **Psychidæ.**

Scioptera Rbr.

Tabaniforme Rott. 8 Stück in Elgg. — In jungen Pappelsträuchern.

Auch Uebergang zur var. *rhingiaeformis* Hb. (Zahl der Hinterleibsringe um drei vermehrt).

27. Fam. **Sesiidæ.**

Sesia Fab.

Asiliformis Rott. Elgg.

Mit diesen 27 Arten und 67 Formen wächst die Zahl der im Thurgau nachgewiesenen Großschmetterlinge auf 870 (727 Species, 143 Varietäten und Aberrationen).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Gramann A., Ziegler-Reinacher H.

Artikel/Article: [Nachtrag zu den Großschmetterlingen 60-66](#)