

Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen.

X.*)

Besonders-Funde aus Nordböhmen.

Von I. I. Gymnasiallehrer Frau Matoušek, (Ung. Gradišch).

Herr Bezirkscommissär Dr. Jakob von Sterned (Trautenau, früher in Reichenberg) überließ mir in zuvorkommendster Weise sein Moosherbar zur Bearbeitung und Revision. Er sammelte namentlich um Reichenberg Tetschen a. E. und im Riesengebirge. Im letzten Sommer unternahm ich einen bryologischen Ausflug ins Schwarzbrunnengebirge; die Ausbeute wurde auch in diesen Beitrag aufgenommen. Außerdem fand ich in meinem großen Moosherbar und in denen meiner Freunde auch ältere Moosfunde, die — der Pietät halber — hier auch veröffentlicht werden.

Ich bemühte mich, nur solche Funde zu publicieren, welche in der äußerst zerstreuten, zahlreichen Literatur noch nicht erwähnt sind.

Alle angeführten Moose wurden natürlich revidiert. (St.) bedeutet gesammelt von Sterned, (!) gesammelt vom Verfasser, c. fr. heißt: der betreffende Fund besitzt Kapseln, Kl.-G. = Herbar des Prag-Kleinseitner Gymnasiums**).

Die systematische Ordnung und die Nomenclatur richtet sich bezüglich der Laubmoose nach R. G. Limpricht's weltberühmtem Werke: Die Laubmoose (Leipzig, Ed. Kummer), bezüglich der Lebermoose nach den wichtigsten Abhandlungen von Limpricht, Breidler und Peeg u. A. Leider fehlt uns bisher ein zusammenhängendes, neueres systematisches Werk über die Lebermoose Europas. Deshalb habe ich bei den letzteren stets die Autoren hinter den Speciesnamen angeführt. Dasselbe gilt von den Torfmoosen (Sphagnaceae).

I. Hepaticae. (Lebermoose).

Marchantia polymorpha L. Marienbad, Komotau, Eibitz, Tepl (Kl. G.)

Metzgeria conjugata Lindb. Hemmrich: Dammjäger (St.).

Gymnomitrium concinnatum (Lightf.) Corda. Große Schneegrube im Riesengebirge (St.).

*) IX. erschien in den Sitzungsberichten des „Deutschen naturw. medicin. Vereines für Böhmen 1900“ 1900. Nr. 6; VII.—VIII. erschien ebenda Nr. 1 und 4.

**) Meinem Collegen Rudolf Wägel bin ich für diese Angaben zum Danke verpflichtet,

- Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dum. ♂ und ♀ im Rannibette auf Granit bei Christiansthal (!). Neuwiese und große Schneegrube (St.)
- M. sphacelata* (Gies.) Dum. Riesengebirgskamm (St.)
- Alicularia scalaris* (Schrad) Corda. Unterhalb des Jeschken, 1000 *m*, auf Lehm (St. und !). Friedrichswald (!).
- Plagiochila asplenoides* (L.) Dum. Eidlitz bei Komotau (Reuß). Heinrichsteig bei Großpriesen, c. fr. (St.).
- Forma major* N. ab Es. Boberlehne bei Schaglar (St.). Rutenberg (Weselsky).
- Scapania nemorosa* (L.) Dum. Wittighaus (St.). Oberhalb Berzdorf (!).
- S. undulata* (L.) Dum. Wittighaus (St.).
- S. dentata* Dum. An einem Brunnen am Abhange der Theresienhöhe, 500 *m*, c. fr. (! VIII. 1900).
- Diplophyllia taxifolia* (Wahlb.) Trev. Große und kleine Schneegrube (St.).
- D. albicans* (L.) Trev. Granitklüfte der Theresienhöhe, gemein in großen Polstern, oft mit *Jungermannia minuta* (!). Neuwiese, Friedrichswald, Wittighaus, Dammjäger, Dörschälle (St.). Bei Breitenbach im Erzgebirge, auf nassen Felswänden, 750 *m*, († Prof. Willkomm im Herbar St.).
- Mylia Taylori* (Hook.) Grah. Weiße Wiese im Rieseng. (St.).
- Jungermannia ventricosa* (Dickf.). Quarzitefelsen am Abhange des Schwarzenberges im Jeschkengebirge, 800 *m* und am Fuße der Theresienhöhe bei Tannwald, mit Brutknospen (!). Große Schneegrube (St.).
- J. minuta* Granz. Häufig in Granitklüften der Theresienhöhe, 600 *m*, mitunter in Rasen von *Cynodontium polycarpum* (!).
- J. gracilis* Schleich. Ebenda, gemein (!). Zwischen *Dicranum scoparium* bei den Dörschällen im Isergebirge (St.).
- J. quinquendata* Web. Theresienhöhe, 600 *m*, in Granitklüften (!).
- J. barbata* Schreb. Ebenda (!). Sebusen und Magenstein bei Auffig (St.).
- Cephalozia divaricata* (Smith) Spruce. Soos bei Marienbad, auf Torf (Jasch 1882 im Herbar des † Prof. Lukasch).
- C. media* (Nees) Lindb. Neuwiese im Isergebirge, Überzüge auf Sumpfmossen bildend (St.). Ein seltenes Moos.
- C. curvifolia* (Dickf.) Dum. Auf faulem Holze am Annentweg beim Reichenberger Volksgarten (St.).
- Aplozia sphaeocarpa* (Hook.) Dum. Hinter dem Reichenberger Stadtwäldchen, mit *Ditrichum homomallum* c. fr. (St.).
- Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. Granitkluft am Abhange der Theresienhöhe, 610 *m* (!).
- Lophocolea minor* Nees, Abhang des Radobyl bei Leitmeritz (St.).

- L. heterophylla* (Schrad.) Dum. Annenweg beim Reichenberger Stadtwäldchen, c. fr. (St.) Im Walde unterhalb der Füllbauden im Riesengebirge, c. fr. (Chpers, als *L. bidentata* im Herbar St.).
- Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda var. *rivularis* (Schrad.) Rees. Im Schmiedebächel bei Smarow flutend (! 1900). Dessefälle im Isergebirge (St.).
- Kantia trichomanis* (L.) Gray. Dessefälle (St.). Granitklüfte der Theresienhöhe + 610 m, mit *Diploph. albicans* (!). Weckelsdorfer Felsen, auf Sandstein (Apotheker J. Paul, M.-Schönberg).
- Lepidozia reptans* (L.) Dum. Weg von der Theresienhöhe zum Muchow + 660 bei Tannwald c. fr. und auf Baumstrünken und Quarzschiefer am Abhange des Schwarzenberges im Jeschkengebirge, 800 m (!) Reitstein bei Reichenberg, Klaufengrund im Rieseng. (St.).
- Bazzania trilobata* (L.) Gray. Erzgebirge: Lauterbach bei Breitenbach, 750 m (Professor Willkomm). Auf Granit am Fuße der Theresienhöhe, 600 m (!). Massenvegetation in Fichtenwäldern oberhalb Berzdorf im Jeschkengebirge, 600 m, bildend (!).
- Ptilidium pulcherrimum* (Web) Spe. Auf Granit der Theresienhöhe, c. fr. (!). Wittighaus und Hemmrich (St.).
- P. ciliare* (L.) Spe. Sebusen (St.).

II. Musci frondosi (Laubmoose).

- Sphagnum Girgensohnii* Ruff. Neumiese, Dessefälle (St.)
- var. *stachyodes* Ruff. Wittighaus (St.)
- S. squarrosum* Pers. Schön im Reichenberger Stadtwäldchen (St.).
- S. cuspidatum* (Ehrh.) R. u. Wst. Forellenteich im Obergrund bei Letschen (St.).
- var. *submersum* Vimpr. Neumiese (! und St.).
- Andreaea petrophila*. Auf Granit der Theresienhöhe bei Tannwald, ± 600 m, gemein und in großen Polstern und dicken, abhebbaren Überzügen, auch c. fr. (!). Wittighaus, c. fr., kleine Schneegrube (St.). Rollberg bei Niemes, c. fr. († Willkomm 1895).
- Hymenostomum microstomum*. Ratschendorf bei Reichenberg, c. fr. (St.).
- Cynodontium polycarpum*. Johannisbad im Riesengebirge, Wittighaus, zwischen Rudolfsthal und Harzdorf und bei der Humboldthöhe bei Reichenberg, c. fr. (St.). Auf Granit der Theresienhöhe und der Umgebung, ± 620 m, oft mit *Webera nutans*, stets c. fr. (!). Auf Porphyr bei der Smarower Volksschule im Isergeb., ± 320 m, c. fr. (!).
- C. strumiferum*. Harzdorfer Thal bei Reichenberg, c. fr. (St.). Unterhalb der Theresienhöhe, 600 m, c. fr. (!). Auf Porphyr beim 2. Machendorfer Bahnviaduct. Am Fuße des Hammersteines, c. fr. (!) (determ. Breidler) mit voriger Art.
- Dicranella squarrosa*. Dessefälle im Iserg. und Annenweg bei Reichenberg, steril (Str.).

- D. cerviculata*. Riesengebirgskamm, c. fr. (St.).
- D. heteromalla*. Obergrund bei Letschen, auf Waldbläßen sehr schön (St.). Waldgraben oberhalb Berzdorf im Jeschkengebirge, 620 *m*, c. fr. (!).
- *var. sericea*. Laurenziberg in Prag (St.). Pöcher im Aupathale, c. fr. (St.). Bei der Theresienhöhe, c. fr., in Granitkluft, steril (!) c. fr.
- Dicranum undulatum*. Mit *Ptilidium ciliare* bei Sebuschein (St.).
- D. scoparium var. recurvatum*. Neuwiese, c. fr. (St.).
- *var. curvulum*. Fichtenwälder oberhalb Berzdorf, 630 *m*, bei Reichenberg (!).
- D. falcatum*. Steril in der kleinen Schneegrube im Rieseng. (St.).
- D. longifolium*. Jeschkengeb.: am Schwarzenberge auf Quarzit, 800 *m*, steril (!). Granit an den Abhängen der Theresienhöhe, — 600 *m*, steril (!).
- Leucobryum glaucum*. Annenweg bei Reichenberg (St.).
- Fissidens taxifolius*. Fruchttend am Laurenziberg in Prag. (E. Steidler in Brünn).
- Ceratodon purpureus*. Auf Felsblöcken am Gipfel des Rossberges bei Niemes (Willkomm). Schneegrubenbaude und Riesengebirgskamm, ± 1400 *m* (St.). Auf Quarzit beim Schwarzenberge im Jeschkeng. und auf der Mauerung der Theresienhöhe (!). Großer Winterberg, auf Sandstein. (Kl. G.)
- Ditrichum homomallum*. Begrand oberhalb Berzdorf im Jeschkeng., 600 *m*, (!). Wittighaus, Neuwiese, Reichenberger Stadtwäldchen (St.). Stets mit Kapseln.
- Didymodon rubellus*. Fuß der Mauerung auf der Theresienhöhe, c. fr. (!). Salsal bei Zaberlich, c. fr., Bahnhof zu Ketten, c. fr. (St.). Am Kalkfelsen am Piner bei Langenau, Rieseng., c. fr. (Cypris als *Ceratodon purp.*).
- *var. intermedius*. Compacte Rasen an der Hotelmauer der Schneekoppe, 1600 *m*, c. fr. (St.).
- Barbula unguiculata*. Grottau, an der Kirchenmauer, c. fr. (St.).
- Tortula subulata*. Spitzberg und Magenstein bei Großpriesen, Ratschendorf bei Reichenberg, Riesengebirgskamm (St.).
- T. ruralis*. Schwarzbrunngebiet: Fuß der Mauerung der Theresienhöhe, 623 *m*, auf Mörtel, c. fr. (!). Schneekoppe, steril (St.).
- Schistidium apocarpum*. Granit beim Reichenberger Stadtwäldchen mit *Racomitrium heterostrichum*, zwischen Weißkirchen und Ketten, Heinrichsteig bei Großpriesen (St.). Abhang der Theresienhöhe, 600 *m*, auf Granit (!). Stets fruchtend.
- Sch. confertum*. Zwischen Weißkirchen und Ketten, c. fr. (St.).
- Coscinodon cribrosus*. Reichenberg: Ratschendorf, Röchliger Straße auf Granit. Zwischen Weißkirchen und Ketten, stets fruchtend (St.).

- Grimmia pulvinata*. Hohe Wostreh, Heinrichsteig bei Großpriesen, zwischen Weißkirchen und Ketten, Sebuslein (St.). Immer mit Kapseln.
- G. commutata*. Am letztgenannten Orte fruchtend (St.).
- Dryptodon Hartmani*. Langenbruck, in Wäldern auf Granit (St.). War bisher aus der Umgebung Reichenbergs unbekannt.
- Racomitrium sudeticum*. Granit der Theresienhöhe bei Tannwald, 600 *m* (!). Weiße Wiese, Riesengebirgskamm c. fr (St.).
- R. heterostichum*. Zwischen Ketten und Weißkirchen, auch bei Sebuslein, c. fr (St.). Theresienhöhe, steril (!).
- *var alopecurum*. Koppenplan im Riesengebirge, 1400 *m*, steril (St. 1900).
- *var gracilescens*. Fruchtend am Riesgraben an der Schneefoppe (St. 1900).
- R. fasciculare*. Wittighaus, c. fr., unter dem Gipfel der Schneefoppe und in der kleinen Schneegrube, steril (St.).
- R. microcarpum*. Neuwiese, c. fr. (St.). Weg von der Theresienhöhe zum Muchow, $\pm$ 660 *m* oberhalb Swarow auf Granit steril (!). Riesengebirgskamm, c. fr. (St.).
- R. canescens*. Wittighaus und Dörschall, c. fr (St.). Harzdorferthal und bei Rudolfsthal, c. fr. (St.), Ruine Hammerstein, steril (St.).
- *var. prolixum*. Schneefoppe, steril (St.).
- *var ericoides*. Zwischen Langenbrucker Bahnhof und der Staße nach Liebenau, steril, auf feuchten Wiesen (!). Ein merkwürdiger Standort.
- R. lanuginosum*. Theresienhöhe bei Tannwald. $\pm$ 600 *m*, auf Granit (!). Große Schneegrube (St.).
- Hedwigia albicans*. Neuwiese, c. fr. (St.).
- *var. viridis*. Siegmundshöhe bei Reichenberg (St.).
- *var. leucophaea*. Eisberg bei Sebuslein, c. fr. (St.).
- Orthotrichum anomalum*. Smichow: Kopanina (Nickerl). Bahnhof zu Trautenau, Sebuslein gegen Grabischen, Weißkirchen bei Grottau (St.). Hefinsel in Prag, (Opiz 1853 im Brüger Gymn.-Herbar). Stets fruchtend
- O. affine*. Gdersbach c. fr. (St.). Auf Buchen beim Friedrichswalder Forsthaufe im Fierg., c. fr. (St.) Auf Pappeln zu Liebenau, c. fr. (St.).
- O. speciosum*. Kopainberg bei Liebenau, Jeschenabhang, c. fr. (St.). Johannisbad im Rieseng. auf Pappeln, c. fr. (St.).
- O. stramineum*. Zwischen Rudolfsthal und Harzdorf, c. fr (St.).
- Encalypta contorta*. Hemmrich (St.). Theresienhöhe, auf zerfetztem Granit bei der Mauerkrone (!). Nur steril.
- Georgia pellucida*. Umgebung der Theresienhöhe, häufig auch fruchtend; unterhalb des Jeschfengipfels, 1000 *m*, steril (!).
- Schistostega osmundacea*. In Granitklüften (mit *Heterocladium heteropterum* und *Diploph. albicans*) der Theresien-

- refienhöhe bei Tannwald, 600 m, c. fr. (! 1900). Daß „Reichtmoos“ ist um Reichenberg recht selten.
- Funaria hygrometrica*. Mauern zwischen Bodenbach und Peiperz und bei Sebusen, c. fr. (St.). Bei der Mauerkrone der Theresienhöhe, c. fr. (!). Racin bei Neuhoß, c. fr. (Pehl im Kl. G.).
- Physcomitrium pyriforme*. Rognitzer Teich bei Trautenau (St. 1900). Prag (Hofmann 1842). Immer fertil.
- Webera nutans*. Spitzberg bei Großpriesen, Sebusen, Dangenbrück, Neuwiese; Johannisbad im Riesengebirge mit sehr kurzer Seta (St.). Trockene Waldblößen bei Johannesgunst nächst Arnau (Cyper 1884 als *Leptobryum pyriforme*). Rollberg bei Niemes auf Felsblöcken (Willkomm). Auf Granit der Theresienhöhe und in der Umgebung, häufig (!). Stets c. fr.
- W. cruda*, Riesengebirgskamm, steril (St.).
- Mniobryum albicans*. Steril in der kleinen Schneeegrube (St.).
- Bryum pallens*. Wittighaus, in Gesellschaft von *Webera nutans* (St.). Die Pflanze zeigt abnorm entwickelte Urnen; die Seta trägt nicht 1, sondern 2 vollständig entwickelte, getrennte, nur mit dem Halse verwachsene Kapseln.
- B. capillare*. Spitzberg bei Priesen, c. fr. (St.).
- var. *macrocarpum* Auffig: Hohe Woftray, c. fr., (St.).
- Mnium affine*. Zwischen Ketten und Weißkirchen, steril (St.).
- M. rostratum*. Ebenda, ferner am Heinrichsteig bei Großpriesen, steril (St.).
- M. hornum*. Neuwiese, c. fr., Dammjäger bei Hemmrich (St.). Herrnskrätzchen (gegen Rainwiese), c. fr. (St.). In kleinen Löchern und Granitklüften am Abhange der Theresienhöhe, ± 600 m, in merkwürdiger Form. Rasen klein, sehr stark verfilzt, Stengel zart. In Gesellschaft von *Heterocladium heteropterum* (! 1900). Nur steril.
- M. spinosum*. Ruine Hammerstein (!).
- M. stellare* Spitzberg bei Großpriesen (St.).
- M. punctatum*. Neuwiese, c. fr., Wurzelsdorf, c. fr. (St.). Johannisbad und kleine Schneeegrube, steril (St.). Tetschen, Schlossbergfelsen, Laubeischlucht und Kolmerischeibe, c. fr. (St.). Rothenhaus bei Teplitz, c. fr. (A. Roth 1854 im Brüger Gymnasialherbar).
- Aulacomnium palustre*. Königshahn bei Trautenau, steril, (St.) Neuwiese im Jserg., steril (St.). Südböhmen: Dorf bei Buchers, steril (A. Schott).
- A. androgynum*. Mit Brutknospen bei Rothenhaus nächst Teplitz (A. Roth 1854 im Brüger Gymnasialherbar).
- B. pomiformis* Weißwassergrund im Riesengeb., c. fr. (Cyper 1883, als var. *crispa*). Franzenthal bei Tetschen, c. fr. (St.). Abhang der Theresienhöhe bei Tannwald, 600 m, in Klüften des Granites, c. fr. (!).

- *var. crispa*. Isergebirge: auf Phyllit bei der Swarower Volksschule, c. fr. (! 1900)
- B. Halleriana*. Granitklüfte der Theresienhöhe, ± 625 m, c. fr. (! 1900).
- B. lithyphylla*. Desselfälle im Isergeb., Christophsgrund, Ratschendorf, Heinrichsteig bei Großpriesen, kleine Schneeegrube (St.). Am letzten Standorte steril, sonst fruchtend
- Philonotis fontana*. Groß-Mupa II. Th., c. fr.; Reichenberger Annenweg, c. fr. und ♂ (St.).
- *var. falcata*. Riesengebirgskamm, steril (St.).
- Catharinaea undulata*. Spitzberg bei Großpriesen. (St.).
- C. tenella*. Neuwiese im Isergebirge, c. fr., (Sterned 1898).
- Oligotrichum hercynicum*. Kleine Schneeegrube, steril; Elbgrund im Riesengebirge, c. fr. (St.)
- Pogonatum urnigerum*. Weiße Wiese, Elbfall, Riesengebirgskamm; Wittighaus, Neuwiese, Reichenberger Stadtwäldchen; Boberlehne bei Schaklar; Dürrkamnitz-Schlucht bei Niedergrund nächst Lettschen (St.). Joachimsthal (J. Reuß 1846). Immer steril.
- Polytrichum gracile*. Neuwiese im Iserg., c. fr. (St.).
- P. formosum*. Riesengebirgskamm, Schlingelbaude; Reichenberg: Annenweg (St.). Raspenau (Blumrich) c. fr.
- P. piliferum*. Rudolfssthal bei Reichenberg (St.). Auf Granit bei der Theresienhöhe, ± 600 m, (!). Mit Kapselfn.
- P. juniperinum*. Oberhalb Berzdorf im Jeschkengeb., ± 600 , (!). Kalmwiese gegen Oberggrund bei Lettschen (St.). Harzdorferthal bei Reichenberg (St.). Rollberg bei Niemes (Prof Willkomm im Herbar St.). Neuhoß bei Trautenau (Mairwald). Stets mit Kapselfn.
- forma longiseta mihi.** Rasen (Stengel) nur $1-1\frac{1}{2}$ cm hoch, die Seta aber bis 9 cm lang. Bei Budweis, c. fr. (Dr. Jechl, als *Pol. gracile* Menz. im Brüxer Gymn.-Herbar).
- P. strictum*. Weiße Wiese im Riesengebirge, c. fr. (St.).
- P. commune*. Reichenberg: Annenweg, c. fr. (St.). Prager Baumgarten (alter Fund).
- Diphyscium sessile*. Hemmrich, Harzdorf und Stadtwäldchen bei Reichenberg, c. fr. (St.).
- Fontinalis antipyretica*. Bei Neuwiese in einem Sumpfe, steril (St.). Schmiedebächl bei Swarow im Isergebirge, steril (!). Südböhmen: Buchers, steril (A. Schott).
- Leucodon sciuroides*. Äste gerade (*forma stricta*). Pappeln bei Liebenau, steril (St. III. 1899). Otter im Böhmerwalde, steril (Schott 1896).
- Pterygophyllum lucens*. Böhmerwald: Spitzberg bei Eisenstein, steril (Hora 1881).
- Leskea polycarpa*. Fruchtend bei Sebusen (St.).
- Anomodon viticulosus*. Ebenba, steril (St.).

- Heterocladium heteropterum*. In Granitflüsten an den Felsen der Theresienhöhe bei Tannwald, nicht häufig; auf Contactschiefer beim Schmiedebächl nächst der Swarower Volkschule, spärlich, steril (! 1900).
- Thuidium tamariscinum*. Weißkirchen bei Grottau, steril (St.).
- T. delicatulum*. Ebenda und bei Ketten, steril (St.).
- Pylaisia polyantha*. Sebusen, hohe Wostraz, Heinrichsteig bei Großpriesen, Maßenstein (St.). An Wegböschungen zwischen Grottau und Ketten auf Steinen sehr schön fruchtend (St.). Sonst auch fertil.
- Isothecium myurum*. Annenweg bei Reichenberg, c. fr. (St.).
- Ptychodium plicatum*. Riesengeb.: Großer Kessel, 1080 m, steril (von Cypers 1890, als *Homalotheicum sericeum*).
- Brachythecium populeum*. C. fr. bei Eßersbach (St.).
- B. rutabulum*. Ebenda (St.). Laurenziberg bei Prag (Reil 1844, theilweise als *Br. velutinum* bestimmt). Stets fruchtend.
- B. rivulare*. Bei Weißkirchen nächst Grottau, c. fr. (St.). An nassem Dnaßsandstein am rechten Elbeufer in Pelsdorf, c. fr., mit fruchtendem *Amblystegium filicinum*, (Cypers im Herbar St. als *Eurhynchium strigosum*). Gemein am Schmiedebächl bei der Swarower Volkschule im Isergeb., oft auch im Wasser flutend. Nur steril. (! 1900).
- Eurhynchium striatum*. Auf faulem Holze im Gänshals bei Harta, steril (Cypers 1889 als *Hypnum purum*, im Herbar St.).
- E. praelongum*. Raspenau, steril (Blumrich im Herbar des Braunauer Gymnasiums).
- E. strigosum*. Heinrichsteig bei Großpriesen, c. fr. (St.).
- Rhynchostegium murale*. Peiperz bei Letschen; Harzdorfer Thal bei Reichenberg, c. fr. (St.).
- R. rusciforme*. Kleine Schneegrube; unter dem Radobhl, steril (St.). Im Schmiedebächel bei Swarow, häufig steril (!). In der Iser bei Ponikla und Jablonež, c. fr. (! 1888).
- Plagiothecium undulatum*. Wittighaus im Isergebirge; obere Schleufe bei Dittersbach, steril (St.). Böhmerwald: Muckenhöhe bei Hinterhäusern nächst Neuern, steril (M. Schott).
- P. denticulatum*. Maßenstein bei Großpriesen, c. fr. (St.).
- P. silvaticum*. Fertil bei Cibulka nächst Prag (Opiz, VIII. 1844 im Wiener Univ.-Herbar).
- A. filicinum*. In einer fast astlosen, straffen Form bei Raatsch nächst Trautenau, steril (St. V. 1900).
- Hypnum stellatum*. Fruchtend beim „Pezer“ im Lupathale (St.).
- H. fluitans*. Neuwiese, steril (St.).
- H. uncinatum*. Weckelsdorfer Felsen (Apoth. Paul 1889). Bei Trautenau, Riesengebirgskamm, Wurzelsdorf, Schneekoppe, Teichsen, Neuwiese im Isergeb. (St.). Fuß der Theresienhöhe bei Tannwald, auf Granit, $\pm 600\text{ m}$ (!). — Stets fruchtend.

- H. cupressiforme* var. *filiforme*. Feichteng.: Schwarzerberg, auf Quarzitschiefer im Schatten, 800 m, steril (!).
- H. Crista castrensis*. Dörfelälle, steril (St.).
- H. cordifolium*. Maydorfer Teich bei Lettschen, steril (St.).
- Acrocladium cuspidatum*. Oberes Raubachthal bei Hohenelbe auf Kalk, steril (Gyperm 1888 im Herbar St.).
- Hylocomium squarrosum* Rothenhaus bei Tepliz (A. Roth 1846?) steril Dürckamnijschlucht bei Niedergund nächst Lettschen, c. fr. (St.).
- H. loreum*. Wittighaus, steril (St.). Weckelsdorfer Felsen, steril (Jof. Paul 1889).
- H. triquetrum*. Prag, c. fr. (Buchhändler Tempisky).
- H. Schreberi*. Prag, c. fr. (Wolfner, ein alter Fund).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen aus dem Vereine der Naturfreunde in Reichenberg](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [32_1901](#)

Autor(en)/Author(s): Matouschek Franz

Artikel/Article: [Bryologisch-floristische Mittheilungen aus Böhmen 24-32](#)