

## FID Biodiversitätsforschung

### Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Durchzug von Kormoranen, *Phalacrocorax carbo* (L.), im Erzgebirge

Lange, Richard

1933

---

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

---

#### Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

*Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.*

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

**urn:nbn:de:hebis:30:4-95955**

am Myvatn erinnert, wo ich oft dem Liebeswerben dieser schönen Ente mit dem Fasanenschwanz zugeschaut habe. Die Eisenten waren dort außerordentlich lebhaftere Tiere. Die ♂♂ trieben heftig die ♀♀ und ließen dabei am Tage und auch in der Nacht ihre eigenartige Stimme hören, die man gar nicht von einer Ente erwartet. Ich notierte ein dumpfes a bis au in folgender Weise:

ā ä ä <sup>a</sup> u o.

Paul Bernhardt, Dresden

### Durchzug von Kormoranen, *Phalacrocorax carbo* (L.), im Erzgebirge

Am 8. November 1932 wurde bei Zschopau aus einer Fluggesellschaft von 9 Kormoranen 1 Stück herausgeschossen. Das Tier hat mir bei einem Chemnitzer Präparator in frischem Zustande vorgelegen. Es war nach Untersuchung der Genitalien ein ♀. Die Maße betragen: Länge von der Stirn bis an das Schwanzende 84 cm; Flügelspanne bis zur anderen 128; Flügelspanne vom Bug bis zur längsten Schwungfeder 33 cm; Länge des Schwanzes 16 cm; Länge des Laufes 6 cm; Länge der äußeren Vorderzehe ohne Krallen 10 cm; ihre Krallen 1 cm; hintere Zehe ohne Krallen 3 cm; Krallen 1,3 cm. Bei Untersuchung des Mageninhaltes fand ich nichts besonderes, keine animalischen Reste, keinen Kies, nur eine gelbgrüne, träge Flüssigkeit.

R. Lange, Chemnitz

### *Phalacrocorax carbo* (L.) in der Oberlausitz

Vom 23. bis zum 31. Okt. 1932 hielten sich in den Teichgebieten von Deutschbaselitz, Weiszig und Döbra bei Kamenz 4 Kormorane auf. Erstmals wurden sie am 23. Okt. 1932 im ablaufenden Deutschbaselitzer Großteiche unter zahlreichen Enten festgestellt. Mit tief eingesenktem Körper, senkrecht gehaltenem Halse und schräg nach oben gerichtetem Schnabel schwimmend, sehr oft tauchend und gern badend, waren sie die lebhaftesten Gestalten unter der bunten Entengesellschaft. Zwei, mit dunklem, im darauffallenden Sonnenlichte metallisch glänzendem Gefieder, waren Altvögel, während das dunkelbraune Federkleid und die helle Halsunterseite die andern beiden als Jungtiere kennzeichnete. Als Ruhe- und Schlafplatz benutzten sie mehrere sichtbar werdende Steinblöcke des alten Teichdammes. Hier saßen die beiden alten und ein junger Kormoran (der andere Jungvogel hielt sich stets abseits) oft 20—25 Minuten mit gegen den Wind zum Trocknen weit ausgebreiteten Flügeln und boten damit ein an den Lausitzer

3\*

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen](#)

Jahr/Year: 1933-35

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Lange Richard

Artikel/Article: [Durchzug von Kormoranen, \*Phalacrocorax carbo\* \(L.\), im Erzgebirge 35](#)