

FID Biodiversitätsforschung

Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen

Eine neue Beobachtung von *Motacilla flava thunbergi* Billb. in
Nordwestsachsen (27. Ber. der Planbeobachtungsgemeinschaft
Elsterstausee Leipzig)

Dathe, Heinrich

1939

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten
Identifikator:

urn:nbn:de:hebis:30:4-97576

**Eine neue Beobachtung von *Motacilla flava thunbergi*
Billb. in Nordwestsachsen**

(27. Ber. der Planbeobachtungsgemeinschaft Elsterstausee Leipzig)

Von **Heinrich Dathe**, Leipzig

Bereits 1935 stellten wir am Elsterstausee bei Leipzig einen stärkeren Durchzug der Nordischen Schafstelze fest, worüber ich seinerzeit ausführlicher berichtete¹⁾. Auch WICHTRICH²⁾ konnte dieses Auftreten bestätigen. Damals zogen vom 12.—23. 5. eine grössere Anzahl dieser Stelzen durch. Gut paßt sich die neue Beobachtung in das damals gewonnene Bild. Am 20. 5. 1939 konnte ich am gleichen Ort bei einer Führung der Volkshochschule Leipzig den Teilnehmern ein schön ausgefärbtes ♂ ad. zeigen, das sich längere Zeit auf dem Ostdamm Futter suchend aufhielt. Wenig später kamen noch etwa 5 Schafstelzen lockend von Süden heran und flogen gegen Norden weiter. Die Färbung war bei diesen Vögeln nicht auszumachen, zweifellos hat es sich aber um Durchzügler gehandelt, sodafs man bei dem vorgerückten Termin ebenfalls auf *thunbergi* schliessen könnte.

Die bisherigen Vorkommen der Nordischen Schafstelze in ganz Sachsen liegen zwischen dem 28. 4. und 23. 5.

**Der Sumpfläufer, *Limicola f. falcinellus* (Pont.),
in Zuggemeinschaft**

Von **Kurt Hoyer**, Dresden

Am 29. Mai 1939 besuchte ich gemeinsam mit den Herren HERMANN, OTTO und REICHERT (Dresden) das Zschornaer Teichgebiet nördlich Radeburg. Infolge baulicher Umgestaltung war der Großteich nicht gefüllt; sein schlammiger und steiniger Grund bot infolge der häufigen Regenfälle ein wattenähnliches Bild. Zwei Gruppen von Strandvögeln belebten ihn. Die erste bildeten 10—12 Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*), sie hielt sich mehr an den Schlammboden, die zweite, die die steinigen und quelligen Partien bevorzugte, umfasste 10 Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*), einen Bogenschnäbligen Strand-

1) DATHE, H., Der Durchzug von *Motacilla flava thunbergi* Billb. durch Sachsen. Ornith. Monatsber. 43 (1935) S. 144—146.

2) WICHTRICH, P., Ein Jahr Beobachtungen am Elsterstausee bei Leipzig als ein Beitrag zur Avifauna Nordwestsachsens. Mitt. Ver. sächs. Ornith. 4 (1933—35) S. 303.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen](#)

Jahr/Year: 1939-41

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Dathe Curt Heinrich

Artikel/Article: [Eine neue Beobachtung von *Motacilla flava thunbergi* Billb. in Nordwestsachsen \(27. Ber. der Planbeobachtungsgemeinschaft Elsterstausee Leipzig\) 82](#)