

aus Herculesbad, Dr. Maertens leg. 26. 8. 33, sind auch alle schlanker und etwas kleiner als die *variabilis*, die ich besitze.

6. *Saldula mutabilis* Reut.

1 ♂ 19. 8. 35 am sandigen Ufer eines Baches bei Oberstdorf im bayer. Allgäu mit *S. c-album* gefangen.

Rezensionen und Referate.

Die Tierwelt Mitteleuropas. Herausgeg. von P. Brohmer, P. Ehrmann, G. Ulmer. Bd. IV. Lief. 3. Quelle & Meyer, Leipzig, 1935.

Die vorliegende Lieferung behandelt als 14. Ordnung die Schnabelkerfe (Rhynchota (Hemiptera)). G. Börner (p. X, 1 bis X, 14) bespricht in der Einleitung Morphologie, Anatomie und Entwicklung und gibt einen Bestimmungsschlüssel der Unterordnungen und Hauptgruppen. H. Hedicke (p. X, 15 bis X, 113) behandelt die rund 700 Heteropteren des mitteleuropäischen Faunengebietes. Von H. Haupt (p. X, 115 bis X, 262) stammt die Bearbeitung der sehr schwierigen Gruppen der Homoptera (Cicadina, Psyllina und Aleurodina). — Mit diesem Werk ist eine seit vielen Jahrzehnten bestehende Lücke der entomologischen Bestimmungs-Literatur bestens ausgefüllt worden. Lobend hervorgehoben sei weiterhin die große Zahl der Abbildungen von H. Haupt und Walter Siefke (insgesamt sind es 560!), die durchweg vorzüglich gelungen sind und die nicht immer leichte Bestimmung auf das Beste unterstützen.

Reinig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E.V.](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Reinig William F.

Artikel/Article: [Rezensionen und Referate 48](#)