Universitaetsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main)

Eragrostis poaeoides auch in Bad Münster / von Klaus Dierssen, Bad Münster

Visual Library

Ehrendorfer, F. – 1956 – Struktur, Verbreitung und Geschichte der Sippen von Lepto-Galium in Bayern. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **31.** München.

Gauckler, K. – 1966 – Der Amethystschwingel, neu für das Regensburger, Eichstätter und Erlanger Florengebiet. — Denkschr. Regensburg. Bot. Ges. **26,** N. F. **20.** Regensburg.

Larsen, K. – 1956 – Chromosome studies in some Mediterranean and South European flowering plants. — Bot. Notiser **109.** Lund.

Machatschki-Laurich, B. – 1926 – Die Arten der Gattung Biscutella sectio Thlaspidium (MED.) DC. — Bot. Archiv **13.** Berlin.

Manton, I. – 1934 – The problem of Biscutella laevigata L. — Zeitschr. indukt. Abst. Vererbungslehre **67.** Leipzig.

— — – 1937 – The problem of Biscutella laevigata L. II. — Ann. of Botany, n. s. **1.** Oxford.

Meusel, H. – 1943 – Vergleichende Arealkunde. 2 Bde. — Berlin-Zehlendorf.

— —, Jäger, E. u. Weinert, E. – 1965 – Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. 2 Bde. — Jena.

Oberdorfer, E. – 1962 – Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland. 2. Aufl. — Stuttgart.

Rothmaler, W. – 1963 – Exkursionsflora von Deutschland, Kritischer Ergänzungsband. — Berlin.

Skalińska, M. – 1950 – Studies in chromosome numbers of Polish angiosperms. — Acta Soc. Bot. Polon. **20.** Warszawa.

Thorn, K. – 1957 – Praealpin-dealpin, Wandlungen eines Arealbegriffes. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **6/7.** Stolzenau/Weser.

Anschrift des Verfassers: cand. rer. nat. Peter Schönfelder, 86 Bamberg, Biol. Institut der Phil.-Theol. Hochschule, Jesuitenstr. 2.

Eragrostis poaeoides auch in Bad Münder

von

Klaus Dierssen, Bad Münder

1967 fand ich zwischen den Geleisen des Güterbahnhofs Bad Münder auf Schotter mit Kohlengrus mehrere Horste von *Eragrostis poaeoides*. Küsels Feststellung, daß die Wasserversorgung an den *Eragrostis*-Standorten gering sei, kann auch von diesem Vorkommen angenommen werden. Andererseits dürfte die Nährstoffversorgung infolge des Güterverkehrs hoch sein.

Die Pflanzen wuchsen am 19. 9. 1967 in folgender Gesellschaft (30 %, 1 m²):

+.2	Eragrostis poaeoides	+	Hypericum perforatum
3.2	Digitaria ischaemum	+	Anagallis arvensis
+.2	Poa annua	1 St	Plantago intermedia
+.2	Setaria viridis	+	Erigeron canadense
+	Poa compressa	+	Senecio vulgaris
+	Sagina procumbens	+	Sonchus oleraceus
+.2	Arenaria serpyllifolia	2.3	Keimlinge (indet.)
+	Medicago lupulina	2.2	Bryum argenteum

Anschrift des Verf.: Klaus Dierßen, 3252 Bad Münder, Wermuthstraße 31.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft (alte Serie)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: NF_13

Autor(en)/Author(s): Dierssen Klaus

Artikel/Article: Eragrostis poaeoides auch in Bad Münster 9