

Nartheiectalia ordo novus der *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Nordh. 1936 in den südeuropäischen Gebirgen

VON RADOMIR LAKUŠIĆ

Vergleichende Untersuchungen in der Klasse *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* in europäischen Gebirgen zeigen, dass sehr enge Beziehungen zwischen Flachmoorgesellschaften der verschiedenen südeuropäischen Gebirge bestehen. Es sind viele alte Relikte (Gattungen und gute Arten), welche genetisch bzw. floristisch und ökologisch balkanische und pyrenäische Pflanzengesellschaften verbinden und von den mitteleuropäischen und nordeuropäischen Assoziationen, Verbänden und Ordnungen gut differenzieren. Zu den charakteristischen und pflanzengeographisch besonders interessanten südeuropäischen Gattungen gehören *Nartheicum*, *Willemetia*, *Pinguicula*. Diese tertiärreliktischen Gattungen sind mit verschiedenen vikariierenden und endemischen Arten auf den südeuropäischen Silikatmassiven vertreten.

Die Ordnung *Nartheiectalia* Lakušić hat bis jetzt zwei gut differenzierte Verbände: das *Nartheicion scardici* Horv.emend.Lakušić auf der Balkanhalbinsel und das *Nartheicion ossifragi* Lakušić in den Pyrenäen.

Genetische und phylogenetische Verbindungen zwischen den südeuropäischen Verbänden

Nartheicion scardici Horv. emend. Lakušić

Nartheicion ossifragi Lakušić

<i>Nartheicum scardicum</i>	<i>N. ossifragum</i>
<i>Willemetia albanica</i>	<i>W. apargioides</i>
<i>Pinguicula balcanica</i>	<i>P. alpicola</i>
<i>Veronica balcanica</i>	<i>V. serpyllifolia</i> var.
<i>Orchis bosniaca</i>	<i>O. latifolia</i>
<i>Carex macedonica</i>	<i>C. frigida</i>
<i>Rumex balcanicus</i>	<i>R. longifolius</i>
<i>Primula deorum</i>	<i>P. integrifolia</i>
<i>Soldanella dimonieii</i>	<i>S. alpina</i> var.
<i>Eleocharis uniglumis</i>	<i>E. pauciflora</i>
<i>Caltha cornuta</i>	<i>C. minima</i>
<i>Carex flava-oederi</i>	<i>C. flava-nevadensis</i>
<i>Carex fusca-oxylepis</i>	<i>C. fusca</i> var.
<i>Cardamine pratensis-matthioli</i>	<i>C. pratensis</i> var.

Nartheicion scardici-Charakterarten, ohne entsprechende Arten im *Nartheicion ossifragi*: *Silene asterias*, *Silene albanica-rosastra*, *Gymnadenia friwaldii* var.

Nartheicion ossifragi-Charakterarten, ohne entsprechende Arten im *Nartheicion scardici*: *Selinum pyrenaicum*, *Ranunculus pyrenaicus*, *Leontodon pyrenaicus*, *Trichophorum caespitosum*, *Sedum villosum*.

Die ökologischen Bedingungen an den Standorten der *Narthecietalia*-Gesellschaften sind sehr spezifisch. Die wichtigsten ökologischen Faktoren, Feuchtigkeit und Temperaturen, variieren sehr wenig. Zum Beispiel variiert an den Standorten des *Pinguiculo-Narthecietum scardici* Lakušić 1970 die Bodentemperatur in der Vegetationsperiode in 10 cm Tiefe zwischen 8 und 20 °C und während des ganzen Jahres zwischen 3 und 20 °C.

Die *Narthecietalia*-Gesellschaften in der alpinen und subalpinen Stufe der europäischen Silikatgebirge gehören zu den ältesten Vegetationen, die sich in der Evolution konservativ verhalten. Im Diluvium war diese Vegetation nicht viel anders, weil auch die ökologischen Bedingungen an ihrem Standort sehr ähnlich waren. Ihre Standorte waren Refugien für subtropische und arctoalpine Arten, und heute leben dort *Narthecium*-, *Pinguicula*-, *Willemetia*-, *Triglochin*- und *Eleocharis*-Arten mit *Soldanella*-Arten, *Juncus arcticus*, *J. alpinus*, *Sedum villosum* usw. zusammen. Nach dem Diluvium erwiesen sich die *Narthecietalia*-Gesellschaften als Entwicklungszentren für verschiedene Gattungen, Arten und Unterarten sowie für viele Pflanzengesellschaften der alpin-hochnordischen Region. Genetische Strahlungen reichen in diesen Gegenden von den *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* über die *Salicetea herbaceae*, *Caricetea curvulae* und *Elyno-Seslerietea* bis zu den *Thlaspeetea rotundifolii* und *Asplenieta rupestris*. Die Vegetationsevolution innerhalb der *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* geht vom *Narthecion scardici* und *Narthecion ossifragi* (*Narthecietalia*) über die *Caricetalia fuscae* bis zu den *Scheuchzerietalia* und weiter zu den *Oxycocco-Sphagnetea*.

Die Klasse der *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* ist mit anderen Vegetationsklassen der alpin-hochnordischen Region durch viele Gattungen verbunden, wie *Carex*, *Juncus*, *Primula*, *Gymnadenia*, *Orchis*, *Soldanella*, *Taraxacum*, *Viola*, *Ranunculus*, *Selinum*, *Sedum*, *Leontodon*, *Rumex*, *Pinguicula*, *Veronica*, *Saxifraga*, *Parnassia*, *Potentilla*, *Cardamine*, *Trifolium*, *Nardus*, *Sphagnum*, *Polytrichum* usw. Die Evolution innerhalb dieser Gattungen geht von den *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*-Charakterarten über *Salicetea herbaceae*-, *Caricetea curvulae*-, *Elyno-Seslerietea*- bis zu den *Thlaspeetea rotundifolii*- und *Asplenieta rupestris*-Charakterarten. Die ältesten Arten der Gattung *Carex* z. B. haben in der alpin-hochnordischen Region in den *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* ihr Optimum. Jünger sind *Salicetea herbaceae*, noch jünger *Caricetea curvulae*, und am jüngsten *Thlaspeetea rotundifolii*- und *Asplenieta rupestris*-Charakterarten aus der Gattung *Carex*. Parallele Evolutionsprozesse beobachteten wir in allen anderen Gattungen mit breiter ökologischer Amplitude in der alpin-hochnordischen Region.

Arten, welche die *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* mit den *Salicetea herbaceae* verbinden, sind: *Carex frigida*, *C. foetida*, *C. nigra*, *Soldanella dimonieii*, *Soldanella alpina*, *Crepis columnae* usw.

Arten, welche die *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* mit den *Caricetea curvulae* verbinden, sind: *Carex leporina*, *C. pallescens*, *Nardus stricta*, *Potentilla erecta*, *Succisa pratensis* usw.

Es gibt keine *Carex*-Arten, welche die *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* mit den *Elyno-Seslerietea*, den *Thlaspeetea rotundifolii* und den *Asplenetea rupestris* verbinden, aber wir kennen viele *Carex*-Arten, welche die *Elyno-Seslerietea* mit den *Thlaspeetea rotundifolii* und den *Asplenetea rupestris* verbinden, wie *Carex ferruginea*, *C. mucronata*, *C. laevis*, *C. ornithopodioides*, *C. firma* usw.

Diese beiden ökologisch verschiedenen *Carex*-Gruppen sind durch *Caricetea curvulae*- und *Elyno-Seslerietea*-Arten verbunden (*Carex sempervirens*, *C. atrata* usw.).

Genetische und phylogenetische Systeme (Populationen, Arten, Gattungen, Familien usw.) verbreitern im Laufe der geologischen Zeit ihre ökologische Amplitude. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*-Charakterarten sind stenohygrisch und stenothermisch (*Carex fusca* hat eine Temperaturamplitude zwischen 0 und 20 °C), *Caricetea curvulae*-Charakterarten haben breitere Temperaturamplituden (*Carex curvula* lebt zwischen —30 und 30 °C) und die breiteste Temperaturamplitude haben *Asplenetea rupestris*-Charakterarten (*Carex laevis* var. lebt zwischen —30 und 50 °C). Phytozönotogenetische bzw. ökologische Systeme in der alpin-hochnordischen Region entwickeln sich von den *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* einerseits zu den *Oxycocco-Sphagnetea* und andererseits zu den *Salicetea herbaceae*, *Caricetea curvulae*, *Elyno-Seslerietea*, *Thlaspeetea rotundifolii* und *Asplenetea rupestris*.

Resumé

Komparativne studije vegetacije niskih cretova (*Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Nordh. 1936) na horizontalnom i vertikalnom profilu Evrope pokazale su da se na planinama južne Evrope mora izdvojiti poseban vegetacijski red *Narthebietalia*, koga karakterišu brojni tercijerni relikti, kao što su: *Narthebium scardicum*, *Narthebium ossifragum*, *Pinguicula balcanica*, *Pinguicula leptoceras*, *Primula deorum*, *Primula farinosa-denudata*, *Silene asterias*, *Gymnadenia friwaldii*, *Willemetia stipitata-albanica*, *Silene albanica-rosastra*, *Carex macedonica*, *Gentiana pyrenaica*, *Ranunculus pyrenaicus*, *Leontodon pyrenaicus*, *Selinum pyrenaicum*, *Rumex balcanicus*, *Veronica balcanica* itd.

Unutar reda *Narthebietalia* jasno se izdvajaju dvije sveze – *Narthebion scardici* Horv. emend. Lakušić 1970 i *Narthebion ossifragi* all.nova, od kojih je prva karakteristična za dinarsko-šarske planine i Rodope, a druga za Pirineje i primorske Alpe.

U referatu je takodje iznesena dobro dokumentovana hipoteza o starosti vegetacije niskih cretova i njenom značaju za evoluciju flore i vegetacije alpsko-visokonordijske regije, koja se svodi na sljedeće: Vegetacija niskih cretova je jedna od najstarijih u subalpinskom i alpinskom pojasu planina jugoistočne Evrope, te evolucija mnogih rodova i vrsta, odnosno vegetacijskih jedinica, ide od niskih cretova preko planinskih rudina do vegetacije sipara i stijena. Kao vegetacija koja se razvija na staništima sa malim variranjem osnovnih ekoloških faktora – temperature i vlage – ona je tokom diluvijuma bila stjecište kako tercijernih tako i glacijalnih relikata, te u njoj i danas zajedno žive vrste iz rodova *Narthebium*, *Pinguicula*, *Willemetia*, *Triglochin*, *Soldanella* i td.

Literatur

- BRAUN-BLANQUET, J., 1948: La végétation alpine des Pyrénées orientales. *Comm. SIGMA* 98, 306 S.
- LAKUŠIĆ, R., 1966: Vegetacija livada i pašnjaka na planini Bjelasici. *God. Biološk. inst. Sarajevo* 19, 25–186.
1970: Die Vegetation der südöstlichen Dinariden. *Vegetatio* 21, 321–373.
- NORDHAGEN, R., 1936: Versuch einer neuen Einteilung der subalpinen-alpinen Vegetation Norwegens. *Bergens Mus. Arb., naturw. R.* 7, 88 S.
- OBBERDORFER, E., 1962: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden Gebiete. 2. Aufl., Stuttgart. 987 S.

Adresse des Autors: Prof. Dr. Radomir Lakušić
Prirodno-matematički fakultet
YU-71000 Sarajevo

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Ostalpin-Dinarischen pflanzensoziologischen Arbeitsgemeinschaft](#)

Jahr/Year: 1973

Band/Volume: [13_1973](#)

Autor(en)/Author(s): Lakusic Radomir

Artikel/Article: [Narthecietalia ordo novus der Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 1936 in den südeuropäischen Gebirgen 158-161](#)