

*Asplenium Seelosii Leyb.*, Val Fonda unter überhängenden Felsen am Fuße des M. Cristallo.

*Woodsia glabella Br.*, Felsspalten des M. Cristallo bei c. 2100 m, wo auch *Aspidium rigidum Sw.* nicht selten ist.

### Eine neue Scilla Persiens.

Von C. Haussknecht.

**Scilla Persica Hskn.** — Bulbus subglobosus basi late truncatus tunicis numerosis nigrescentibus, interioribus purpurascenscentibus, intimis pallidis longitudinaliter et interrupte purpureo-striatis involutus, ad 3 cm longus latus; folia synanthia 3—4 erecto-patentia scapo longiora late linearia, 1—2 cm lata, canaliculata in apicem subobtusum angustata glaberrima ad basin scapum amplectentia et in parte subterranea longe vaginantia; scapus erectus glabriusculus, ad bulbum usque 2—3 dm longus, diametro in media parte 2—4 mm latus; racemos multiflorus confertus, primum conicus pollicaris, deinde plus quam duplo longior laxus ovoideus; pedunculi deflorati erecto-patentes, fructiferi elongati subadpressi ad  $3\frac{1}{2}$  cm longi; bractae singulæ, albae pellucidae, apice in lacinias 2 erecto-patentes setaceo-acuminatas divisæ, e basi appendicem ipsis duplo longiorem lanceo-lato-acuminatam, in utroque medio margine dente  $\pm$  manifesto auctam, scapo appressam deorsum dimittentes, eae florum infimorum 5 mm longæ, superiorum gradatim valde diminutæ; perigonii phylla laete coerulea elliptica erecto-patentia, nervo intensius colorato valido percursa, 7 : 2 mm longa lata; filamenta ab initio pallide coerulescentia, dein decolorata, phyllis subbreviora, antheræ pallide sulfureæ, in alabastro tantum lividae, stylus rectus  $4\frac{1}{2}$  mm longus; capsula (immatura) globosa undulato-plicata stylo apiculata. — Hab. in montibus supra Nehawend in ditione australi montis Elwend Persiae mediae, ubi legit 15. 5. 1895 Th. Strauß.

Aus der Gruppe der *Sc. italicæ L.*, zu welcher vorstehende Art gehört, ist im Gebiete der Flora orientalis bisher noch keine Art bekannt geworden. Von ihr, die hier allein in Frage kommt, unterscheidet sich *Sc. persica* durch die runden, größeren, schwärzlichen, innen mit purpurnen Schalen bedeckten Zwiebeln (bei *Sc. italicæ* eiförmig-länglich und mit farblosen Schalen bedeckt), ferner

durch die breiteren, den breiten, eiförmigen Blüthenstand überragenden, nicht kürzeren Blätter, durch größere, dunkel- nicht hellblaue Blüthen, durch blasse, nicht bläuliche Antheren, sowie vor allem durch die auffallende Verschiedenheit der Bracteen, die bei *Scilla italicica* zu zweien vorhanden sind und aufrecht abstehen und von denen die längere und breitere die Blüthe erreicht, während bei *Sc. persica* nur eine weit kürzere vorhanden ist, die mit einem nach unten gerichteten, dem Schafte angedrückten, doppelt längeren Fortsatze versehen ist. — *Sc. pratensis W. K.* mit ihren nur angedeuteten Bracteen kommt hier nicht in Betracht. — Da diese Art eine Bergpflanze ist, so würde sie sich für unsere Kulturen gut eignen.

---

### Eine neue Calamagrostis Persiens.

Von E. Torges und J. Bornmüller.

**Calamagrostis lalesarensis** Torges & Bornm. — *C. perennis* humilis tenera, cuius rhizoma repens subfiliforme e nodis parum distantibus fibros radicales fasciculosque culmorum et sterilium et florentium densos gignit, quo fit, ut radix cespitosa videatur esse. Culmi tenues debiles humiles, 10—12 cm, rarius ad 20 cm usque, in f. nana 5—6 cm tantum alti, erecti vel subascendentes, foliosi, foliorum vaginis obtecti excepto superiore internodii supremi parte; vaginae cum culmo laeves glabrae; ligula elongata, ad  $2\frac{1}{2}$  mm usque longa, acuta v. obtusiuscula, apice acute lacero-dentata, extus tenerrime scabridula, culmum amplectens; folia anguste linearia acuminata, culmeo medio ad 8 cm longo, sed plerumque multo breviore, supremo vaginam ipsius subaequante, tenuia nervoso-striata, in facie superiore marginibusque scabra. Panniculae vix modice multiflorae v. depauperatae subsimplicisque brevis, 1—5 cm longae, angustae contractae strictae rami setacei erecti cum pedicellis scabriuscui, inferiores terni v. bini v., ut superiores, singuli, semiverticillorum inferiorum longior quisque verticillum sequentem tantum v. internodium huic impositum attingens ad  $1\frac{1}{2}$  cm longus spiculasque paucas (raro ad 10 usque) gerens, ceteri 2—1-spiculati; pedicelli breves spiculam longitudine aequantes v.  $1\frac{1}{2}$ —2-plo superantes. Spiculae minutae. Valvae ovato-lanceolatae acutae illis speciminum macrororum *Agrostidis albae L.* similes,

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical  
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Thüringischen  
Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [NF\\_10](#)

Autor(en)/Author(s): Haussknecht Heinrich Carl [Karl]

Artikel/Article: [Eine neue Scilla Persiens. 44-45](#)