

<i>C. epigeios</i>	×	<i>lanceolata</i> [?]	=	<i>C. acrathera</i> [?],	
<i>C.</i>	—	×	<i>litorea</i>	=	<i>C. Wirtgeniana</i> ,
<i>C.</i>	—	×	<i>varia</i>	=	<i>C. bihariensis</i> ,
<i>C. litorea</i>	×	<i>varia</i>	=	<i>C. Torgesiana</i> ,	

ferner *Ammophila arenaria* × *C. epigeios* = *A. baltica*. — Zweifelhaft bleiben für mich noch, außer der *C. acrathera* Peterm., die „*Agrostis alba* × *Calamagrostis tenella* = *Agrostis Stebleri* Schröter“ (zufolge briefl. Mittheil. d. Herrn O. Appel vom 18. Febr. 1891) und „*C. phragmitoides* × *stricta*“ (C. F. Sundberg, in sched.; Publikation darüber mir nicht bekannt).

In vorstehender Anordnung sind die natürlichen Gruppen durch möglichst scharfe Merkmale voneinander unterschieden und die Reihenfolge der Abtheilungen ist der Verwandtschaft mit den benachbarten Gattungen, soweit es anging, angepasst; auch ist wohl die Aneinanderreihung der Arten, die ja bei ihrer geringen Zahl durch (z. Th. vielleicht durch Exoten ausfüllbare) Lücken getrennt sind, nach ihren Beziehungen zueinander eine durchsichtige und natürliche. So blickt *Homoeotricha* durch *C. lanceolata* nach der Gattung *Agrostis* und *C. epigeios* vermittelt auf die schon angegebene Weise den Übergang von den *Quinquenerviae* zu den *Trinerviae*, so dass nun *C. litorea* als Extrem (im Habitus und Blütenbau) der *C. tenella* gegenüber steht. Allerdings wird so *C. epigeios* mit der Gattung *Ammophila* nicht, wie es vielleicht erwünschter ist, in nächste Berührung gebracht.

Weimar, im Dezember 1898.

## Beiträge zur Flora des Herzogthums Gotha.

Von **H. Zabel.**

*Dianthus Armeria* L., trockene Feldgräben zwischen Seebergen und dem Siebleber Holze.

*Rosa pumila* L. fil., nicht selten an den Südhängen des Boxberges, anscheinend dort auch Bastarde mit Formen von *R. canina*.

*Libanotis montana* Crtz., Burgberg b. Waltershausen.

*Convallaria verticillata* L., bei Dietharz im Schmalwassergrunde zwischen Napoleonsstein und Falkenstein; sowie auch jetzt noch bei Scherers Hütte.

*Pirola uniflora* L., am Fuße des Falkensteins.

*Pinguicula vulgaris* L., Mittelwassergrund b. Dietharz.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [NF 12](#)

Autor(en)/Author(s): Zabel Hermann

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Herzogthums Gotha. 25](#)