

bürgern wird. Weisen die in der Wildnis gesammelten Exemplare bereits eine Blütenfülle von etwa 60 Glöckchen auf, welche den 12 Etagen der obersten Stengelpartie entspringen, so dürfte sich in der Kultur die Pflanze noch ganz erheblich üppiger entfalten und vervollkommen.

Weitere Beiträge zur Flora von Eisenach.

Von **A. Bliedner.**

(Vergl. Heft XIII und XIV, Seite 12 ff.)

Batrachium hederaceum Dumort., Sallmannshausen.

Berberis vulgaris L., häufig bei Creuzburg.

Barbarea arcuata Rehb., Ifta.

Dentaria bulbifera L., Annatal, finstere Schlucht, Brauertäler, Hornberg. Öhrenkammer hinter Thal.

Diploxys muralis DC., Fischbach (Kunze).

Lunaria rediviva L., Gömichenstein bei Ruhla.

Camelina dentata Pers., Leinäcker bei Neukirchen.

Parnassia palustris L., Wutha, Eckardtshausen, Attchenbach, Hötzelroda, Horschlitt. Ifta.

Polygala amara L., oberhalb des Notgrabens bei Creuzburg.

Silene dichotoma Ehrh., neuerdings häufig auf Luzerne- und Kleeäckern, so bei Großenlupnitz und Creuzburg. An ersterem Orte hat die Pflanze von den Landleuten bereits einen Spitznamen erhalten.

Sagina apetala L., Milchammer bei Eisenach, Diebskammer bei Unkerode, Baumgartental.

Alsine tenuifolia Wlubl., Göpelskuppe.

Stellaria glauca With., Alte Werra bei Neustadt, Wartha.

Cerastium brachypetalum Desportes, Schloßberg, Wartburg.

C. glutinosum Fr., beim „Junker Görg“, über der Landgrafenschlucht.

Malva moschata L., Trenkelhof, Melborn.

Hypericum pulchrum L., in der Nähe des Tunnels, häufig im Sauling bei Dankmarshausen.

Rosa pimpinellifolia DC., außer am Petersberge auch am „Gehauenen Stein“ an der Straße nach der Hohen Sonne.

R. cinnamomea L., verwildert bei Attchenbach und im Borntal hinter Stedtfeld.

- Circaea intermedia* Ehrh., Langer Graben zwischen Wilhelmstal und dem Kissel.
- Illecebrum verticillatum* L., Süß hinter Gerstungen.
- Ribes rubrum* L., unter dem Clausberg.
- Cicuta virosa* L., Insel des Hautsees, See in Frauensee, Hausbreitenbach, Dankmarshausen.
- Selinum Carvifolia* L., Frauensee, Kohlbachtal b. Gerstungen.
- Adoxa Moschatellina* L., Haintal bei Thal.
- Asperula tinctoria* L., Hohler Stein bei Thal.
- Petasites albus* Gaertn., Heldrastein.
- Inula britannica* L., Berka a. W., zwischen Dippach und Dankmarshausen.
- Pulicaria vulgaris* Gaertn., Berka a. W., Dankmarshausen.
- Rudbeckia laciniata* L., verwildert bei Horschlitt.
- Helichrysum arenarium* DC., Göpelskuppe (dürftig).
- Matricaria discoidea* DC., seit einigen Jahren massenhaft auf dem Schützenplatze in der Milchammer.
- Senecio saracenicus* L., an der Hørschel im Grabental, an der Werra bei Hørschel, Mihla.
- Arnoseris pusilla* Gaertn., Sandfelder bei Alterode.
- Lactuca Scariola* L., Hørschel, Bahnhof Gerstungen.
- Hieracium praecaltum* Vill., Kleiner Ebertsberg bei Thal, Ebenauer Wand bei Creuzburg.
- Xanthium spinosum* L., Umgebung einer Wollwäscherei in Berka a. W. Hier auch ein *Xanthium* mit buchtig-fiederspaltigen Blättern, vielleicht eine Form des vorigen.
- X. strumarium* L., ebenda.
- Phyteuma orbiculare* L., Arnslich und Brühlis b. Mosbach.
- Pirola uniflora* L., Reihersberg, Baumgarten hinter Neuenhof.
- P. chlorantha* Sw., Göpelskuppe, Buchenau.
- Menyanthes trifoliata* L., Mosbach, Rhynfelder Teiche bei Eckardts-
hausen, Bärenenteiche, Hausbreitenbach.
- Cuscuta Epithimum* L., Kieforst, Mosbach, Wolfsburg.
- Myosotis caespitosa* Schultz, Obersuhl. Forst bei Gerstungen, Hautsee.
- Nicandra physaloides* Gaertn., Karthausgarten.
- Veronica praecox* L., Äcker bei Großenlupnitz, Mihla.
- Orobanche caerulea* Vill., bei Kittelsthal auf *Achillea Millefolium*.
- Odontites lutea* Rehb., Fuß des Arnsberges.
- Galeopsis latifolia* Hoffm., Bauerhof bei Marksuhl, Abterode.
- Stachys recta* L., Eppichnellen, häufig bei Creuzburg.

- Marrubium vulgare* L., Ütteroda, Eichrodt.
- Leonurus Cardiaca* L., fast in allen Dörfern um Eisenach.
- Ajuga pyramidalis* L., Drachental bei Mosbach.
- Teucrium Scorodonia* L., zwischen Kohlberg und Mosbach.
- Trientalis europaea* L., zwischen dem Clausberg und Unterellen,
Sebichsrain bei Ettenhausen, Frauenseer Forst, Breitenberg.
- Primula elatior* × *officinalis*, in einem Graspark.
- Glaux maritima* L., Salzwiese zwischen Dippach und Dankmarshausen.
- Armeria vulgaris* Willd., Eckardtshausen. Tiefenort.
- Salix repens* L., Auenheim bei Berka a. W.,
- Hydrocharis Morsus ranae* L., Bleichlöcher bei Berka a. W., zwischen
Berka a. W. und Obersuhl, Forst bei Gerstungen.
- Elodea canadensis* Rich., unterster Hainteich, Bleichlöcher bei
Berka a. W., in der Suhl beim Baueshof bei Marksuhl, Teiche
zwischen Ringberg und Bermer bei Ruhla.
- Sagittaria sagittifolia* L., Dankmarshausen, Sallmannshausen, Dippach,
zwischen Berka a. W. und Obersuhl. Teich zwischen Marksuhl
und dem Mülmeshof.
- Orchis tridentata* Scop., Creuzburg. selten.
- Epipactis palustris* Scop., zwischen Attchenbach und Eckardtshausen
(Kunze).
- Spiranthes autumnalis* Rich., Mosbach.
- Convallaria verticillata* L., Sembachtal bei Winterstein.
- Paris quadrifolia* L., Kittelsbach, häufig im Hainich, hin und wieder
mit nur 3 Blättern.
- Juncus Tenageia* Ehrh., im Johannistal und an der Fischbacher
Brücke (Wuth).
- Cyperus fuscus* L., Dankmarshausen.
- Scirpus Tabernaemontani* Gmel., Wutha, Krauthausen (Kunze),
Berka a. W., Salzwiese zwischen Dippach und Dankmarshausen.
- Carex dioica* L., Attchenbach (Kunze).
- C. Davalliana* Sm., Bärenbach, Eckardtshausen.
- C. pulicaris* L., Bärenbach, Unkerode (Kunze), Attchenbach (Kunze).
- C. disticha* Huds., Bärenenteiche, Madelungen, vor dem Mosewalde.
- C. Schreberi* Schrk., Herrenwiese (Kunze), Struth bei Unkerode
(Kunze), Walbach bei Attchenbach (Kunze).
- C. canescens* L., Knöpfels Teiche.
- C. Öderi* Ehrh., Baumgartental.
- Panicum Crus galli* L., zuweilen auf Schutt, so in Unkerode.
- Setaria italica* P. B., selten auf Schutt, so beim Bahnhofs.

- Calamagrostis arundinacea* L. var *brachyclada*, Königshäuschen.
Avena praecox P. B., Unkerode, Gospenrode, Wolfter b. Berka a. W.
Molinia coerulea Muhl., bei der Hessenmühle (Wiesenform), Wutha,
 Unkerode, Ettenhausen, Herrenwiese, Bärenhaide bei Ruhla
 (Waldform).
Festuca silvatica Vill., Landgrafenschlucht, Finstere Schlucht, Diebes-
 kammer, Brauertäler, Clausberg, Breitenberg, Reihersberg.
Bromus inermis Leysser, Eppichnellen.
Elymus europaeus L., Hörselberg, Stedtfelder Hölzchen, Wartberge,
 Junkerholz bei Eppichnellen.
Hordeum secalinum Schreb., Forst bei Gerstungen.
Lycopodium annotinum L., Luxemburg bei Gospenroda.
L. clavatum L., Klosterholz bei Eisenach, zwischen der Mosbacher
 Linde und Rothenhof (Kunze), bei der Herrenwiese (Kunze)
 zwischen der Hohen Sonne und Atchenbach (Kunze), Ring-
 berg, Breitenberg, Frauenseer Forst, Wolfter b. Berka a. W.
Botrychium Lunaria Sw., Göpelskuppe, zuweilen mit doppelter
 Fruchtlähre.
Aspidium lobatum Sw., in einer Schlucht zwischen dem Clausberg
 und Stedtfeld.
Asplenium Ruta muraria L. var. *pseudoserpentinei* Milde, Mariental.
Blechnum Spicant Rth., Hornstein bei Mosbach, Breitenberg, Insels-
 berg, Bermer, Frauenseer Forst.
Pteris aquilina L., Schloßberg und Bärenhaide bei Thal, Molchswand
 beim Wachstein, Langer Grund zwischen Wilhelmsthal und
 dem Kissel, Baumgartental, Bermer. Öfter auch in der
f. lanuginosa Hook.

Beiträge

zur Kenntnis der thüringischen Pflanzenwelt.

Von **Wilhelm Eckardt**.

Die nachstehenden Mitteilungen verfolgen in erster Linie den Zweck, den in Rottenbachs Programm-Abhandlungen „Zur Flora Thüringens“ enthaltenen Angaben neue hinzuzufügen, andererseits aber auch interessante Funde von Seltenheiten aus der Kryptogamenflora zu berücksichtigen, für die weder Rottenbachs Beiträge noch andere Veröffentlichungen irgend welchen Anhalt bieten. Sämtliche

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [NF_18](#)

Autor(en)/Author(s): Bliedner Arno

Artikel/Article: [Weitere Beiträge zur Flora von Eisenach. 54-57](#)