

Asplenium germanicum Weiss in Felsritzen zwischen Gfth. und Gebersdorf in Gemeinschaft mit *A. septentrionale* und *A. Trichomanes* L.

Blechnum Spicant With. zahlreich auf dem Zeupelsberg an der Werraquelle, selten im Stadtwalde bei Schleusingen; im A. G. B. Gfth.: an der Teufelskanzel, bei Lichtenhain, zwischen Lehesten und Brennersgrün.

Pteris aquilina L. im A. G. B. Gfth.: auf dem Höhenwege von Sommersdorf nach der Teufelskanzel, bei Lehesten, bei Lichtenhain; zahlreich zwischen Neustadt a. Orla und Hummelshain.

Zur Weiden-Flora

Mittelthüringens, insbesondere der Gegend von Weimar.

Von **A. Kromayer**.

(Eingegangen am 9. Februar 1906).

Mehrjährige Beobachtungen der Weiden-Flora obigen Gebietes haben reiches Material erbracht.

An die etwa 18 Weiden-Arten reihen sich eine Menge Formen und Bastarde an, wodurch die Flora sich zu einer recht stattlichen, man kann sagen reichen, entwickelt hat.

Verschiedene Formen und Bastarde wurden für das Gebiet als neu aufgedeckt, so die seltene *Salix Caprea*. var. *monandra*. Soviel mir bekannt, ist diese Pflanze nur einmal, und zwar in Böhmen bei Königsgrätz gefunden worden.

Reiche Fundstellen enthält die Flora von W.¹⁾ in den Bahnausschachtungen bei Gaberndorf. Hier ist es, wo die graue Weide in mehrfachen Formen sich gütlich tut und *S. nigricans* mit *S. aurita* und *S. cinerea* in inniger Verbindung vegetieren. Die Ilmufer liefern reiches Material; auch Belvederes westlicher Gebüschrand hat interessante Weiden aufzuweisen, ebenso der Wilde Graben, Gehädrich, Dürre Bach und andere mehr. Eine hervorragende Fundstelle des Gebietes ist ferner der Heidenteich bei Osterfeld. Hier herrscht Ruhe und Friede, und die Entwicklung wird nicht gestört. Die zierliche *S. repens* grünt hier in Menge und in mehrfachen Formen, von der schmalblättrigen f. *rosmarinifolia* bis zur breitblättrigen f. *fusca* und f. *argentea*. *S. aurita* leuchtet überall mit den hellgelben

¹⁾ W. = Weimar.

Antheren hervor in zahlreichen Formen und sie hat Bastarde mit *S. repens*, *S. purpurea*, *S. cinerea* und *S. Caprea* erzeugt. Eine besondere Zierde des Heidenteiches ist ferner *S. pentandra* mas, welche durch zwei pyramidenförmige Stöcke vertreten ist, die besonders in der Blütezeit einen herrlichen Anblick gewähren. Aber auch zerstreut und einzeln liefert das Gebiet manches Interessante. Das Resultat der Beobachtungen ist in Nachfolgendem niedergelegt.

Salix fragilis L. häufig um W.:

f. *angustifolia* Kerner., Ilmufer gen Tiefurt.

— *decipiens*., untere Blätter der Ästchen verkehrt, eiförmig, stumpf, Ilmufer gen Tiefurt.

S. fragilis × *triandra* Wimm., Ilmufer bei der Pappfabrik, Bahnausschachtung bei Gaberndorf.

S. pentandra L. mas, Heidenteich bei Osterfeld, 2 Stöcke; — fem. Belvedere, westlicher Gebüschrand an der Buchfarter Straße.

S. alba L., häufig um W.:

f. *vitellina*, Ilmufer bei Tiefurt, Teich beim Gasthof zu Belvedere;

— *coerulea*, Waldrand bei Ettersburg;

— *argentea*, Dürrer Bach.

S. alba × *fragilis* Wimm. (*S. Russeliana* Koch), vielfach um W.:

f. *viridis* Fries, Ilmufer bei Tiefurt;

— *vestita*, Ilmufer bei Tiefurt;

— *glabra*, ebendort.

S. alba × *triandra* W. et Gr. (*S. undulata* Ehrh.), Kirschberg-Brücke W., Ilmufer bei Berka.

S. triandra L., Ufer, Gräben, verbreitet um W.:

f. *concolor* W. et Grab., Dürrer Bach, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, Ilmufer;

— *discolor* W. et Grab., Dürrer Bach;

— *angustifolia* Seringe, Schwansee hinter der Badeanstalt, Dürrer Bach.

S. triandra × *viminialis*

f. *Trevirani* Spr., Großheringen, Teich hinter dem Bahnhof;

— *hippophæfolia* Thuillier, Anlagen in Erfurt (Rudolf).

S. babylonica L., kultiviert, z. B. Fürstenhaus, Park, Ehringsdorf beim Rittergut;

f. *androgyna*, Belvedere.

S. daphnoides Vill., fem., Gebüsch gen Belvedere, Ehringsdorf.

S. pruinosa Wendl., mas, kultiviert, Garten der Villa Erdmann, Friedhof.

S. pulchra Wimm. et Krause (*S. daphnoides* Fries), mas, kultiviert, Friedhof.

S. purpurea L., Ufer, Gräben, häufig um W.;

f. sericea Döll, Belvedere, westlicher Gebüschrand am Teich, Ehringsdorf hinter dem Rittergute;

— *Helix* Döll, Dürrer Bach;

— *eriantha*, ebenda;

— *oppositifolia* Host, ebenda;

— *purpurea* Smith, Ilmufer am Kirschberg;

— *monadelphæ*, Saalufer bei Jena;

— *nigra pendula*, Wiesengebüsch bei der Brücke des Kammergutes Oberweimar;

— *Lambertiana* Smith, Dürrer Bach.

S. purpurea × *viminalis* (*S. rubra* Huds.), mas, einzeln, Ilmufer, besonders schön unterhalb Tiefurt gen Kromsdorf; — fem., verbreitet, Ilmufer, Gräben;

f. sericea, Wilder Graben, Ilmufer, Dürrer Bach, Ehringsdorf hinter dem Rittergute;

— *macrostigma*, Ilmufer.

S. Caprea L., häufig um W.;

f. flava, Weickelsdorf auf Kies;

— *basi attracta*, Weg von Berka nach München (Bornmüller), Wilder Graben;

— *leiocarpa*, Gebüsch gen Belvedere;

— *angustifolia* Gaud., Wilder Graben;

— *humilis* Hartm., Bahnausschachtung bei Gaberndorf;

— *monandra* Čelak., filamentis semiconnatis, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, ein Stock, selten;

— *rotundifolia* Gaud., Bahnausschachtung bei Gaberndorf;

— *volutina*, Marienhöhe;

— *androgyna*, Wilder Graben;

— *lanata* Vill., Bahnausschachtung bei Gaberndorf.

S. Caprea × *viminalis*, Ilmufer, Ausschachtung an der Weimar-Geraer Bahn;

f. denudata, Belvedere, westlicher Gebüschrand am Teiche, Marienhöhe bei Jena;

— *argentata*, Weg von Berka nach Tannroda;

- f. latifolia* Wimm., Ilmufer gen Tiefurt;
- *affinis (capraeiformis Gren. et Godr.)*;
- *angustifolia*, Tannroda, Gaberndorf;
- *affinis (acuminata Gren. et Godr.)*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf;
- *Smithiana*, häufig an der Ilm;
- *intermedia*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, rechtsseitig, 1 Stock.

S. Caprea × *cinerea* Wimm., Wilder Graben westlicher Rand, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, Krakau bei Blankenhain.

S. Caprea × *dasyclados (S. calodendron Wimm.)*, Werraufer bei Meiningen an der Brücke nach dem Schießhause.

S. Caprea × *nigricans*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, rechtsseitig.

S. Caprea × *repens* Lasch, Heidenteich bei Osterfeld, Nordrand.

S. Caprea × *Weigeliiana* Wimm. (*S. laurina* Smith), Ilmufer gen Oberweimar, Belvedere, westlicher Gebüschrund des Parkes an der Buchfahrter Straße.

S. longifolia Host (*S. dasyclados* Wimm.), Garten der Zünckelschen Waschanstalt.

S. Weigeliiana Willd. (*S. phyllicifolia* Smith, *S. bicolor* Ehrh.), Wilder Graben westliche Seite, Park, Garten der Thüringischen Landes-Versicherungsanstalt.

S. incana Schrank, mas, Teich bei dem Gasthof zu Belvedere, Park gen Oberweimar; — fem., Villa Erdmann am Bahnhof.

S. silesiaca Willd., kultiviert, z. B. Ilmufer gen Oberweimar.

S. repens L., Heidenteich bei Osterfeld, zwischen Berka und Tannroda (Bornmüller);

f. vulgaris, Eiserne Brücke (W.), Heidenteich bei Osterfeld;

— *angustifolia* Neilr., Heidenteich bei Osterfeld.

— *fusca*, ebendort.

— *argentea*, ebendort.

S. cinerea L., häufig um W.; die Blattbildung dieser Weide variiert ungemain;

f. undulata, oberer westlicher Rand der Ratstannen;

— *eroso-serrata*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf;

— *subrotundo-ovata*, Gehädlich;

— *uliginosa*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf;

— *lanceolata*, ebenda;

— *maculata*, Museumsplatz;

f. ovato-acuta, Gaberndorf;

— *glabra obscure virens*, Gaberndorf;

— *spuria* Wimm., Teichrand beim Gasthof zu Belvedere;

— *virgultosa*, kleiner, alter, 3 Fuß hoher Busch bei Gaberndorf;

— *cinereo-velutina* (*S. Wimariensis* Hskn.), Park gen Oberweimar.

S. cinerea × *purpurea* (*S. Pontederana* Koch), Bahnausschachtung bei Gaberndorf;

f. cinerascens, Tambach (Thür. Wald) am Bache nach dem Rektorate zu.

S. cinerea × *repens* Wimm., Heidenteich bei Osterfeld;

f. microphylla, ebendort.

S. cinerea × *viminalis*, Weg von Berka nach Tanroda;

f. foliis late linearibus, Belvedere, westlicher Gebüschrand an der Buchfahrter Straße.

S. cinerea × *nigricans* Wimm., Ilmufer gen Oberweimar bei der Schlange;

f. puberula Döll, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, rechtsseitig dem Bahndamme gegenüber.

S. viminalis L. häufig um W.

f. partita, *stigmatibus omnibus bipartitis*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf;

— *abbreviata*, Ilmufer, westlicher Gebüschrand des Parkes zu Belvedere, Dürrer Bach.

S. aurita L., zerstreut im Gebiet, hier und da häufig, z. B. Blankenhain, Heidenteich bei Osterfeld, Tambach (Thür. Wald);

f. cordifolia Lasch, Rehberg bei Wandersleben (Rudolf);

— *parvifolia*, Heidenteich bei Osterfeld;

— *uliginosa* Willd., ebendort, Ratstannen (W.);

— *spathulata* Willd., Blankenhain;

— *rugosa microphylla* Seringe, Blankenhain, Krakau, Tambach (Thür. Wald);

— *rhomboidalis*, Heidenteich bei Osterfeld, Tambach (Thür. Wald);

— *longifolia*, Heidenteich bei Osterfeld.

S. aurita × *cinerea* Wimm. (*S. multinervis* Döll), Heidenteich bei Osterfeld, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, zwischen Polka und Blankenhain;

f. androgyna, Ratstannen, westlicher Rand.

S. aurita × *Caprea* Wimm., Weickelsdorf, Bocksberg bei Gotha.
S. aurita × *repens* Wimm. (*S. ambigua* Ehrh.), Heidenteich bei Osterfeld;

f. microphylla, ebenda;

— *longifolia*, ebenda;

S. aurita × *nigricans*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf.

S. aurita × *purpurea* Wimm., mas, Heidenteich bei Osterfeld;— fem., Tambach (Thür. Wald) hinter dem Bahnhof, Krakau bei Blankenhain.

S. aurita × *viminalis* Wimm., Heidenteich bei Osterfeld.

S. nigricans Smith, vollständig eingebürgert;

f. macrophylla Hartig, Ilmufer gen Oberweimar;

— *crassifolia* Forb. Belvedere, westlicher Gebüschrand an der Buchfaherterstraße; Böschung an der Straße von der Polka nach Blankenhain;

— *eriocarpa*, Belvedere Teichrand beim Gasthof;

— *cordifolia* Seringe, Anlagen in Erfurt (Rudolf).

— *discolor*, Bahnausschachtung bei Gaberndorf, Teichrand beim Gasthof zu Belvedere;

— *lancifolia* Seringe, Ilmufer gen Oberweimar.

Beiträge

zur Flora von Thüringen (Erfurt), insbesondere Berichtigungen und Ergänzungen zu Ilse, Flora von Mittelthüringen.

Von C. L. Reinecke.

(Eingegangen am 25. März 1906.)

Ranunculus paucistamineus Tsch., Sumpf im Distr. 12 des Willröder Forstes.

Arabis hirsuta Scop., Mauern der Zitadelle Petersberg.

Erysimum odoratum Ehrh., zwischen Gügleben und dem Walde.

Bunias orientalis L., 1905 ein Exemplar zwischen Egstedt und dem Zeisiggrunde.

Silene dichotoma Ehrh., zwischen Alach und dem „Alacher See“.

Sagina apetalata L., Kleeacker am Ostrande des Waltersleber Holzes.

Spergula arvensis L., Äcker zwischen Rhoda und Waltersleben bei Erfurt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [NF_21](#)

Autor(en)/Author(s): Kromayer A.

Artikel/Article: [Zur Weiden-Flora Mittelthüringens. insbesondere der Gegend von Weimar. 70-75](#)