

Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen.

Von **K. L. Reinecke.**

(Eingegangen am 6. Oktober 1912.)

Thalictrum minus L. Einzeln am Marolsberge bei Elxleben a. G. und am Weinberge b. Haarhausen.

Adonis vernalis L. Steinberg und Marolsberg b. Elxleben a. G. und Längel zwischen Haarhausen und Freudenthal b. Wandersleben.

A. flammula Jacq. Diebskammer b. Schallenburg; Roter Berg b. Witterda.

Ranunculus aquatilis L. Im ehemal. Vordersee b. Obernissa.

R. trichophyllus Clair. Vordersee b. Obernissa; zwischen Großrudstedt und Kranichborn; im Linderbache b. Töttleben; auf Schlammboden an der Unstrut bei Henschleben in der Form *terrestris* Godr.

R. lingua L. Einzeln in Torflöchern des Vordersees b. Obernissa.

Nymphaea alba L. In einem Teiche zwischen Holzhausen und Röhrensee, aber vielleicht nicht ursprünglich.

Arabis Gerardi Bess. Nördlich von Mittelhausen am Rande des Feldgehölzes.

Erysimum virgatum Rth. Einzeln an der Schleusenbrücke bei Kühnhausen und am Ringelberge b. Witterda.

Lunaria rediviva L. Häufig am Graben beim Dörrberger Hammer im Thüringerwalde.

Tunica prolifera Scop. Zahlreich am rechten Ufer der Gera bei der Schleusenbrücke zwischen Gispersleben und Kühnhausen und am Wegrande neben der Nordhäuserbahn bei Erfurt-Nord.

Silene dichotoma Ehrh. Zwischen Möbisburg und Eischleben; bei Werningsleben; zwischen Erfurt und Binderleben; bei Fienstedt; an der Flutgrabenböschung in Erfurt; zwischen Erfurt und Gispersleben; zwischen Kühnhausen und der Schlense.

Cerastium glutinosum Fr. Zahlreich auf den Gipshügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda; Orphaler und Schaderoder Grund bei Tieftal. In den Formen *obscurum* Chaub. und *pallens* F. Schultz am Steinberge b. Elxleben a. G.

C. triviale Lk. var. *glandulosum* Koch. Am Balndamme bei Stedten unweit Erfurt und in der Nähe der Saline Luisenhall bei Stotternheim.

Hypericum montanum L. f. (nov.) *abbreviatum* Reinecke. Foliis

caulinis superioribus lateovatis breviter acuminatis. Am Möbisburger Holze südlich von Rhoda.

Geranium molle L. Auf Grasplätzen am Dome in Erfurt und in Chausseegräben beim städt. Krankenhause.

Impatiens Noli tangere L. Am Ufer der Gera zwischen Teichmanns Fabrik und Gispersleben Kil. angeschwemmt.

Oralis stricta L. Auf Acker- und Gartenland bei Gispersleben Kil. u. Viti und bei Kühnhäusen.

Ononis mitis Gm. Gips Hügel zwischen Elxleben a. G. und Witterda; Diebskammer bei Schallenburg.

Medicago minima Graefberg (1759). Häufig auf fast allen Gips-
hügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda.

Melilotus altissimus Thuill. Im Gleichtale zwischen der Wachsenburg und Freudenthal b. Wandersleben.

Astragalus danicus Retz. Zwischen Alperstedt und der Gramme-
Mühle an einer Stelle ziemlich häufig.

Oxytropis pilosa DC. Auf einem Hügel zwischen Röhrensee und der Mühlberger Leite.

Vicia tenuifolia Rth. Am Wechselholze b. Rohda.

Prunus insititia × *spinosa* (*Pr. fruticans* Whe.) zwischen Melchendorf und dem Willroder Forste an steinigem Rainen und am Petersberg-Glaciis in Erfurt.

Potentilla rubens (Crantz) Zimm. Zwischen Witterda und der Grundmühle: Abhänge des Drosselberges b. Melchendorf.

P. arenaria Borkh. Einzeln am Hünertbiel und Marolsberge, zahlreicher am Steinberge bei Elxleben a. G.

P. arenaria × *opaca*. Einzeln zwischen den Stammarten am Marolsberge und Steinberge b. Elxleben a. G. Einmal in wenigen Exemplaren auch am Rande der Chaussee zwischen Stotternheim und Alperstedt.

P. pilosa W. Steiler Abhang bei Tiefthal.

Archangelica officinalis Hoffm. Einzeln am Ufer der Unstrut bei Vehlra und Henschleben; zahlreicher an der Wipfra bei Eischleben und an der Gera bei Kühnhäusen.

Tordylium maximum L. An mit Schlehengebüsch bewachsenen Abhängen unweit der Kirche von Tiefthal zahlreich.

Anthriscus vulgaris Pers. Sehr zahlreich an der Dorfstraße und an Zäunen in Schallenburg.

Scabiosa ochroleuca L. An der Schallenburg bei Schallenburg.

S. canescens W. K. An der Diebskammer b. Schallenburg;

Gipshügel zwischen Kühnhausen, Elxleben a. G. und Witterda, besonders zahlreich auf dem Steinberge.

Aster Amellus L. Einzeln an einer Stelle auf dem Weinberge b. Haarhausen.

Inula germanica L. Truppweise auf Gipshügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda, besonders am Steinberge.

Artemisia campestris L. Auf fast allen Gipshügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda: Schallenburg und Diebskammer b. Schallenburg; auf einem Hügel zwischen Röhrensee und der Mühlberger Leite.

Hieracium pratense Tsch. Am Feldwege von Dietendorf nach Frienstedt und auf Wiesen im Vordersee b. Obernissa.

Helminthia echioides Grtn. (*Pieris echioides* L.). Eingeschleppt neben der Sangerhäuser Bahn östlich von Erfurt-Nord.

Menyanthes trifoliata L. Einzeln im Vordersee b. Obernissa.

Collomia grandiflora Dougl. Am rechten Ufer der Gera zwischen Gispersleben und Kühnhausen.

Myosotis hispida Schld. Am Westrande des Nomenholzes zwischen Witterda und der Grundmühle.

M. versicolor Sm. mit *M. hispida* Schld. und *M. micrantha* Pall. (*M. arenaria* Schrad.) auf Sand zwischen Singen und dem Forste.

Physalis Alkekengi L. Am Steinberge zwischen Elxleben a. G. und Witterda von Prof. Dr. A. Schulz-Halle a. S. aufgefunden.

Veronica prostrata L. Am Marolsberge b. Elxleben a. G.

V. Tournefortii Gm. Auf Acker- und Gartenland bei Bienstädt, Gispersleben Viti, Eischleben, Kirchheim und zwischen Egstedt und dem Willroder Forste.

Origanum vulgare L. Im Steigerforste b. Erfurt auch am sog. alten Rhodaischen Wege südlich der „Schönen Aussicht.“

Stachys annua L. Hünenbiel bei Elxleben a. G. und am Abhange des Riechheimer Berges.

Chenopodium rubrum L. Gleichental bei Wandersleben; auf Gemüseland bei Kühnhausen.

Ch. glaucum L. An der Dorfstraße in Gispersleben Kil.; auf Gemüseland und in Kiesgruben bei Kühnhausen.

Atriplex oblongifolium W. K. Am Bahndamme nördlich von Kühnhausen; am Fahrwege von Tiefthal nach Kühnhausen neben dem Weißbache.

Polygonum dumetorum L. An den Steinbrüchen der Mühlberger Leite.

Gymnadenia conopsea R. Br. f. *albiflora* (G. *ornithis* Spr.). Am Strohberge bei Rohda 1 Exemplar.

Platanthera Wankelii Rehb. fil. Strohberg b. Rohda; im Distr. 13 des Willroder Forstes; 1 Exemplar am Erlensumpfe im Steigerforste b. Erfurt.

Goodyera repens R. Br. Zahlreich am Waldwege vom Bahnhofe Plaue nach der Halskappe.

Allium montanum Schm. (*A. fallax* Schultes). Auf Gips am Steinberge bei Elxleben a. G. (hier von Prof. Dr. A. Schulz-Halle zuerst aufgefunden); zahlreicher auf dem Marolsberge b. Elxleben a. G.

A. rotundum L. Einzeln zwischen Gebesee und Dachwig.

A. vineale L. var. *capsuliferum* Lge. An einem Feldwege östlich von Dachwig.

Juncus obtusiflorus Ehrh. Spindelgraben zwischen Elxleben und Witterda.

Scirpus Tabernaemontani Gu. Feldsumpf zwischen Marienthal und Schmira; Moorwiese im Gleichenale b. Wandersleben.

Carex Davalliana Sm. Krautseewiesen bei Ingerleben; zwischen Hableben und Werningshausen; in den Waltersweiden bei Tiefthal.

C. Hornschuchiana Hippe. Einzeln auf der Wiese an der Saline Luisenhall b. Stötternheim.

C. Pseudo-Cyperus L. Am Teiche zwischen Holzhausen und Röhrensee.

C. lasiocarpa Ehrh. (*C. filiformis* Good.). Wächst nicht in einem Fichtenwalde bei Kranichfeld (cfr. Schönheit, Taschenbuch der Flora Thüringens und Hse, Flora von Mittelthüringen). Das im Herbar Buddensiegs befindliche Originalexemplar gehört zu *C. vesicaria* L.

Stipa capillata L. Zwischen Elxleben a. G., Kühnhausen und Witterda sehr verbreitet; auf einem Hügel zwischen Röhrensee und der Mühlberger Leite.

Sclerochloa dura P. B. Planweg beim Wasserwerke Elxleben zwischen Elxleben a. G. und Witterda.

Glyceria aquatica Whlbb. Am Unstrutufer bei Vohra; zwischen Großrudstedt und Kranichborn; am rechten Ufer der Gera zwischen Gispersleben Viti und Kühnhausen.

Festuca arundinacea Schreb. Am Spindelgraben bei Elxleben a. G.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [NF_30](#)

Autor(en)/Author(s): Reinecke Karl [Carl] Lorenz

Artikel/Article: [Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen. 18-22](#)