

Register

zu Neue Folge, Heft 31 (1914) bis 35 (1921) der
Mitteilungen des Thüringischen
Botanischen Vereins¹⁾.

- Acaulon** muticum Schreb. 32, 155; triquetrum Spr. 32, 155. — **Achillea** Millefolium L. 31, 21; nobilis L. 33, 64; Ptarmica L. 35, 31; setacea W. K. 35, 23. — **Achyrophorus** maculatus (L.) 31, 53. — **Acisphagnum** C. M. 31, 4. — **Acorus** Calamus L. 35, 25. — **Acrocladium** cuspidatum L. 32, 278. — **Acrostichum** 33, 78. — **Actaea** spicata L. 35, 22. — **Actinonema** Fr. 31, 74. — **Acutifolia** (Schl.) 31, 4. — **Adonis** aestivalis L. 33, 47; 54; var. citrina Hffm. 33, 54; flammus Jcq. 31, 54; vernalis L. 33, 29; 35, 14; 31. — **Aegopodium** Podagraria L. 35, 23. — **Aethusa** Cynapium L. 31, 77; var. agrestis Wallr. 31, 77; var. cynapioides M. B. 31, 77. — **Agrimonia** Trn. 34, 21. — **Ajuga** genevensis L. 33, 62; 77; var. elatior Fr. 33, 77; var. macrophylla Schbl. et Mart. 35, 24; pyramidalis L. 33, 77; reptans L. 33, 77; **Alchimilla** arvensis Scop. 35, 31; glaucescens Wallr. 31, 77. — **Alectorolophus** anceps Behrendsen 31, 59; arvensis × Aschersonianus 31, 61; × serotinus 31, 60; var. leucodon 31, 61; Aschersonianus 31, 59; × minor 31, 58; eumajor 31, 59; glandulosus 33, 6; hungaricus Borb. 31, 60; minor W. et G. 31, 59; var. vittulatus Greml. 31, 60; montanus (Saut.) Fritsch 31, 59; rume-licus 31, 59; serotinus Schönh. 31, 59; f. glanduliger Bornm. 31, 59. — **Allium** acutangulum Schrad. 35, 30; rotundum L. 35, 23; vineale f. compactum (Thuill.) Aschers. 35, 22. — **Alnus** glutinosa × incana 35, 9; incana var. arcuata Skaerm. 35, 9; borealis Norrlin f. cordifolia Call. 35, 9; ulmifolia Bornm. 35, 9. — **Aloina** aloides Koch 32, 161; brevirostris Hook. et Grev. 32, 161; ericaefolia (Neck.) 32, 161; stellata (Schreb.) 32, 161. — **Alopecurus** agrestis L. 35, 24; anthoxanthoides Boiss. 33, 31; Bornmülleri Domin 33, 31; neg-lectus Aznav 33, 31; setarioides Gren. 33, 31; var.? juvenalis Hack. et Thell. 33, 31; ventricosus Pers. 33, 30. — **Althaea** officinalis L. 31, 14. — **Amanita** caesarea (Scop.) 35, 25; muscaria (L.) 35, 25; strobiliformis (Vitt.) 35, 11. — **Amarantus** albus L. 35, 23. — **Amblystegium** compactum (C. M.) Aust. 32, 258; confervoides Brid. 32, 257; hygrophilum Sch. 32, 260; Juratzkanum Sch. 32, 260; Kochii Br. Eur. 32, 259; rigescens Lpr. 32, 259; riparium L. 32, 261; serpens L. 32, 257; Sprucei Bruch 32, 256; subtile Hedw. 32, 256; varium (Hedw.) Ldbg. 32, 258. — **Amelanchier** vulgaris Mnch. 31, 68. — **Ammi** majus L. 33, 60. — **Amphidium** lapponicum Sch. 32, 178; Mou-geotii Br. Eur. 32, 178. — **Amphiprora** 33, 68. — **Amphora** 33, 69. — **Anacamptis** Rich. 31, 77. — **Anacamptosphagnum** C. M. 31, 4. — **Andraea** petrophila Ehrh. 32, 103; rupestris L. 32, 103. — **Andropogon** Ischaemone L. 31, 38; 33, 29. — **Anemone** 33, 47; nemorosa × ranunculoides 35, 5; nigricans St. 33, 29; patens L. 33, 29; Pulsatilla L. 35, 24; 31; silvestris L.

¹⁾ Die Seitenzahlen von Heft 32 beziehen sich auf den zweiten Teil dieses Heftes

33, 29; transsilvanica Heuffel 33, 77. — **Angelica** silvestris L. 33, 39. — **Ankylotus** 31, 56. — **Anomodon** apiculatus Br. et Sch. 32, 234; 35, 5; attenuatus Schreb. 32, 234; longifolius Schl. 32, 234; viticulosus L. 32, 234. — **Anthemis** tinctoria L. 33, 64. — **Anthericum** Liliago L. 31, 53; 35, 4; 30; ramosum L. 35, 14; 22. — **Anthoxanthum** aristatum Boiss. 35, 24. — **Anthyllis** Vulneraria L. f. alba L. 34, 20. — **Antirrhinum** majus L. 35, 5. — **Antitrichia** curtipedula L. 32, 222. — **Apium** graveolens L. 31, 14; 33, 60. — **Aquilegia** vulgaris L. 34, 21. — **Arabis** alpina L. 34, 13; arenosa Scop. 35, 21; pauciflora (Grimm) 34, 10. — **Arbutus** Uva ursi L. 35, 21. — **Archangelica** officinalis Hoffm. 35, 22; 24; 31. — **Archidium** phascoides Brid. 32, 103. — **Aremonia** 34, 21. — **Arenaria** serpyllifolia 35, 14. — **Aristolochia** Clematidis L. 35, 4; 31. — **Arnica** montana L. 33, 70. — **Arnoseris** pusilla Gaertn. 35, 25. — **Arrhenatherum** elatius M. et K. 31, 21. — **Artemisia** Absynthium L. 31, 30; austriaca Jcq. 35, 4; campestris L. 35, 7; 31; Cina Berg 31, 31; laciniata Willd. 31, 14 u. f.; maritima L. 31, 14; 29; 76; 33, 65; Mertensiana Wallr. 31, 15; pontica L. 31, 31; rupestris L. 31, 14 u. f.; 33, 65; Seriphium Wallr. 31, 22. — **Asarum** europaeum L. 31, 67. — **Ascomyceten** 31, 74. — **Asparagus** officinalis L. 33, 50. — **Asperugo** procumbens L. 35, 23. — **Asperula** arvensis L. 33, 77; odorata L. 34, 10; setosa Jaub. et Spach 33, 77. — **Aspidium** cristatum \times spinulosum 35, 4; Filix mas Sw. f. affine Rth. 35, 4; montanum (Vogler) Aschers. 33, 78; spinulosum Sw. ssp. eu-spinulosum Asch. f. elevatum A. Br. 35, 4; exaltatum Lasch 35, 4. — **Asplenium** bulbiferum Forst. 33, 10; monanthemum L. 33, 78; Ruta muraria L. 33, 39; Trichomanes L. 33, 49; 78. — **Aster** Amellus L. 33, 64; 35, 14; 31; lanceolatus Willd. 35, 24; Linosyris (L.) Bernh. 35, 4; 31; Tripolium L. 31, 14 u. f.; 33, 64. — **Astomum** crispum Hedw. 32, 135. — **Astragalus** aycleus Boiss. 31, 57; arenarius L. 33, 23; berytheus Boiss. 31, 57; Cicer L. 35, 23; commixtus Bge. 31, 57; crassinervius Boiss. 31, 58; danicus Retz 33, 21; 35, 31; f. polyspermus Abrom. 33, 23; drymophilus Bornm. 31, 57; glaucopsoides Bornm. 31, 58; gracilipes Benth. 31, 57; Hypoglottis ? polyspermus Torr. et Gray 33, 23; silvaticus Thal 33, 56; spirorhynchus Bornm. 31, 56; strictifolius Boiss. 31, 58. — **Astrantia** major L. 35, 31. — **Asyneuma** amplexicaule (Willd.) Handel 35, 5; cordifolium Bornm. 35, 5. — **Athyrium** Filix femina Rth. 35, 4. — **Atriplex** 33, 53; litorale L. 31, 14; oblongifolium W. K. 35, 22; tataricum L. 35, 4. — **Atropa** Belladonna L. 33, 39; 33, 63. — **Atropis** distans (L.) 31, 14 u. f. — **Aulacomnium** androgynum L. 32, 208; palustre L. 32, 208. — **Avena** abessynica Hochst. 31, 6; barbata Pott 31, 9; brevis Roth 31, 6; 33, 20; byzantina C. Koch 31, 6; 33, 20; diffusa Neilreich 31, 6; fatua L. 31, 8; 33, 16; nigra C. B. P. 33, 21; nuda L. 31, 6; 33, 19; f. chinensis 33, 20; f. inermis 33, 20; orientalis Schreb. 31, 6; 33, 16; sativa L. 31, 6; 33, 16; sterilis L. 31, 9; 33, 20; strigosa Schreb. 31, 6; 33, 20; Wiestii Steudel 31, 9.

Bacillaria 33, 68. — **Bacillariaceen** 33, 68 u. f. — **Barbula** acuta Brid. 32, 151; convoluta Hedw. 32, 153; cylindrica Tayl. 32, 152; Enderesii Garov 32, 154; fallax Hedw. 32, 151; Hornschuchii Schultz 32, 151; reflexa Brid. 32, 152; revoluta (Schrad.) Brid. 32, 153; rigidula var. gigantea Schl. 31, 5; unguiculata (Huds.) Hedw. 32, 153; vinealis Brid. 32, 152. — **Bartramia** Halleri Hedw. 32, 210; ithyphylla Brid. 32, 210; pomiformis L. 32, 210. — **Bellis** perennis L. 34, 21. — **Blechnum** Spicant (L.) 33, 49. — **Blindia** acuta Dicks. 32, 118. — **Boletus** appendiculatus (Schaeff.) 35, 11; olivaceus (Schaeff.) 35, 11. — **Bonjeania** hirsuta Rchb. 35, 23. — **Botrychium** Lunaria (L.) Sw. 33, 70; 35, 8; 23; 25; 30; f. subincisa Röper 33, 70. — **Brachydontium** trichodes W. et M.

32, 117. — **Brachypodium** 31, 68; *pinnatum* (L.) 31, 53; 35, 14. — **Brachythecium** *albicans* Neck. 32, 241; *campestre* (Bruch) 32, 244; *curtum* Ldbg. 32, 243; *glareosum* (Bruch) Br. Eur. 32, 241; *Mildei* Sch. 32, 240; *reflexum* W. et M. 32, 242; *rivulare* Br. Eur. 32, 244; *rutabulum* L. 32, 244; *salebrosum* Hoffm. 32, 240; *salicinum* Br. Eur. 32, 241; *Starkei* Brid. 32, 243; *vagans* Milde 32, 242; *velutinum* Hedw. 32, 241. — **Brassica** *Napus esculenta* DC. 33, 55; *Rapa* L. 33, 55. — **Bromus** *arvensis* L. 35, 22; 30; *crinitus* Boiss. 33, 77; *inermis* Leyss. 35, 25; 30; *patulus* M. et K. 35, 24; *sterilis* L. 33, 21. — **Bruchia** *palustris* Br. et Sch. 32, 110. — **Brunella** *grandiflora* Jcq. 35, 14. — **Bryonia** *alba* L. 33, 41; *dioica* Jcq. 33, 41. — **Bryum** *alpinum* L. 32, 199; *argenteum* L. 32, 200; *atropurpureum* Web. et Mohr. 32, 199; *badium* Bruch 32, 200; *bimum* Schreb. 32, 197; *caespiticium* L. 32, 200; *capillare* L. 32, 200; *cirratum* Hoppe et H. 32, 197; *cuspidatum* (Sch.) 32, 197; *cyclophyllum* Schwgr. 32, 201; *Duvalii* Voit. 32, 201; *elegans* Nees 32, 201; *erythrocarpum* Schwgr. 32, 198; *Funckii* Schwgr. 32, 200; *Graefianum* Schl. 31, 5; *inclinatum* Sw. 32, 196; *intermedium* Brid. 32, 197; *Mildei* Jur. 32, 199; *murale* Wils. 32, 199; *pallens* Sw. 32, 201; *pallescens* Schleich. 32, 198; *pendulum* Hornsch. 32, 196; *pseudotriquetrum* Hedw. 32, 202; *Schleicheri* Schwgr. 32, 203; *subglobosum* Schl. 31, 5; *turbanatum* Hedw. 32, 202; *uliginosum* Bruch 32, 197. — **Bunias** *orientalis* L. 35, 22. — **Bupleurum** *falcatum* L. 35, 14; *rotundifolium* L. 33, 60; *tenuissimum* L. 31, 14. — **Buxbaumia** *aphylla* L. 32, 104; *indusiata* Brid. 32, 104.

Calamagrostis 34, 6; *Haussknechtiana* Torg. 34, 6; *purpurea* Trin. 34, 7; *Torgesiana* Hsskn. 34, 6. — **Calendula** *arvensis* L. 35, 32. — **Calliergon** *cordifolium* Hedw. 32, 277; *giganteum* (Schw.) Ldbg. 32, 277; *stramineum* Dicks. 32, 278. — **Calluna** *vulgaris* (L.) 33, 39; 35, 5. — **Camelina** *microcarpa* Andrz. 35, 24. — **Campanula** *bononiensis* L. 35, 31; *glomerata* L. 35, 14; *rapunculoides* L. 35, 10. — **Camptothecium** *Geheebei* (Milde) Ldbg. 32, 239; *lutescens* Hedw. 32, 239; *nitens* Schreb. 32, 238. — **Campylopus** *brevipilus* Br. Eur. 32, 133; *flexuosus* Brid. 32, 132; *fragilis* Dicks. 32, 133; *subulatus* Milde 32, 132; *turfaceus* Br. Eur. 32, 133. — **Campylostelium** *saxicola* W. et M. 32, 116. — **Cannabis** *sativa* L. 35, 31. — **Capsella** *procumbens* (L.) 31, 14; 33, 75. — **Cardamine** *baldensis* Fritsch 33, 70; *digenea* (Greml.) O. E. Schulz 33, 70; *digitata* (Lam.) O. E. Schulz 33, 70; *Impatiens* L. 35, 24; *intermedia* Hook. 33, 70; *pentaphyllos* (L.) R. Br. 33, 70; *pinnata* (Lam.) O. E. Schulz 33, 70; *pratensis dentata* Schultes 35, 24. — **Carduus** 34, 21; *hamulosus* 33, 29. — **Carex** *acuta* L. *strictifolia* Opiz 35, 24; *amphilepis* Peterm. 35, 24; *aquatica* Wahlenb. 31, 78; *Davalliana* Sm. 35, 30; *digitata* \times *ornithopoda* 35, 10; *flava* L. 35, 30; *globularis* L. 31, 78; *hordeistichos* Vill. 31, 14; 17 u. f.; 35, 10; *humilis* Leyss. 33, 29; 35, 14; *laevirostris* Blytt 31, 78; *ornithopoda* Willd. 31, 69; 34, 10; *pilosa* Scop. 35, 10; 29; *praecox* Schreb. 35, 30; *rhynchophysa* C. A. Mey 31, 78; *riparia* Curt. 35, 22; *tenella* Schkuhr 31, 78; *vitilis* Fr. 31, 78. — **Carlina** *acaulis* L. 31, 76; 34, 13; *vulgaris* L. 35, 14. — **Carthamus** *tinctorius* L. 33, 65; 35, 24. — **Coscinodon** *cribosus* (Hedw.) 32, 166. — **Castanea** *vesca* Gaertn. 35, 26. — **Catharinea** *angustata* Brid. 32, 106; *tenella* Roehl 32, 106; *undulata* L. 32, 106. — **Centauraea** *algeriensis* Coss. et Dur. 31, 77; *diluta* Dryander 31, 77; *Jacea* L. 35, 14; *kilaea* Boiss. 35, 5; *leucomalla* Bornm. 35, 5; *rhenana* Bor. 35, 14; *rumelica* Boiss. 35, 7; *Scabiosa* L. 35, 14; *soltstitialis* L. 35, 21; 25. — **Cephalanthera** *alba* (Cr.) Simk. 35, 22. — **Cephalaria** *pilosa* Gren. 35, 4. — **Cerastium** *brachypetalum* Desp. 35, 24; *glutinosum* Fr. 35, 31; *pallens* 35, 14. — **Cerasus** *acida* Dumort. 33, 27. — **Ceratodon** *purpureus* (L.) 32, 115. —

Cercidiphyllaceæ 35, 6. — **Cercidiphyllum** japonicum L. et Z. 35, 6. — **Cerinthe** minor L. 35, 24. — **Ceterach** officinarum \times **Scolopendrium** vulgare 33, 7. — **Chaetoceros** 33, 68; Wighamii Brightwell 33, 68; var. Irmischii Cohn 33, 68. — **Chamaecistus** angustifolius C. B. P. 35, 15. — **Chenopodium** 33, 53; opulifolium Schrad. 35, 22; 23. — **Chondrilla** juncea L. 33, 66. — **Chrysanthemum** Parthenium (L.) 33, 64. — **Chrysohypnum** chrysophyllum Brid. 32, 265; elodes Spruce 32, 265; Halleri L. fil. 32, 265; polygamum (Br. Eur.) Wils. 32, 266; protensum (Brid.) 32, 266; Sommerfeltii Myr. 32, 265; stellatum Schreb. 32, 265. — **Chrysosplenium** oppositifolium L. 35, 24. — **Cichoreen**-Art = Ixopus Val. Cord. 33, 66. — **Cinclidotus** aquaticus Hedw. 32, 154; fontinaloides Hedw. 32, 154. — **Circaea** alpina L. 35, 23; intermedia Ehrh. 35, 24; lutetiana L. 35, 24. — **Cirriphyllum** crassinervium Tayl. 32, 246; germanicum Grebe 32, 246; piliferum Schreb. 32, 247; plumosum Sw. 32, 248; populeum Hedw. 32, 247; Tommasinii (Sendtn.) 32, 246; velutinoides (Bruch) 32, 246. — **Cirsium** arvense Scop. 35, 14; canum Mnch. 35, 24; Eriophorum Scop. 34, 22; 35, 22; heterophyllum (L.) 33, 66; 35, 21; pannonicum Gaud. 33, 29; sylvaticum Tsch. 35, 22; tuberosum (L.) All. 35, 31. — **Cistus** vinealis Willd. 35, 17. — **Claviceps** purpurea Tul. 31, 78. — **Clematis** recta L. 35, 22; Vitalba L. 33, 54. — **Climacium** dendroides Hedw. 32, 286. — **Colchicum** 35, 10. — **Collomia** grandiflora Dougl. 35, 21. — **Colutea** arborea rescens \times orientalis 35, 7. — **Comatosphagnum** C. M. 31, 4. — **Contarinia** Loti De Geer 35, 9; Onobrychidis Kieft. 35, 9. — **Conyza** sylvestris hirsuta 33, 64. — **Coralliorrhiza** trifida Chatel 35, 31. — **Cornus** mas L. 33, 61; 35, 14; sanguinea L. 31, 48; 33, 60; 35, 9. — **Coronilla** vaginalis Lmk. 34, 10; 35, 20. — **Cotoneaster** integrerrima Med. 35, 14. — **Cousinia** 34, 16. — **Crataegus** 34, 21; monogyna Jcq. 35, 10. — **Cratoneuron** commutatum Hedw. 32, 268; falcatum Brid. 32, 268; irrigatum Zetterst. 32, 268. — **Crocus** officinalis L. 33, 51. — **Ctenidium** molluscum (Sch.) Mitt. 32, 282. — **Cuscuta** Epithymum (L.) 35, 22; 24. — **Cuspidata** Schl. 31, 4. — **Cylindrosporium** 31, 74. — **Cymbifolia** Schl. 31, 4. — **Cynareen**-Art 33, 66. — **Cynodontium** polycarpum Ehrh. 32, 123; strumiferum (Haller) Ehrh. 32, 123. — **Cyprinotus** salina Brady 31, 28. — **Cypripedium** Calceolus L. 35, 30. — **Cystopteris** atrivirescens Presl. 35, 7; Baenitzii Doerfler 35, 6; fragilis (L.) Bernh. 35, 7; var. dentata 35, 7. — **Cytheridea** torosa Jones var. littoralis Brady 31, 28. — **Cytisus** nigricans L. 33, 29; ratisbonensis Schff. 33, 29.

Dactylis Aschersoniana Graebn. 35, 24; glomerata L. 31, 21; 35, 14. — **Daucus** Carota L. 31, 21. — **Delphinium** Consolida L. 34, 21; 35, 4. — **Dentaria** bulbifera L. 33, 55; 35, 20; 24; digitata Lam. 33, 69; \times pennata (D. digenea Gremli) 33, 69; enneaphyllos L. 33, 55; intermedia Sond. 33, 69; pinnata Lmk. 33, 69. — **Dianthus** Armeria L. 34, 14; 35, 8; \times superbus 34, 15; barbatus L. 34, 14; caesioides Sm. 34, 21; capitatus DC. 33, 29; Carthusianorum L. 35, 14; pseudobarbatus Bess. 33, 29; superbus L. 34, 14; \times barbatus (D. Courtoisii Rchb., D. Leitgebii Reichardt) 34, 14. — **Diatoma** elongatum 33, 69. — **Dichodontium** pellucidum L. 32, 124. — **Dicksonia** 33, 78. — **Dicranella** cerviculata Hedw. 32, 120; crispa Hedw. 32, 119; curvata Hedw. 32, 121; heteromalla Hedw. 32, 121; rufescens Turn. 32, 120; Schreberi Hedw. 32, 119; squarrosa Schrad. 32, 119; subulata Hedw. 32, 120; varia Hedw. 32, 120. — **Dicranodontium** longirostre W. et M. 32, 133. — **Dicranoweisia** cirrhata Hedw. 32, 125; crispula Hedw. 32, 125. — **Dicranum** Bergeri Bland. 32, 130; Bonjeani Not. 32, 130; congestum Brid. 32, 129; flagellare Hedw. 32, 128; fulvum Hook. 32, 128; fuscescens Turn. 32, 129; longifolium Hedw. 32, 128; majus Turn. 32, 130; montanum Hedw. 32, 127;

Sauteri Br. Eur. 32, 129; scoparium L. 32, 129; spurium Hedw. 32, 131; Starkei W. et M. 32, 126; undulatum Turn. 32, 131; viride Sull. 32, 127. — **Dictamnus** albus L. 35, 14; 22. — **Didymodon** cordatus Jur. 32, 144; cylindricus Bruch 32, 147; luridus Hsch. 32, 144; rigidulus Dicks. 32, 146; rubellus Hoffm. 32, 143; sinuosus Wils. 32, 148; spadiceus (Mitt.) Spr. 32, 148; tophaceus (Brid.) Jur. 32, 148; validus Limpr. 31, 5. — **Digitalis** purpurea L. 35, 25. — **Diphyscium** sessile (Schm.) Ldbg. 32, 104. — **Dipsacus** pilosus L. 35, 31. — **Distichium** capillaceum L. 32, 115. — **Ditrichum** flexicaule Schwgr. 32, 113; homomallum Hedw. 32, 113; Knappii Jur. 32, 115; pallidum Schreb. 32, 115; tortile Schrad. 32, 112; vaginans Sull. 32, 113. — **Draba** verna L. 35, 14. — **Drepanocladus** aduncus Hedw. 32, 273; aquaticus Sanio 32, 274; exannulatus Guemb. 32, 274; fluitans Hedw. 32, 275; hamifolius Sch. 32, 272; H. Schulzei Spr. 32, 275; intermedius Ldbg. 32, 271; Kneiffii Br. Eur. 32, 273; lycopodioides Schwgr. 32, 272; polycarpus Bland. 32, 273; pseudofluitans Sanio 32, 274; pseudo-stramineus C. M. 32, 276; purpurascens (Sch.) Spr. 32, 275; revolvens Sw 32, 271; Rotae Not. 32, 275; Sendtneri Sch. 32, 272; serratus Ldbg. 32, 276; tenuis Kling. 32, 273; uncinatus Hedw. 32, 270; vernicosus Ldbg. 32, 271; Wilsoni Sch. 32, 272. — **Drosera** longifolia L. 35, 21. — **Dryptodon** patens Dicks. 32, 173.

Echinops sphaerocephalus L. 35, 22. — **Eliophytia** eriostachya Benth. 35, 32; Patrini (Lepech.) Grke. 35, 32. — **Empusa** muscae Cohn 31, 75. — **Encalypta** ciliata Hedw. 32, 165; contorta (Wulf.) Ldb. 32, 166; spathulata C. M. 32, 166; vulgaris Hedw. 32, 165. — **Entodon** orthocarpus (Lapyl) Ldb. 32, 223. — **Entosthodon** fascicularis Dicks. 32, 188. — **Ephemeralia** recurvifolia Dicks. 32, 186. — **Ephemerum** cohaerens Hedw. 32, 187; serratum (Schreb.) 32, 186. — **Epilobium** 33, 59; collinum Gimel. 35, 22; confusum Hsskn. 35, 5; Graebneri Rubner 35, 5; minutiflorum Hsskn. 35, 5; modestum Hsskn. 35, 6; nervosum Boiss. et Buhse 35, 6; obscurum (Schreb.) Roth 35, 6; palustre L. 35, 5. — **Epipactis** latifolia L. 33, 53; rubiginosa Crntz. 33, 22; 24; 53; sessilifolia Peterm. 35, 24. — **Erica** Tetralix L. 35, 21. — **Eruca** sativa Lam. 31, 79. — **Ervum** silvaticum Peterm. 35, 24. — **Eryngium** amethystinum L. 31, 77; var. majus Bornm. 31, 77; campestre 35, 14; Creticum L. 31, 77. — **Erysimum** hieracifolium L. 35, 24; repandum L. 35, 31; virgatum Roth 31, 53. — **Erythraea** litoralis 31, 23; pulchella (Sw.) Fr. 35, 31. — **Eucladium** verticillatum Turn. 32, 139. — **Euphorbia** Cyparissias L. 35, 14; dulcis Jcq. 34, 10; palustris L. 35, 20; 31. — **Euphrasia** minima Jcq. 33, 6; Rostkoviana \times stricta (= E. intermedia Wettst.) 35, 8; stricta Host. 35, 25. — **Eurhynchium** Stokesii Turn. 32, 251; striatum Schreb. 32, 251; strigosum Hffm. 32, 250. — **Evonymus** europaea L. 31, 48. — **Excipulaceen** Sacc. 31, 73.

Fagopyrum esculentum Mnch. 35, 31; tataricum (L.) Gaertn. 35, 31. — **Falcaria** vulgaris Bernh. 33, 60. — **Farsetia** incana R. Br. 35, 24. — **Festuca** arundinacea Schreb. 35, 24; Haussknechtii Torg. (= gigantea \times rubra) 34, 6; ovina L. 31, 14; 54; pseudomyuros Soy. 35, 10; silvatica Vill. 35, 25. — **Filipendula** hexapetala 35, 14; Ulmaria (L.) Maxim. 35, 31. — **Fissidens** adiantoides (L.) Hedw. 32, 217; bryoides Hedw. 32, 215; crassipes Wils. 32, 216; cristatus Wils. 32, 217; exiguum Sull. 32, 215; exilis Hedw. 32, 215; incurvus W. et M. 32, 215; osmundoides Hedw. 32, 216; pusillus Wils. 32, 216; taxifolius L. 32, 217. — **Fistularia** Crista galli minor 31, 60; Hungarica 31, 60. — **Fontinalis** antipyretica L. 32, 218; Kindbergii Ren. et Card. 32, 218; squamosa L. 32, 219. — **Forsythia** europaea Baldacci 33, 77; suspensa \times viridis

dissima 33, 77. — **Fragaria** collina Ehrh. 35, 14; **X vesca** 35, 23. — **Fumana** vulgaris Spach 35, 7. — **Fumaria** Vaillantii Lois. 35, 20. — **Funaria** hygrometrica L. 32, 188; mediterranea Ldb. 32, 188. — **Fungi** imperfecti 31, 71. — **Fusicoccum** 31, 74.

Gaillardia picta Sw. 34, 21. — **Galeopsis** bifida Bugh. 35, 25; pubescens Bess. 34, 18; speciosa Mill. 35, 21; 25. — **Galinsoga** parviflora Cav. 35, 24. — **Galium** anglicum Hds. (gracile Wallr.) 35, 23; boreale L. 35, 10; Mollugo L. f. pubescens Schrad. 34, 20. — **Genista** sagittalis L. 33, 57; tinctoria L. 35, 31. — **Gentiana** germanica Willd. 33, 61; lutea L. 34, 13; 35, 21; Pneumonanthe L. 33, 61. — **Georgia** pellucida L. 32, 105. — **Geranium** nodosum L. 35, 5; Robertianum L. 35, 23; sanguineum L. 35, 14. — **Ginkgo** biloba L. 35, 9; 25. — **Gladiolus** communis L. 33, 52; imbricatus L. 33, 52; pauper Gaud. 33, 52. — **Glaucium** corniculatum (L.) 33, 56; flavum Crntz. 31, 34; 33, 56; luteum Smith 31, 34; 78. — **Glaux** maritima L. 31, 14; 17; 33, 61. — **Globularia** Linnaei Rouy 35, 13; vulgaris L. 35, 13; Willkommii Nym. 34, 11; 13; 35, 13. — **Gloeosporium** nervisequum Sacc. 31, 73; Robergei Desm. 31, 74. — **Glumaceae** 34, 6. — **Glyceria** fluitans L. 33, 50; plicata Fr. 33, 50; 35, 22; 25. — **Glycine** chinensis Sims. 35, 25. — **Glyphomitrium** polyphyllum (Dicks.) Mitt. 32, 178. — **Gnaphalium** luteo-album L. 35, 21. — **Goodyera** repens R. Br. 35, 25; 31. — **Gratiola** officinalis L. 33, 63. — **Grimmia** anodon Br. Eur. 32, 170; commutata Huebn. 32, 173; crinita Brid. 32, 170; decipiens Schltz. 32, 171; Donii Smith 32, 172; Hartmanni Sch. 32, 171; incurva Schwgr. 32, 171; leucophaea Grev. 32, 172; montana Br. Eur. 32, 173; Muehlenbeckii Sch. 32, 171; orbicularis Br. Eur. 32, 170; ovata W. et M. 32, 172; plagiopoda Hedw. 32, 170; pulvinata Sm. 32, 170; trichophylla Grev. 32, 171. — **Gymnadenia** conopea R. Br. 35, 24. — **Gymnostomum** calcareum Nees et H. 32, 138; rupestre Schleich. 32, 138. — **Gypsophila** fastigiata L. 31, 50. — **Gyroweisia** tenuis Schrad. 32, 139.

Halimus pedunculatus Wallr. 33, 75. — **Hamamelidaceae** 35, 6. — **Hapalosphaeria** deformans Syd. 35, 9. — **Hedwigia** albicans Web. 32, 213; Fumana Mill. 31, 50; italicum Tenore 35, 19; montanum Visiani 35, 17; oelandicum Wahlenb. 35, 20; procumbens 31, 38; 35, 15; serpyllifolium Rehfeldt 35, 18; vineale Willd. 34, 13; 35, 16; candidissimum Tenore 35, 19; virescens Tenore 35, 14; 19. — **Helianthemum** Chamaecistus Mill. 31, 38; 35, 14. — **Helichrysum** arenarium DC. 35, 21. — **Helleborus** viridis L. 33, 55. — **Helminthia** echiooides Gaertn. 35, 25. — **Helodea** canadensis Rich. 35, 30. — **Helodium** lanatum Ström. 32, 238. — **Hepatica** triloba Gil. 33, 47. — **Herpotrichia** Henkeliana Syd. 35, 10. — **Heterocladium** heteropterum Bruch 32, 233; squarrosum (Voit.) Ldb. 32, 232. — **Hieracium** aurantiacum L. 35, 21; bifurcum M. B. subsp. franconum Bornm. et Zahn 35, 7; gypsicenum Bornm. et Zahn 35, 7; Pilosella L. 35, 7; 14; praealtum Vill. 35, 25; Schmidtii Tsch. 35, 25; setigerum Tsch. 35, 7; vulgatum Fr. ramosum W. et K. 35, 24. — **Hippuris** vulgaris L. 33, 59. — **Homalia** trichomanoides Schreb. 32, 220. — **Homalothecium** sericeum L. 32, 238. — **Homogyne** alpina (L.) 33, 65. — **Hookeria** lucens L. 32, 225. — **Hordeum** secalinum Schreb. 31, 11. — **Hosta** plantaginea (Lam.) Aschers. 35, 5. — **Hutchinsia** petraea R. Br. 35, 14. — **Hydrocotyle** vulgaris L. 35, 21. — **Hygro-Amblystegium** filicinum L. 32, 263; fluviale Sw. 32, 263; irriguum Wils. 32, 262. — **Hygro-Hypnum** dilatatum Wils. 32, 267; ochraceum Wils. 32, 267; palustre L. 32, 266. — **Hylocomium** brevirostre (Ehrh.) Br. Eur. 32, 285; loreum L. 32, 286; proliferum L. 32, 284; Schreberi Willd. 32, 284; squarrosum L.

32, 285; triquetrum L. 32, 286; umbratum Ehrh. 32, 285. — **Hymenostomum** microstomum R. Br. 32, 136; rostellatum Brid. 32, 136; squarrosum Nees et Hedw. 32, 136; tortile Schwgr. 32, 136. — **Hypericum** elegans Steph. 31, 53; 33, 29; perforatum L. 35, 14. — **Hypomycetes** 31, 73. — **Hypnum** arcuatum Ldbg. 32, 281; cypressiforme L. 32, 280; Halleri L. fil. 35, 11; incurvatum Schrad. 32, 279; pallescens Br. Eur. 32, 280; pratense Koch 32, 282; reptile Mich. 32, 280; Vaucherii Lesqu. 32, 280. — **Hyssopus** officinalis L. 32, 69; 33, 63.

Impatiens parviflora DC. 35, 22. — **Inocybe** frumentacea (Bull.) 35, 11. — **Inula** britannica L. 35, 32; ensifolia L. 33, 29; germanica L. 31, 53; 35, 32; hirta L. 35, 14; salicina L. 35, 14; 22; 32. — **Iris** aphylla L. 33, 51; 34, 11; 35, 14; bohemica Schmidt 33, 52; germanica L. 33, 52; sibirica L. 35, 30; **Isatis** praecox W. K. 35, 23; tinctoria L. 33, 55. — **Isopterygium** elegans (Hook.) Ldb. 32, 225; Muelleri Sch. 32, 226; silesiacum Br. et Sch. 32, 226. — **Isothecium** myosuroides L. 32, 222; viviparum (Neck.) Ldb. 32, 222.

Jasione montana major Koch 35, 24. — **Juncus** filiformis L. 35, 20; Gerardi Loisl. 31, 14; 17; sphaerocephalus Nees 33, 70; subnodulosus Schrk. 35, 30. — **Juniperus** nana W. 35, 25. — **Jurinea** mollis Rchb. 33, 29.

Kentrophyllum lanatum L. 35, 23. — **Knautia** arvensis Coult. 35, 22; campestris Bess. 35, 22; silvatica Duby 35, 21. — **Koeleria** cristata ciliata Kern. 35, 24; gracilis Pers. 35, 14.

Lactuca muralis L. 33, 65; perennis L. 33, 65; quercina L. 33, 65; saligna L. 35, 32; sativa (L.) 33, 65. — **Laestadia** Rosae Auersw. 35, 10. — **Lamium** 31, 75. — **Lappa** nemorosa Koern. 35, 25. — **Lappula** echinata Gil. 35, 22. — **Lathyrus** montanus Bernh. 33, 56; pratensis sepium Scop. 35, 23; sativus L. 35, 23. — **Lavatera** thuringiaca L. 35, 4. — **Ledum** palustre L. 33, 62. — **Lentinus** hispidus (Fr.) 35, 11. — **Leonurus** Cardiaca L. var. chaituroides Vollm. 35, 8; dissectus 35, 8; Marrubiastrum N. A. Busch 35, 9; villosus Desf. 35, 4. — **Lepidium** campestre (L.) 33, 55. — **Lepiota** amianthina (Scop.) 35, 11; pudica (Bull.) 35, 11. — **Leptobryum** pyriforme L. 32, 189. — **Leptosphaeria** ophioboloides Sacc. 35, 10. — **Leptostromataceen** 31, 73. — **Leptothyrella** 31, 74. — **Lescuraea** striata Schwg. 32, 236. — **Leskea** nervosa Schwg. 32, 235; polycarpa Ehrh. 32, 235. — **Leucobryum** glaucum L. 32, 134. — **Leucodon** sciuroides L. 32, 221. — **Leucojum** vernum L. 33, 51. — **Ligustrum** vulgare L. 33, 61. — **Limacium** Russula (Schaeff.) 35, 11. — **Limnanthus** Douglasii R. Br. 35, 22. — **Linaria** Elatine Mill. 35, 24; vulgaris Mill. 34, 13; 21. — **Linosyris** vulgaris Cass. 35, 7. — **Linum** austriacum L. 35, 4; tenuifolium L. 34, 13; 20. — **Lithospermum** purpureo-coeruleum L. 35, 14. — **Lolium** perenne L. 31, 78. — **Lunularia** cruciata (L.) Dum. 35, 5. — **Lupinus** polyphyllus Lindl. 35, 25. — **Lycopodium** Selago L. 34, 21. — **Lysimachia** punctata L. 35, 4; vulgaris L. f. maculata (= Klingraeffii Abrom.) 34, 20. — **Lythrum** Hyssopifolia L. 33, 59; Salicaria L. var. glabricaule Koehne 35, 8.

Macrobiophthora vimariensis Reukauf 31, 76. — **Magnoliaceae** 35, 6. — **Malacosphagnum** C. M. 31, 4. — **Malva** Alcea L. 35, 22; fastigiata Cav. 35, 24; moschata L. 33, 59. — **Marrubium** creticum Mill. 31, 29; 33, 63; ~~×~~ vulgare 31, 29; 33, 63; leonuroides Desr. 35, 9; vulgare L. 31, 29. —

Marssonina Potentillae (Desm.) 31, 73. — **Matricaria** discoidea DC. 35, 4; 21; 22; suaveolens (Pursh) Buch 35, 31. — **Meesia** trichodes (L.) Spruce 32, 209; triquetra (L.) Ang. 32, 209. — **Melanconieen** 31, 71. — **Melica** Aschersonii M. Sch. 33, 6; ciliata L. 35, 20; 22; picta C. Koch 31, 77; transsilvanica Schur 35, 7; uniflora L. 35, 22. — **Melilotus** albus Desr. 35, 22; dentatus (W. K.) 31, 14; 17. — **Melittis** Melissophyllum L. 33, 63. — **Melosira** subflexilis 33, 69. — **Mespilus** germanica L. 31, 67. — **Mildeella** bryoides Dicks. 32, 156. — **Mimulus** luteus L. 35, 25; 31. — **Mniobryum** albicans Wahlb. 32, 194; carneum L. 32, 194. — **Mnium** affine Bland. 32, 205; cinctidioides Blytt 32, 206; cuspidatum Hedw. 32, 205; hornum L. 32, 206; marginatum Dicks. 32, 207; orthorhynchum Br. Eur. 32, 207; punctatum Hedw. 32, 206; riparium Mitt. 32, 207; rostratum Schrad. 32, 206; rugicum Laur. 32, 205; Seligeri Jur. 32, 205; spinosum Voit. 32, 207; spinulosum Br. et Sch. 32, 207; stellare Hedw. 32, 208; subglobosum Br. Eur. 32, 206; undulatum Hedw. 32, 206. — **Moehringia** trinervia Clrv. 35, 10. — **Mollusca** Schl. 31, 4. — **Monanthes** agriostaphys (Webb) Christ 35, 5. — **Montia** minor Gmel. 35, 20. — **Mulgedium** alpinum Cass. 35, 21. — **Muscari** botryoides (L.) fl. alb. 33, 51; comosum (L.) 33, 50; 35, 20; tenuiflorum Tsch. 33, 50; 35, 10. — **Mycena** acicula (Schaeft.) 35, 11; rubrimarginata (Fr.) 35, 11. — **Mycosphaerella** syringicola Otth 35, 10. — **Myosotis** hispida Schlecht. 34, 20; \times intermedia 34, 20. — **Myrica** Gale L. 33, 53. — **Myxofusicoccum** 31, 73. — **Myxosporium** 31, 74.

Nardus stricta L. 33, 70. — **Nasturtium** officinale (L.) 33, 55. — **Neckera** complanata L. 32, 220; crispa L. 32, 220; pennata Dill. 32, 219; pumila Hedw. 32, 220; turgida Jur. 32, 220. — **Nepeta** Cataria L. 35, 25. — **Nigella** arvensis L. 33, 40; 55. — **Nitschiella** Costerium 33, 69. — **Nivieria** Seringe 33, 16. — **Nonnea** pulla DC. 35, 21; rosea Fisch. et Mey. 35, 22. — **Nyctalis** asterophora (Fr.) 35, 11. — **Nymphaea** alba L. 35, 20.

Obione pedunculata (L.) 31, 14; 17; 19; 33, 61. — **Octodiceras** Julianum Savi 32, 218. — **Odontites** lutea Rchb. 31, 38; rubra Pers. 31, 21. — **Oenanthe** fistulosa L. 35, 31. — **Oligotrichum** hercynicum Ehrh. 32, 106. — **Oligotrophus** Corni Giraud 35, 9. — **Onobrychis** arenaria (Kit.) 31, 35; 76; montana (Schwabe Fl. Anh.) 31, 38; sativa Lmk. 35, 4; 9; 24; viciaefolia Scop. 31, 38. — **Ononis** repens L. 35, 14. — **Onopordon** tauricum W. 35, 4. — **Ophioglossum** vulgatum L. 35, 10; 30. — **Ophrys** apifera Huds. 35, 10; f. aurita Moggr. 35, 10; 24; Muteliae Mut. 35, 24; aranifera Hds. 31, 69; \times muscifera 31, 69; 33, 4; fuciflora (Crantz.) 31, 69; muscifera Hds. f. apiculata 35, 24. — **Orchis** fusca Jcq. B. rotundata Wirtg. 35, 24; Haussknechtii M. Sch. 33, 5; incarnata L. 35, 31; maculata L. f. albiflora 35, 23; f. comosa Schur 35, 24; Ruthei 33, 6; tridentata Scop. 35, 20. — **Oreoweisia** Bruntoni Not. 32, 123. — **Origanum** vulgare L. 35, 14; 22. — **Ornithogalum** tenuifolium Guss. 34, 13. — **Ornithopus** perpusillus L. 35, 20; sativus Brot. 35, 4. — **Orobanche** lutea Baumg. 35, 31; rubens Wallr. 35, 25; vulgare Poir. 35, 31. — **Orobus** niger L. 35, 24. — **Orthothecium** intricatum Hartm. 32, 223. — **Orthotrichum** affine Schrad. 32, 182; anomalum Hedw. 32, 181; cupulatum Hffm. 32, 181; diaphanum Schrad. 32, 184; fastigiatum Bruch 32, 183; leiocarpum Br. et Sch. 32, 185; leucomitrium Br. Eur. 32, 183; Lyellii Hook. et Tayl. 32, 184; nudum Dicks. 32, 181; obtusifolium Schrad. 32, 182; pallens Bruch 32, 184; patens Bruch 32, 183; pumilum Swartz 32, 184; rupestre Schleich. 32, 182; Schimperi Hammar 32, 183; speciosum Nees 32, 183; stramineum Hsch. 32, 183; Sturmii Hppe. et H. 32, 181; tenellum Bruch 32, 184. — **Otthia**

Crataegi Fuck. 35, 10. — *Oxalis Acetosella* L. 35, 23. — *Oxytropis pilosa* DC. 31, 53. — *Oxyrrhynchium pumilum* (Wils.) Sch. 32, 249; rusciforme Weis 32, 250; Schleicheri Brid. 32, 249; speciosum Brid. 32, 249; Swartzii Turn. 32, 249.

Paludella squarrosa L. 32, 209. — **Papaver** 33, 56. — **Parietaria officinalis** L. 33, 39; 35, 21; 22. — **Pastinaca sativa** L. 31, 21. — **Pedicularis silvatica** L. 33, 70. — **Penicillium** 31, 75. — **Peporis** Portula L. 35, 21. — **Pestalozzia** Palmarum 31, 73. — **Petasites albus** (L.) 33, 65. — **Peucedanum Cervaria** (L.) 33, 60; 35, 22; 31; officinale L. 35, 14; *Oreoselinum* (L.) 33, 60. — **Phascum curvicollum** Hedw. 32, 156; cuspidatum Schreb. 32, 156; Floerkei Web. et M. 32, 156; piliferum Schreb. 32, 156. — **Phegopteris** Dryopteris (L.) 33, 50. — **Philadelphus** Falconeri Sarg. 35, 7; Falconeri \times laxus 35, 7. — **Philonotis** Arnelli Husn. 32, 213; caespitosa Wils. 32, 212; calcarea Br. Eur. 32, 211; fontana L. 32, 212; marchica Brid. 32, 213; Osterwaldii Warnst. 32, 213; Schliephackei Rl. 31, 5; seriata Mitt. 32, 212; Tomentella Mol. 32, 212. — **Phragmites** 35, 10. — **Phyllitis** Hemionitis (Lag.) O. Ktze. 33, 7; hybrida (Milde) Christensen 33, 7; 78; *Scolopendrium* (L.) Newman 33, 10. — **Physalis** Alkekengi L. 33, 63. — **Physcomitrella** patens (Hedw.) 32, 187. — **Physcomitrium** eurystoma Sendtn. 32, 188; pyriforme L. 32, 188; sphaericum Schwgr. 32, 187. — **Phyteuma** orbiculare L. 35, 31. — **Picris** echioides L. 35, 22. — **Pimpinella** Saxifraga L. 33, 59; 35, 14. — **Pirus Aria** (L.) Ehrh. 35, 22; communis L. 33, 57; *Malus* L. 33, 58. — **Plagiobryum** Zierii (Dicks) Ldb. 32, 195. — **Plagiopus** Oederi Gunn. 32, 210. — **Plagiothecium** curvifolium Schl. 31, 5; 32, 228; denticulatum L. 32, 227; var. recurvum W. 31, 5; latebricola Wils. 32, 227; Roesei Hpe. 32, 228; Ruthei Spr. 32, 230; silvaticum L. 32, 229; succulentum Spr. 32, 229; undulatum L. 32, 230. — **Plantago** arenaria W. et K. 33, 63; Coronopus L. 33, 64; maritima L. 31, 17; 35, 4; var. dentata Roth 33, 64. — **Platyglossis** 31, 57. — **Platygyrium** serpens Brid. 32, 224. — **Platysphagnum** C. M. 31, 4. — **Pleuridium** alternifolium Hp. 32, 111; nitidum Hedw. 32, 111; subulatum L. 32, 111. — **Pleurochaete squarrosa** Brid. 32, 142. — **Pleurosigma** aestuarii 33, 69. — **Pleuroweisia** Schliephackei Spr. 31, 5. — **Poa** badensis Haenke 31, 53; Chaixi Vill. 35, 25; persica Trin. 33, 78; pratensis L. 31, 20; songarica Schrenk 33, 78. — **Polygonatum** aloides Hedw. 32, 107; alpinum L. 32, 108; decipiens Spr. 32, 108; nanum Dill. 32, 107; urnigerum L. 32, 107. — **Pohlia** annotina Leers 32, 192; commutata Sch. 32, 193; cruda Schreb. 32, 191; elongata Dicks. 32, 190; gracilis Not. 32, 193; lutescens Spr. 32, 193; nutans Schreb. 32, 191; prolifera Ldbg. 32, 193. — **Polygala** major Jcq. 33, 29. — **Polygonatum officinale** All. 35, 14; verticillatum L. 33, 50. — **Polygonum amphibium** L. 33, 53; aviculare L. 33, 59; dumetorum L. 35, 22; lapathifolium L. 35, 10; molliaeforme Boiss. 33, 78; rottboellioides Jaub. et Spach 33, 78. — **Polytrichum commune** L. 32, 110; formosum Hedw. 32, 109; gracile Menz. 32, 109; juniperinum Hedw. 32, 109; piliferum Schreb. 32, 109; strictum Menz. 32, 109. — **Potamogeton** marinus L. 31, 14. — **Potentilla** 34, 21; alba L. 33, 29; arenaria Borkh. 33, 29; canescens Bess. 33, 29; 57; norvegica L. 35, 11; patula W. K. 33, 29; pilosa W. 35, 23; procumbens Sibth. 33, 70; \times *Tomentilla* 33, 70; recta L. 33, 57; supina L. 35, 31; verna L. 35, 14. — **Pottia** crinita Wils. 32, 158; intermedia (Turn.) Fuernr. 32, 158; Heimii Hedw. 32, 159; lanceolata Dicks. 32, 158; minutula (Schleich.) 32, 157; mutica (Vent.) 32, 159; Starkei Hedw. 32, 159; truncata L. 32, 158. — **Prenanthes** purpurea L. 33, 65; 35, 10; 24. — **Prunus** acida K. Koch 31, 49; Cerasus L. 31, 49; 33, 27; \times fruticosa 31, 47; 33, 28; Chamaecerasus Jcq.

31, 42; *eminens* Beck 33, 28; *fruticosa* Pallas 31, 40; 33, 25; 29; 57; var. *dispar* Beck. 33, 26; *friburgensis* A. Sch. 34, 11; *sativa* Rchb. 31, 49; 33, 27; var. *typica* Schneider 33, 26; *serotina* Ehrh. 35, 25; *spinosa* L. 31, 44; 35, 14; *coaetanea* Wimm. et Grab. 35, 23. — ***Psalliota echinata*** (Roth) 35, 11. — ***Pseudoleskea atrovirens*** Dicks. 32, 235; *catenulata* Brid. 32, 236; *tectorum* Al. Br. 32, 236. — ***Pseudopycnidiales*** 31, 73. — ***Pteridium aquilinum*** (L.) Kuhn. 35, 22. — ***Pterigynandrum filiforme*** (Timm.) 32, 224. — ***Pterogonium ornithopodioides*** (Hedw.) Ldb. 32, 222. — ***Pterygoneuron cavifolium*** Ehrh. 32, 160; *lamellatum* (Ldb.) Jur. 32, 160; *subsessile* Brid. 32, 159. — ***Ptilium Crista castrensis*** L. 32, 283. — ***Pulmonaria angustifolia*** L. var. *australis* Murr 33, 76; *mollissima* Kern. 33, 77; *obscura* Dum. 33, 77; *officinalis* L. 33, 77; *rubra* Schott et Ky. 33, 77; *saccharata* Mill. 33, 77; *tuberosa* Schrk. 33, 77. — ***Pulsatilla*** 33, 47; *vulgaris* Mill. 35, 14. — ***Pycnosphagnum*** C. M. 31, 4. — ***Pycnothyrieen*** 31, 73. — ***Pylaisia polyantha*** Schreb. 32, 224. — ***Pyramidula tetragona*** Brid. 32, 188.

Quercus lanuginosa Lam. var. *Kitaibelii* Simk. 35, 9; *prionota* G. Beck. 35, 9; *subvelutina* Pospich 35, 9; *pedunculata* Ehrh. 33, 53; *Robur* L. 35, 9; \times *sessilis* 35, 5; *sessilis* Ehrh. 33, 53; 35, 9.

Racomitrium aciculare L. 32, 174; *affine* Schleich. 32, 175; *canescens* Hedw. 32, 177; *fasciculare* Schrad. 32, 175; *heterostichum* Hedw. 32, 175; *lanuginosum* (Hedw.) Brid. 32, 176; *microcarpon* Hedw. 32, 176; *protensum* Al. Br. 32, 174; *sudeticum* Funck 32, 174. — ***Ramularia Moehringiae*** Lindr. 35, 10. — ***Ranunculus*** 33, 47; *acris* L. 35, 8; *platanifolius* L. 33, 54; *Stevenii* Andrz. 35, 8. — ***Raphanus sativus*** L. 33, 56. — ***Rapistrum perenne*** (L.) All. 35, 22; 31; *rugosum* All. 35, 24. — ***Reseda alba*** L. 35, 22. — ***Rhabdo-weisia denticulata*** Brid. 32, 122; *fugax* Hedw. 32, 122. — ***Rhacophorus*** 31, 58. — ***Rhinanthus angustifolius*** Gmel. 35, 10. — ***Rhodobryum roseum*** Schreb. 32, 203. — ***Rhynchostegium algirianum*** Brid. 32, 252; *confertum* Dicks. 32, 253; *curvisetum* (Brid.) Ldb. 32, 252; *depressum* (Bruch) 32, 254; *litoreum* Not. 32, 252; *megalopolitanum* Bland. 32, 253; *murale* Hedw. 32, 253; *rotundifolium* Scop. 32, 254. — ***Rhytidium rugosum*** Ehrh. 32, 283. — ***Ribes alpinum*** L. 35, 22. — ***Rigida*** Schl. 31, 4. — ***Rosa Dufftii*** 33, 5; *elliptica* Tsch. 35, 22; *Haeckelii* Dufft et M. Sch. 33, 5; *jenensis* M. Sch. 33, 5; *provincialis* Ait. 34, 21; *rubiginosa* L. 33, 6; 35, 10. — ***Rubus Aschersonii*** Sprib. 35, 28; *acuminatus* Lindeb. 35, 28; *Bellardii* W. et N. 35, 23; 26; *caesius* \times *bifrons* Greml. 35, 28; *Sudre* 35, 28; \times *epipsilus* Zinsm. 35, 27; \times *hirtus* Sudre 35, 27; *candidans* Whe. 35, 27; \times *caesius* Sudre 35, 28; *chlorophyllus* Greml. 35, 27; *dollnensis* Sprib. 35, 27; *dumetorum* W. N 35, 9; *fa. platypetalus* G. Braun 35, 27; *erraticus* \times *caesius* Sudre 35, 28; *fabrimontanus* Sprib. 35, 28; *fasciculatus* P. J. Müll. 35, 28; *gothicus* Frid. et Gel. 35, 28; *C. Aschersonii* Focke 35, 28; *gratus* \times *caesius* Sudre 35, 28; *hirtus* \times *caesius* Sudre 35, 27; *Koehleri* \times *caesius* Sudre 35, 27; *Mikani Baenitz* 35, 28; *Mougeotii* Bill. 35, 28; *nemoralis* Aresch. 35, 28; *Arrh.* 35, 28; *nemorosus* b. *montanus* Wimm. 35, 27; *nitidus* W. et N. 35, 26; \times *caesius* Sudre 35, 27; *oreogeton* Focke 35, 27; f. *ruber* Baenitz 35, 28; *plicatus* W. et N. 35, 26; *Radula* W. 35, 26; *rhombifolius* \times *caesius* Sudre 35, 27; *rivularis* P. J. Müll. ssp. *setiger* Lef. et Müll. var. *cordiger* Müll. et Wirtg. 35, 27; ssp. *spinulosus* Sudre 35, 27; *Schleicheri* Whe. 35, 27; *senticosus* Koehler 35, 26; f. *umbrosa* 35, 26; *serpens* \times *caesius* Sudre 35, 27; *serrulatus* Lindeb. 35, 27; *silesiacus* \times *caesius* Sudre 35, 28; *spinosissimus* P. J. Müll. var. 35, 27; *Sprengelii* W. 35, 26; *subaculeatus* Borb. 35, 27; *suberectus* Anderson 35, 23; 26;

subtilissimus Sudre 35, 27; thyrsanthus Focke 35, 22; 26; thyrsoideus \times caesius Sudre 35, 28; Villarsianus Focke 35, 27; virgultorum Müll. 35, 28; var. Aschersonii (Sprib.) Sudre 35, 28; Warnstorffii Focke 35, 28; Zinsmeisteri Erdner 35, 27. — **Rumex aquaticus** \times **crispus** \times **obtusifolius** 34, 20; **densiflorus** Metsch 34, 20; Dufftii Hsskn. 34, 20; 35, 22; **Patientia** L. 35, 7; **subulatus** Rechinger 34, 20. — **Ruppia rostellata** Kch. 31, 14; 24. — **Russula albonigra** (Krombh.) 35, 11. — **Ruta graveolens** L. 31, 67; 33, 59; 34, 11.

Sagittaria montevidensis Cham. et Schlechtd. 34, 13. — **Salicornia herbacea** L. 31, 14; 17; 33, 53. — **Salix** 33, 53; **babylonica** \times **fragilis** 35, 9; **repens** L. 33, 70; 35, 31. — **Salsola fruticosa** L. 33, 54. — **Salvia** 31, 75; **pratensis** L. 35, 4; 14; **verticillata** L. 35, 24. — **Sambucus racemosa** L. 35, 22. — **Samolus Valerandi** L. 31, 11; 14; 17. — **Sanguisorba minor** Scop. 35, 14; **officinalis** L. 33, 57. — **Sanicula europaea** L. 33, 39; 35, 22. — **Sarrothamnus scoparius** (L.) 33, 39; 56. — **Satureja** Clinopodium Briqu. 35, 4. — **Saxifraga decipiens** Ehrh. 35, 21. — **Scabiosa canescens** W. K. 31, 38; 53; 35, 14; **Columbaria** L. 34, 21; f. **albiflora** 35, 23; **ochroleuca** L. 31, 38; 35, 14. — **Schistidium alpicola** Sw. 32, 168; **apocarpum** (L.) Hedw. 32, 167; **confertum** Funck 32, 168; **gracile** Schleich. 32, 168; **pulvinatum** Brid. 32, 168; **rivulare** Brid. 32, 167. — **Schistostega osmundacea** Dicks. 32, 189. — **Schliephackea prostrata** C. M. 31, 5. — **Scilla autumnalis** L. 35, 5. — **Scirpus maritimus** L. 31, 11; **Tabernaemontani** Gmel. 31, 11. — **Scleropodium illecebrum** (Schwg.) 32, 245; **purum** L. 32, 245. — **Scolopendrium hybridum** Milde 33, 7; **vulgare** Sm. 33, 10. — **Scorpidium scorpioides** L. 32, 276. — **Scorzonera** 33, 66; **hispanica** L. 31, 54; f. **aspodeoides** Wallr. 35, 22; f. **glastifolia** Willd. 35, 22; **humilis** L. 35, 32. — **Scrophularia alata** Gil. 35, 22. — **Sedum acre** L. 33, 39; **album** L. 33, 39; **altissimum** Poir. 33, 34; **nicaeense** Alb. 33, 34. — **Seligeria calcarea** (Dicks.) 32, 118; **Doniana** (Sm.) C. Müll. 32, 117; **pusilla** Hedw. 32, 117; **recurvata** Hedw. 32, 118; **tristicha** Brid. 32, 118. — **Sempervivum barbatum** Webb 33, 33; **Bentejui** (Webb) Chr. 33, 33; **caespitosum** Chr. Sm. 33, 33; **cruentum** (Webb) Chr. 33, 33; **cuneatum** (Webb) Chr. 33, 35; **Haworthii** (Webb) Chr. 33, 35; \times **urbicum** 33, 35; **sediforme** Jacq. 33, 34; **Smithii** (Webb) Chr. 33, 32; 69; **soboliferum** Sims. 35, 21; **strepsicladum** (Webb) Chr. 33, 33; **urbicum** Chr. Sm. 33, 35. — **Senecio erucifolius** L. 35, 25; 32; **fluviatilis** Wallr. 35, 25; **Jacobaea** L. f. **discoideus** W. et Grab. 35, 21; 22; **spathulifolius** DC. 35, 32; **vernalis** W. et K. 35, 24. — **Septoria Trachelii** Allesch. 35, 10. — **Seseli annuum** L. 31, 38; 33, 60; **Hippomarathrum** L. 31, 38; 35, 14; **Libanotis** (L.) 33, 60. — **Sesleria** 31, 68. — **Sibbaldia** 34, 21. — **Sideritis montana** L. 35, 23. — **Silene chlorantha** Ehrh. 33, 29; **dichotoma** Ehrh. 35, 22; 35, 31; **Otites** (L.) 31, 50; 76; 79; 34, 11; **vulgaris** (Mnch.) Gcke. 35, 4. — **Sisymbrium austriacum** Jcq. 35, 11; **Columnae** Jcq. 35, 24; **Loeselii** L. 35, 4; **orientale** L. 35, 4; **Sinapis** Crntz. 35, 20. — **Solidago Virga aurea** L. 35, 14. — **Sorbus** 34, 21; **Aria** \times **aucuparia** 35, 25; \times **torminalis** 31, 67; **domestica** L. 35, 25; **torminalis** L. 33, 57; 35, 14. — **Sparganium simplex** Hds. 35, 22. — **Spenceria ramalana** Trim. 34, 20. — **Spergularia marginata** (DC.) 31, 14; 17; 19; 54; **salina** Presl 31, 14; 17; 19; 33, 54; 35, 20. — **Sphaeropsideen** 31, 71. — **Sphagnum** 32, 50; **acutifolium** Ehrh. 31, 4; 32, 55; **acutiforme** Schl. et W 31, 4; **auriculatum** Sch. 32, 91; **balticum** Russ. 32, 80; **brevifolium** Rl. 31, 3; 32, 78; **compactum** DC. 31, 4; 32, 83; **contortum** Schltz. 32, 90; **cupressiforme** Rl. 32, 87; **cuspidatum** Ehrh. 31, 3; 32, 72; **Dusenii** Jens. 32, 71; **fallax** Kling. 31, 4; 32, 75; **fimbriatum** Wils. 31, 2; 32, 66; **fuscum** Kling. 32, 59; **Girgensohnii** Russ. 31, 3;

XII

32, 62; imbricatum Hornsch. 31, 3; 32, 100; inundatum Russ. 32, 88; Klinggraeffii Rl. 31, 3; 32, 99; laricinum Spruce 31, 4; 32, 93; ligulatum Rl. 32, 80; magellanicum Brid. 31, 4; 32, 95; molle Sulliv. 32, 52; obtusum W. 32, 73; palustre L. 31, 4; 32, 97; papillosum Ldbg. 31, 3; 32, 100; platyphyllum Sull. 32, 94; plumulosum Rl. 32, 53; pseudocontortum Rl. 32, 87; pseudomolluscum Rl. 32, 70; pseudopatulum (Schl.) Rl. 32, 60; pseudorecurvum Rl. 32, 75; pseudoserratum Rl. 31, 3; 32, 73; pseudoturgidum Rl. 32, 88; pulchrum (Ldbg.) W. 32, 76; pungens Roth 32, 88; quinquefarium (Ldbg.) W. 32, 54; recurvum Pal. 31, 3; 32, 76; riparium Ang. 32, 73; robustum (Russ.) Rl. 32, 60; Roellii (Schl.) Roth 32, 74; Rothii Rl. 32, 74; Schimperi Rl. 31, 3; 32, 52; Schliephackei Rl. 31, 3; 5; 32, 71; squarrosum Pers. 32, 82; Stollei Rl. 32, 74; subbicolor Hpe. 32, 96; subsecundum Nees 31, 3; 32, 86; tenellum Ehrh. 32, 69; teres Ang. 31, 3; 32, 81; turgidum Rl. 32, 92; Warnstorffii Russ. 32, 59; Wilsoni Rl. 32, 57. — **Splachnum** ampullaceum L. 32, 186; sphaericum L. fil. 32, 185. — **Squarrosa** Schl. 31, 4. — **Stachys** ambigua Sm. 35, 25; germanica L. 33, 63; palustris × silvatica 35, 5; recta L. 33, 29; 35, 14; 22; sideritoides C. Koch 35, 4. — **Statice** Limonium L. 35, 21. — **Stellaria** Friesiana Ser. 33, 76. — **Stenorhynchium** 31, 57. — **Stipa** capillata L. 31, 38; 53; 54; 35, 14; Joannis Cel. 35, 14. — **Stromaticae** 31, 73. — **Struthiopteris** germanica Willd. 33, 49. — **Suaeda** maritima (L.) 31, 14; 17; 19; 33, 54. — **Subsecunda** Schl. 31, 4. — **Surirella** Gemma Cohn 33, 69; striatula Turpin 33, 69. — **Symphytum** officinale L 33, 61. — **Synedra** affinis 33, 69; laevis 33, 69. — **Syringa** 35, 10.

Taxus 35, 9. — **Tayloria** tenuis Dicks. 32, 185. — **Tetragonolobus** 31, 25. — **Tetradontium** Brownianum Dicks. 32, 105. — **Teucrium** Botrys L. 35, 22; Chamaedrys L. 31, 69; 33, 29; 62; 35, 14; 22; montanum L. 31, 38; 79; 33, 62; 35, 21; Scordium L. 33, 62; 35, 21; Scorodonia L. 35, 21. — **Thalictrum** aquilegifolium L. 35, 20; flexuosum Bernh. 35, 14; minus L. 35, 31. — **Thamnium** alopecurum L. 32, 286; 34, 22. — **Thesium** intermedium Schr. 35, 14. — **Thlaspi** montanum L. 31, 68; 34, 10. — **Thuidium** abietinum L. 32, 237; delicatulum (L.) Ldb. 32, 237; Philiberti Spr. 32, 237; pseudotamarisci Spr. 32, 237; recognitum Ldbg. 32, 237; tamariscinum Hedw. 32, 237. — **Thymus** Celakovskyanus M. Sch. 33, 6; Serpyllum L. 35, 14. — **Timmia** megapolitana Hedw. 32, 213. — **Tofieldia** calyculata Whlbg. 31, 75. — **Torgesia** Bornm. 34, 8. — **Torilis** infesta K. 35, 23. — **Tortella** inclinata Schwgr. 32, 141; tortuosa L. 32, 142. — **Tortula** aestiva Brid. 32, 162; calcicola Grebe 32, 164; Fiorii Vent. 32, 164; laevipila Brid. 32, 163; latipila Bruch 32, 163; montana Nees. 32, 164; muralis L. 32, 162; obtusifolia Schleich. 32, 162; papillosa Wils. 32, 163; pulvinata Jur. 32, 163; ruralis L. 32, 163; subulata L. 32, 162. — **Tragopogon** 33, 66; major Jcq. 35, 10; orientalis L. 31, 78; 35, 22; pratensis L. 31, 78. — **Trapa** natans L. 33, 57. — **Trematodon** ambiguus Hedw. 32, 110. — **Tribulus** terrestris L. 35, 23. — **Trichodon** tenuifolius (Schrad.) Ldb. 32, 112. — **Tricholoma** nudum (Bull.) 35, 11; personatum (Fr.) 35, 11. — **Trichostomum** caespitosum Bruch 32, 140; crispulum Bruch 32, 140; mutabile Bruch 32, 141; pallidisetum H. Müll. 32, 140; viridulum Bruch 32, 141. — **Trientalis** europaea L. 33, 61. — **Trifolium** alpestre L. var. glabratum Klinggr. 35, 23; fragiferum L. 31, 11; 35, 24; montanum L. 35, 31; pratense L. 31, 31; rubens L. 35, 31; striatum L. 35, 31. — **Triglochin** maritima L. 31, 14; 17; palustris L. 35, 30. — **Trinia** Kitaibelii M. B. 33, 29. — **Triticum** aegilopoides (Link) 33, 11; boeticum Boiss. 33, 12; 71; Thaoudar Reuter 33, 12; caninum L. 35, 25; compactum 33, 11; dicoccoides Koern. 31, 63; f. Kotschyana A. Sch. 31, 63; f. Straussiana

A. Sch. 31, 62; 33, 15; *dicoccum* Schrank 31, 62; 33, 11; 34, 13; *dicoccoides* Koern. 33, 11; *Haussknechtianum* A. Sch. 34, 14; *durum* Desf. 33, 11; *monococcum* L. 33, 11; 34, 20; *Hornemannii* Clem. 33, 13; *nigrescens* Pancić 33, 13; *polonicum* L. 33, 11; *repens* L. 31, 21; *Spelta* L. 33, 11; 34, 20; *turgidum* L. 33, 11; *vulgare* Vill. 33, 11; *trojanum* Wittm. 33, 14. — **Trochodendraceae** 35, 6. — **Trollius europaeus** L. 35, 31. — **Tulipa silvestris** L. 35, 30. — **Tussilago Farfara** L. 33, 65. — **Typha angustifolia** L. 35, 30.

Uloota americana (Pal.) Mitt. 32, 180; *Bruchii* Hornsch. 32, 179; *crispa* Hedw. 32, 179; *crispula* Br. 32, 180; *intermedia* Sch. 32, 179; *Ludwigii* Brid. 32, 179. — **Urocystis Colchici** (Schlechtd.) Rhb. 33, 70; 35, 10. — **Urtica pilulifera** L. 31, 34. — **Ustilago utriculosa** (Nees) Tul. 35, 10; *Vaillantii* Tul. 35, 10.

Vaccaria pyramidata Med. 33, 54; 35, 31. — **Vaccinium Oxyccocos** L. 33, 61. — **Valeriana sambucifolia** Mik. 35, 24. — **Valerianella Auricula** DC. 35, 24; *carinata* Loisl. 35, 4; 24. — **Verbascum** 34, 21; *nigrum* L. 35, 22. — **Veronica acinifolia** L. 33, 77; *biloba* L. 33, 77; *glaberrima* Boiss. et Bal. 33, 77; *nudicaulis* Kur. et Kir. 33, 77; *scutellata* L. 35, 23; *Tournefortii* Gmel. 31, 63. — **Viburnum Lantana** L. 35, 14. — **Vicia Cracca** L. 35, 23; *sativa* L. f. *albiflora* 35, 23; *segetalis* Thuill. 35, 23; *sepium* L. 35, 24; *tenuifolia* Roth 35, 23; *villosa* Roth B. *glabrescens* Koch 35, 24. — **Vinca minor** L. 35, 14. — **Vincetoxicum fuscatum** Rchb. 35, 8; \times *officinale* 35, 8; *Haussknechtii* M. Sch. 35, 8; *officinale* Mnch. 35, 8; var. *Haussknechtii* Bornm. 35, 8. — **Viola ambigua** W. K. 33, 29; *arenaria* DC. 31, 38; *hirta* L. 33, 29; 35, 14; *pumila* Chaix 33, 29; 67; 35, 31; *silvestris* Lam. 34, 21; *stagnina* Kit. 33, 29; *tricolor* L. 34, 21. — **Viscum album** L. 35, 4. — **Volvaria plumulosa** (Lasch) 35, 11.

Waldsteinia geoides Willd. 33, 77. — **Weisia crispata** (Br. Germ.) Jur. 32, 138; *rutilans* (Hedw.) Ldb. 32, 137; *viridula* (L.) Brid. 32, 137. — **Wojnowicia graminis** (Mc. Alp.) Sacc. 35, 10.

Zannichellia palustris L. 35, 20; *pedicellata* Whlbg. 31, 14; 25. — **Zygodon rupestris** Sch. 32, 179; *viridissimus* Dicks. 32, 179.



Verzeichnis

der in den „Mitteilungen“ des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, Heft 31 (1914) bis Heft 35 (1921) enthaltenen Abhandlungen.

Becker, W., <i>Viola pumila Chaix</i> , eine xerophile Pflanze des pontischen Elements.....	Heft 33, S. 28
Bliedner, A., Weitere Beiträge zur Flora von Eisenach....	„ 35, „ 23
Bornmüller, J., Zwei neue <i>Astragalus</i> -Arten der Flora Persiens. Mit 2 Tafeln	„ 31, „ 56
Ueber Brutknospen- und Gabelbildung an Wedeln von <i>Phyllitis hybrida (Milde)</i> Christensen. Mit 1 Tafel	„ 33, „ 7
Einige Bemerkungen über die Verbreitung von <i>Alopecurus setariooides</i> Gren.	„ 33, „ 30
Teratologisches an <i>Sempervivum (Aeonium) Smithii (Webb)</i> Christ und einigen anderen canarischen Semperviven..	„ 33, „ 32
Bemerkungen zu <i>Carex pilosa Scop.</i> in Thüringen	„ 35, „ 29
Ueber eine adventive <i>Elsholzia</i> bei Merseburg	„ 35, „ 32
Diedicke, H., Professor B. Hergt †.....	„ 35, „ 1
Eckardt, W. R., Der Kaiserling (<i>Amanita caesarea</i>) an der bayrisch-meiningischen Grenze.....	„ 35, „ 25
Henkel, A., Beiträge zur Flora von Weimar	„ 35, „ 30
Hergt, B., Oberstabsarzt Dr. Emil Torges †.....	„ 34, „ 1
Holzfuß, E., Beitrag zur Brombeerflora von Thüringen	„ 35, „ 26
Reinecke, Karl L., Weitere Beiträge zur Thüringer Flora ..	„ 35, „ 21
Rettig, E., Max Schulze †.....	„ 33, „ 1
Röll, J., Meine Erinnerungen an Dr. Karl Schliephacke.. Die Thüringer Torfmoose und Laubmose und ihre geographische Verbreitung	„ 31, „ 1
Schulz, A., Abstammung und Heimat des Saathafers	„ 32, „ 1
Ueber die Ansiedlung und Verbreitung halophiler Phanerogamenarten in den Niederungen zwischen Bendeleben und Nebra	„ 31, „ 6
Ueber das Vorkommen von <i>Artemisia maritima L.</i> auf der Ruine der Burg Arnstein bei Harkerode im Mansfelder Gebirgskreise	„ 31, „ 11
Ueber das Vorkommen von <i>Onobrychis arenaria (Ritaibel)</i> in der Umgebung von Halle	„ 31, „ 29
„ 31, „ 35	

Die im Saalebezirke wildwachsenden strauchigen Sauer-		Heft 31, S. 40
kirschen. 2. Mitteilung		" 31, " 50
Ueber die Verbreitung von <i>Silene Orites (L.)</i> und <i>Gypso-</i>		" 33, " 11
<i>phila fastigiata L.</i> im Südsaalebezirke		" 33, " 16
Ueber die Abstammung des Weizens		" 33, " 21
Abstammung und Heimat des Saathafers. 2. Mitteilung ..		" 33, " 24
Die Anzahl der Samen in der Hülse von <i>Astragalus danicus</i>		" 33, " 37
<i>Retzius</i>		" 34, " 10
Die im Saalebezirke wildwachsenden strauchigen Sauer-		" 35, " 13
kirschen. 3. Mitteilung		" 35, " 58
Valerius Cordus als mitteldeutscher Florist.....		" 35, " 20
Bericht über die Exkursionen am 2. und 3. Juni 1914		
Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung interessanterer Phane-		
rogamenformen im Saalebezirke. I		
Schulze, Max, Weitere kleine Mitteilungen über <i>Alectoro-</i>		
<i>lophus</i> -Formen der Jenaer Flora		
Zahn, G., Mitteilung aus dem Herzogtum Gotha		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mittheilungen des Thüringischen
Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [NF_35](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des
Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: [Register und Verzeichnis I-XVI](#)