

## Floristische Beobachtungen in Thüringen.


Von Kurt Branco, Weimar, z. Z. Wehrmacht.

Dem Herbarium Haußknecht ist in den letzten Jahren aus den Reihen der Mitglieder unseres Vereins viel mitteldeutsches Pflanzenmaterial überwiesen worden, welches für die floristische Forschung von größter Bedeutung ist. Ferner wurden viele Einzelmitteilungen über Standorte seltener oder sonstwie bemerkenswerter Arten mitgeteilt. Wegen der Einberufung des Konservators Dr. Walther hatte ich die Sichtung des Materials übernommen. Nachdem ich nun selbst zum Wehrdienst einberufen worden war, konnte das Pflanzenverzeichnis nicht unter dem Gesichtswinkel bearbeitet werden, daß bereits bekannte Standorte als solche gekennzeichnet wurden, wie dies sonst üblich ist. Und ich muß sagen, daß ich hierüber froh bin! In einer Zeit, wo an jeden Einzelnen erhöhte Anforderungen gestellt werden, müssen derartige mehr archivalische Studien etwas zurücktreten, sofern es sich nicht im Einzelfall um spezielle Ermittlungen handelt.

Folgende Herren haben z. T. recht umfangreiche Pflanzenlisten zur Verfügung gestellt: Prof. Bornmüller-Weimar, Oberschullehrer Bradler-Erfurt, Fröhlich-Jena, Gewerbeoberlehrer Gräfe-Bad Klosterlausnitz, Apotheker Hockemeyer-Großenbehringen, Oberlehrer Schumann-Arnstadt, Mittelschullehrer Veit-Gotha, Stud.-Rat Voigt-Schleiz, Reallehrer Volk-Steinach, Dr. Walther-Weimar und Mittelschullehrer Wildt-Erfurt. Die Namen der Gewährleute wurden hinter jedem Standort vermerkt.

In der pflanzengeographischen Gliederung Thüringens bin ich der von Dr. Schwarz benutzten und von Dr. Walther etwas modifizierten Einteilung gefolgt, wie sie auch in früheren Heften dieser Mitteilungen zur Anwendung kam.

Mit dem Dank an die Mitarbeiter verbinde ich die Bitte, die Beobachtungen fortzusetzen und zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.



Karte der Pflanzenbezirke Thüringens; von Dr. R. Walther (abgedruckt nach Dr. O. Schwarz 1925). Maßstab 1: 1000000

Die großen Buchstaben bedeuten: H = Hörsel-Gainich-Gebiet; M = Mittelthüringen; N = Nordthüringen; O = Ostthüringen; R = Rhön; S = Südthüringen; V = Vogtland; W = Thüringer Wald; Wfr = Frankenwald. Die kleineren Buchstaben sind Abkürzungen von Ortsnamen.

*Dryopteris Thelypteris* (L.) A. Gray

**S:** Stedtlinger Moor (Fröhlich).

*Polystichum lobatum* (Huds.) Presl

**W:** Beim Auerhahn (Schumann und Veit); im Freibachtal unterhalb der Schmücke (Schumann); im Finsteren Loch bei Stützerbach (Schumann).

**M:** Wartberge bei Thal (Veit).

*Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.

**Wfr:** Obere Saale unterhalb der Sperrmauer bei Gräfenwart in vielen Stöcken (Fröhlich).

*Struthiopteris germanica* Willd.

**W:** Neue Standorte im Spittergrund bei Tambach (Veit).

**O:** Das Vorkommen im Zeitzgrund wurde dank dem Eingreifen der Thüringischen Landesstelle für Naturschutz durch die Regulierungsarbeiten nicht gefährdet (Gräfe); Amtsschössermühle (Gräfe).

*Asplenium viride* Huds.

**M:** Ein Stock an einem Muschelkalkabsatz eines Flutgrabens, der sich von Remderode nach dem Schwabhäuser Grund herabzieht (Fröhlich 1935).

*Botrychium Lunaria* (L.) Sw.

**W:** Wiese im Ohrgrund (Dr. Walther); Rodebachtal bei Tambach, Bergwiesen bei Schmiedefeld (Fröhlich); Breitenberg bei Haselbach (Volk).

**Wfr:** Alte Straße von Pöritzsch nach Saalburg (Fröhlich).

**M:** Hinter dem Einshügel bei Jena (Fröhlich).

**O:** Bahndamm bei Hermsdorf (Gräfe); südöstlich Klosterlausnitz (Gräfe).

*Ophioglossum vulgatum* L.

**W:** Kräuterwiese bei Waltershausen (Veit).

**O:** Zinnateich (Gräfe).

**M:** Sumpfwäldchen bei Zinna und oberhalb Zöllnitz bei Schlöben (Fröhlich); im „Berlach“ westlich Gotha (Veit).

*Equisetum variegatum* Schleicher

**M:** Bei Gumperda (1940 bestätigt durch Fröhlich).

*Equisetum pratense* Ehrh.

**O** Im Hinterölsnitzgrund südlich des St. Gangloff Forstes, Roda-Ufer zwischen Zöllnitz und Laasdorf, Zeitzgrund (Fröhlich).

*Equisetum maximum* Lmk.

**O:** Südlich Geisenhain (Gräfe).

*Lycopodium Selago* L.

**O:** Viele Stöcke an einer Teichmauer östlich der Neumühle im Zeitzgrund (Fröhlich).

*Lycopodium complanatum* L. ssp. *anceps* (Wallr.) Aschers.

**W:** Am Hainberg zwischen Bad Blankenburg und Dittersdorf (Fröhlich).

**Wfr:** Südlich des Rennsteiges bei Ebersdorf im Großen Bärenal (Fröhlich).

**O:** An 3 Stellen in den Hangwäldern zwischen Rausdorf und Zöllnitz, Stanauer Grund bei Fröhliche Wiederkunft, nahe einer kleinen Quelle 1 km östlich von Hainspitz (Fröhlich).

*Selaginella Douglasii* (Hooker Grev.) Spring

**M:** Ein großer Rasen im oberen Möbisgrund bei Vollradisroda; der reiche Bestand rechtfertigt die Erwähnung dieses Fremdlings, über dessen „Ansalbung“ nichts bekannt ist (Fröhlich; det. Prof. Bornmüller).

*Taxus baccata* L.

**M:** In baumförmigen Exemplaren am hinteren Kunitzberg (Fröhlich).

*Zannichellia palustris* L.

**M:** Weidsbach bei Freudenthal nahe Wandersleben (Wildt); Graben der Wechmarer Mühle (Wildt).

*Butomus umbellatus* L.

**M:** An zwei Stellen des Saaleufers bei Jena (Fröhlich); Standort in Becks Teich bei Weimar erloschen (Branco).

*Schoenus nigricans* L.

**M:** Bei Zinna (Fröhlich); Sumpfstelle oberhalb Mennewitz am Hang der Wöllmisse (Fröhlich).

*Hydrocharis Morsus-ranae* L.

**O:** Ilmsdorf und Meusebach (ob ursprünglich? Gräfe).

*Melica ciliata* L.

**M:** Zwischen Frankenhain und Crawinkel auf Zechsteinkalk (Veit).

*Melica picta* C. Koch

**M:** Schloßholz bei Tonndorf.

*Festuca arundinacea* Schreb.

**M:** Graben in der Nähe der Goldenen Henne bei Erfurt (Wildt).

*Vulpia myuros* (L.) Gmel. (= *Festuca myuros* L.)

**H:** Werrahänge bei Treffurt gegenüber dem Heldrastein (Dr. Walther).

*Bromus inermis* Leyss.

**S:** Irmelshäuser Wäldchen südl. Römhild (Wildt).

**M:** Keupergipshügel bei Weißensee (Branco); Schloß Gleichen (Wildt).

*Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.

**M:** Hohenfelder Wiesen (Wildt); an der Ostseite des Rockhäuser Holzes (Wildt); Kaiserwiese im Bechstedter Holz (Wildt).

*Phleum phleoides* (L.) Simonkai

**M:** Trift im Ilmtal gegenüber Taubach (Dr. Walther).

*Stipa capillata* L.

**M:** Hänge über dem Sammtal an der Straße Sömmerda-Weißensee (Bradler); Totenhügel bei Nausiß, Kreis Weißensee (Bradler); Kahler Berg bei Tunzenhausen, Kreis Weißensee (Bradler); Hoher Berg bei Niederzimmern (Branco); Roter Berg nördlich Erfurt (Wildt).

*Leersia oryzoides* (L.) Sw.

**S:** Am Teichrand des Ortes Thann südlich Neustadt bei Koburg (Fröhlich).

*Lemna trisulca* L.

**M:** Hohenfelder Sumpfwiesen (Wildt); Teiche bei Vollersroda südlich Weimar (Dr. Walther).

*Juncus tenuis* Willd.

**M:** Plateau des Rehmberges († Weise-Kunitz).

*Anthericum Liliago* L.

**M:** Diebskammer bei Schallenburg, Kreis Weißensee (Bradler).

*Scilla bifolia* L.

**N:** Im Hotzenberge zwischen Schernberg und Wiedermuth (Engel-Sondershausen).

*Polygonatum verticillatum* (L.) All.

**M:** Beim Wirtshaus Stiefelburg über Naundorf (Bradler); Schloßholz bei Tonndorf (Bradler); Gottesgrund bei Bechstedtwagd (Wildt).

**H:** Spindelsburg bei Faulungen, Kreis Mühlhausen (Bradler).

*Muscari racemosum* (L.) Lam. et DC.

**M:** Auf einem Gipshügel nördlich Serba bei Eisenberg (Fröhlich); an der Poxdorfer Höhe (Fröhlich).

*Gagea saxatilis* Koch

**N:** Auf nassen Sandsteinbänken hinter der Henne bei Naumburg (Fröhlich und Dr. Grebe).

*Gagea spathacea* (Hayne) Salisb.

**M:** Auf einer tonigen Waldstelle „In der Beuche“ bei Eisenberg (Fröhlich).

*Iris sibirica* L.

**M:** Nutzbomholz auf der Harth zwischen Großenbehringen und Langensalza (Hockemeyer).

*Cypripedium Calceolus* L.

**M:** Bis zu 100 Stück in einer Talschlucht südlich der Wöllmisse nach Rabis zu (Fröhlich); hinteres Schillertal bei Kleinlöbichau (Fröhlich).

**H:** Sehr häufig im Wilhelmswald bei Struth, Kreis Mühlhausen (Bradler); Spindelsburg bei Faulungen, Kreis Mühlhausen (Bradler).

*Corallorhiza innata* R. Br.

**M:** Eichenberg bei Naundorf (Bradler).

*Spiranthes spiralis* (L.) Chevalier

**M:** Auf einer Trift südlich Schöngleina reichlich (Fröhlich).

*Listera cordata* (L.) R. Br.

**W:** Alte Lage bei Gräfenroda († Luchs-Ohrdruf).

*Epipactis atropurpurea* Rafin (= *E. rubiginosa* auct.).

**H:** Am Mühlberg und am Stein bei Faulungen (Bradler).

*Epipactis purpurata* Sm. (= *E. violacea* Dur.)

**M:** Waldstück südlich Wogau (Fröhlich); Isserstädter Forst (Fröhlich); Vollradisrodaer Forst (Fröhlich).

*Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw.

**M:** Hinter der Tännichtwiese bei Jenaprießnitz (Fröhlich); im Walde südlich Jenaprießnitz nach dem Luftschiff zu (Fröhlich); hinter dem Fürstenbrunnen nach Ziegenhain zu († Weise-Kunitz); südlich Altenberga (Fröhlich).

*Epipactis palustris* (Mill.) Örtz.

**M:** Sumpfstelle oberhalb Mennewitz am Wöllmißhang (Fröhlich); im Gembdental (Fröhlich); Sumpfstelle am hinteren Jenzig bei Jena-löbnitz (Fröhlich).

*Epipogon aphyllus* (Schmidt) Sw.

**N:** Im Borntal des Paßberges auf der Windleite im Wurmb'schen Forst auf Buntsandstein (Engel-Sondershausen 1923); hinter der „Stillen Liebe“ bei Stockhausen (Engel-Sondershausen 1923).

**H:** Vor 15 Jahren im Südhainich (Lehrer Catterfeld).

*Coeloglossum viride* (L.) Hartmann

**W:** Kleine Stallwiese südlich Friedrichroda (Branco und Veit).

**Wfr:** Luxleite bei Zoppothen (Fröhlich).

**V:** Feldrain nordöstlich der Reichsautobahnbrücke bei Hirschberg-Saale (Dr. Walther).

**O:** Bollberg (Gräfe).

**M:** Hang des Willinger Berges unmittelbar am Ortsausgang von Niederwillingen (Schumann).

*Ophrys apifera* Huds.

**M:** Südhang des Rehmberges (Wildt); Wandersleber Gleiche (Wildt); Ettersberg in den Gaberndorfer Steinbrüchen (Branco).

**H:** 1935 am Hörselberg (Hockemeyer); vor ca. 15 Jahren im Südhainich (Ziese).

*Ophrys araneifera* Huds.

**M:** Trift im Ilmtal gegenüber Taubach (Dr. Walther 1936).

*Orchis purpurea* Huds.

**O:** Südöstlich Klosterlausnitz (Gräfe).

**H:** Unterm Schloßberg am Tunnel bei Lengenfeld (Bradler).

*Orchis tridentata* Scop.

**O:** Hexensäule hinter dem Bohlen bei Saalfeld (Dr. Walther).

**M:** Im hinteren Sperbergrund des Tautenburger Forstes (Fröhlich); Saalewiesen zwischen Jägersdorf und Großpürschütz (Fröhlich); am Fuß des Dohlensteins bei Kahla (Fröhlich).

**N:** Bergwiesen nördlich Großheringen (Fröhlich).

*Orchis morio* L.

**M:** Zu hunderten auf einer Wiese zwischen Großpürschütz und dem Dohlenstein (Fröhlich); auf einer Bergwiese nördlich Leutnitz bei Bad Blankenburg (Fröhlich).

*Orchis pallens* L.

**M:** Im Kirchholz bei Lehesten nördlich Jena (Fröhlich); im Nerke-witzer Holz (Fröhlich); im Poxdorfer Holz nach Hohendorf zu (Fröhlich); „In der Doberau“ über Neuengönna (Fröhlich).

*Himantoglossum hircinum* (L.) Spr.

**M:** Berggarten nördlich Mörla bei Rudolstadt (Querchfeld-Rudolstadt); Wurmscher Berg beim Landeskrankenhaus in Rudolstadt (Querchfeld-Rudolstadt); Trift im Ilmtal gegenüber Taubach (Dr. Walther 1936 bis 1940). An einem Standort im unteren Hainholz bei Weimar, wo mir Dr. Schwarz, wohl 1921, die Pflanze zeigte, sah ich sie seitdem nicht wieder (Branco). Im Leutratal bei Jena wurden 1940, wohl infolge des vorhergehenden kalten Winters, keine blühenden Exemplare aufgefunden (Branco).

*Blysmus compressus* (L.) Panzer (= *Scirpus compressus* Pers.)

**M:** Oberhalb der Gemdbdenmühle bei Jena (Fröhlich); beim Gut Zinna (Fröhlich).

*Eriophorum angustifolium* Honckeney (= *Eriophorum polystachium* L. z.T.)

**M:** Sumpf an der Werningsleber Wiese (Wildt); Birkhahnsumpf im Rockhäuser Holz (Wildt); Vordersee bei Obernissa (Wildt).

*Eriophorum latifolium* Hoppe

**M:** Sumpfwiese bei der Quelle am Riechheimer Berg (Wildt).

*Rhynchospora alba* (L.) Vahl

**O:** Der reiche Standort bei Schleifreisen steht jetzt unter Naturschutz (Branco).

*Carex Davalliana* Sm.

**O:** Wiesen nördlich Göritzberg bei Eisenberg (Fröhlich).

**M:** Häufig auf Wiesen bei Dienststedt nahe Orlamünde (Fröhlich); Wiesenwege bei den Oberbüschen nahe Niedergrunstedt (Branco).

*Carex praecox* Schreb.

**M:** Am Ostrande der Kirchwiese bei Kunitz (Fröhlich); Grashang unterhalb Hetschburg b. Weimar (Fröhlich).

*Carex umbrosa* Host

**M:** Nerkewitzer Holz (Fröhlich).

*Carex Pseudocyperus* L.

**O:** An einem Teich im Großen Rötel bei Laasdorf (Fröhlich).

*Parietaria officinalis* L.

**M:** Obernitz bei Saalfeld (Fröhlich); am Kemnatenberg in Orlamünde (Fröhlich); bei der Kunitzer Mühle (Fröhlich).

**N:** Schloß Beichlingen (Branco).

*Rumex maritimus* L.

**M:** An einem Teich hinter Ruttersdorf (Fröhlich).

*Viscaria vulgaris* Rochling

**M:** Unterhalb der Steinbrücke auf dem Rehberg (Wildt).

*Silene dichotoma* Ehrh.

**M:** Im Jonastal bei Espenfeld (Veit); überhaupt neuerdings wieder häufiger in Kleeäckern (Branco).

*Cucubalus baccifer* L.

**M:** Zwischen Maua und Göschwitz an einer feuchten Sandsteinterrasse (Fröhlich); zwischen Zwätzen und Porstendorf östlich der Eisenbahn an einem Wegrand (Fröhlich); im Munketal bei Jena (Fröhlich).

*Sagina nodosa* (L.) Fenzl

**O:** An einem Teich bei Wetzdorf († Weise-Kunitz).

*Stellaria Friesiana* Seringe

**M:** Bei Paulinzella am Bache unterhalb des Dorfes nach Rottenbach zu (Schumann).

*Helleborus foetidus* L.

**M:** Im Elstertal bei Jena (Fröhlich; bereits bei Bogenhard).

*Actaea spicata* L.

**M:** In den Wäldern der Umgebung von Großenbehringen jetzt an mehreren Stellen; 1919 erstmalig beobachtet (Hockemeyer).

*Nigella arvensis* L.

**M:** Rehberg bei Wandersleben (Wildt); Roter Berg bei Erfurt (Wildt).

*Aconitum Vulparia* Rchb. = *Aconitum Lycoctonum* Koelle, Koch et auct. pl. non L.)

**M:** Nordseite des Kleinen Gleisberges bei Graitschen (Fröhlich); Wälder hinter Wogau (Fröhlich); Nerkewitzer Holz (Fröhlich); hinteres Leutratl (Fröhlich); Mühlthal bei Jena (Fröhlich).

*Myosurus minimus* L.

**M:** An der Reichsautobahn bei Leina auf der dort aufgeschichteten Muttererde 1939 sehr häufig (Veit).

*Ranunculus Lingua* L.

**O:** An einem Teich bei Wetzdorf († Weise).

*Pulsatilla vulgaris* Mill.

**S/W:** Auf mitteldevonischem Kalk am Großen Mühlberg bei Schmiedegrund nahe Mengersgereuth (Hopf und Volk).

**M:** Goldberg bei Eberstädt (Veit).

*Thalictrum flavum* L.

**M:** Gräben der Unstrutwiesen bei Sömmerda (Bradler).

*Adonis vernalis* L.

**M:** Unstruthänge zwischen Nägelstedt und Groß-Vargula (Bradler); Wäldchen an der Straße Tunzenhausen-Weißensee (Bradler); Diebskammer und Burg bei Schallenburg (Bradler); Weißenburg und Kahler Berg bei Tunzenhausen (Bradler); Totenhügel bei Nausiß (Bradler); Gipshügel bei Gangloffsömmern (Bradler); Hoher Berg bei Niederzimmern (Branco).

*Hypocoum pendulum* L.

**N:** Bei Greußen nicht mehr aufzufinden (Branco).

*Corydalis nobilis* Person

**M:** In den Gärten der Bahnhofstraße, Auguststraße und Hohestraße in Gotha verwildert und eingebürgert (Veit).

*Corydalis claviculata* DC.

**W:** 1932 bis 1939 beobachtet auf der Schmücke bei Gehlberg in wenigen Exemplaren (Veit).

*Thlaspi alpestre* L.

**W:** Gebersdorf bei Gräfenthal (Bornmüller und Branco); Ilmwiesen bei Manebach (Veit); Goldhelm bei Manebach (Veit).

*Subularia aquatica* L.

**V:** Im Gebiet in neuerer Zeit trotz intensiver Nachforschung nicht mehr aufgefunden (Branco).

*Lepidium perfoliatum* L.

**M:** Adventiv bei Erfurt (Dr. Grebe).

*Barbarea vulgaris* R. Br.

**V:** Moßbach, Dreba, Knau (Branco).

*Cardamine impatiens* L.

**M:** Im Walde zwischen Greuda und Altenberga (Fröhlich).

*Sisymbrium Sinapistrum* Crtz.

**M:** Werkstattthof und Güterbahnhof in Jena-Saalbahnhof (Fröhlich).

*Diplotaxis muralis* (L.) DC.

**M:** Gasanstalt in Jena (Fröhlich).

*Turritis glabra* L.

**V:** Plothengrund bei Ziegenrück (Branco).

**M:** Links bei dem Austritt der Straße von Riechheim nach Kranichfeld aus dem Wald (Wildt).

*Arabis pauciflora* (Grimm) Garcke

**M:** Schloßholz über Tonndorf (Bradler).

**N:** Häufig auf der Hainleite nahe Oldisleben (Branco).

*Erysimum odoratum* Ehrh.

**M:** Wandersleber Gleiche (Wildt).

*Hutchinsia petraea* (L.) R. Br.

**N:** Auf Triften südlich Balgstädt-Unstrut (Fröhlich und Dr. Grebe).

*Camelina sativa* ssp. *Alyssum* (Miller) Thellung

**M:** In einem Leinfeld bei Leutra (Branco).

*Berteroa incana* (L.) DC.

**V:** Eisenbahndamm zwischen Knau und Moßbach (Branco).

**M:** Böhms Sandwerk bei Gotha (Veit).

*Bunias orientalis* DC.

**M:** In ganz Mittelthüringen stark in der Ausbreitung begriffen (Branco).

*Drosera rotundifolia* L.

**O:** Im Hinterölsnitzgrund südlich des St. Gangloff Forstes (Fröhlich); im Schleifreiser Moor (Fröhlich).

*Sedum villosum* L.

**O:** Im Hinterölsnitzgrund südlich des St. Gangloff Forstes (Gräfe).

*Saxifraga tridactylites* L.

**H:** Hörselberg (Veit).

*Saxifraga granulata* L.

**M:** Im Süßenborner Holz auf Ilmschotter (Branco); beim Birkhahnsumpf im Rockhäuser Holz (Wildt); Egstedter Wiese (Wildt); Kaiserwiese im Bechstedter Holz (Wildt); auf den Wiesen des Berkaer Buntsandsteingebietes verbreitet (Branco); südlich Belvedere bei Weimar (Dr. Walther).

*Parnassia palustris* L.

**M:** Nördlicher Sumpf am Sachsenholz bei Meckfeld (Wildt); Sumpfwiese am Königstuhl (Wildt); Wiese südlich der Straße Riechheim-Kranichfeld (Wildt).

**N:** Bei Frankenhausen auf Zechsteingips (Branco).

*Aruncus silvester* Kosteletzky.

**Wfr:** In Waldschluchten an der oberen Saale sehr verbreitet (Branco).

**M:** Zwischen Lotschen und Schlöben (Fröhlich); bei Kleinbockedra (Fröhlich); westlich Beutelsdorf bei Zeutsch (Fröhlich); im Steinbachtal bei Lindau nördlich Eisenberg (Fröhlich); an der Roda bei Zöllnitz (Fröhlich).

*Mespilus germanica* L.

**M:** Kunitzberg bei Jena (Branco); Mühlberger Leite (Wildt); Rehberg bei Wandersleben (Wildt).

**N:** Nacken bei Seehausen (Branco und Wildt).

*Amelanchier vulgaris* Moench

**M:** Naturschutzgebiet Talgrube bei Heilsberg (Bornmüller).

**H:** Am Stein über Faulungen (Bradler); Schrannfelsen bei Kloster Zella (Bradler); Schloßberg bei Lengenfeld (Bradler); Hänge am Heiligenberg bei Bahnhof Groß-Bartloff (Bradler).

*Sorbus Aria* (L.) Crtz.

**M:** Königstuhl bei Kranichfeld (Wildt); Talgrube bei Heilsberg (Branco).

*Potentilla supina* L.

**M:** Nasse Wiese bei Hochstedt nahe Erfurt (Branco).

*Potentilla procumbens* Sibth.

**M:** Im Langetal bei Bürgel an einer Quelle (Fröhlich); „In der Salzlecke“ bei Laasdorf (Fröhlich); Ruttersdorfer Gletscherstein (Branco); Dambachsgrund bei Bad Berka (Branco).

*Potentilla verna* ssp. *puberula* (Krašan) (= *P. Gaudini* Gremlí)

**N:** Westhang des Kohnsteins bei Günserode (Branco).

*Cytisus nigricans* L.

**V:** Plothengrund bei Ziegenrück (Branco).

**M:** Hinter Rückersdorf bei Uhlstädt; nördlichstes Vorkommen in Thüringen (Fröhlich).

*Genista tinctoria* var. *lasiogyna* Gremlí

**M:** Beim Arnolditurm zu Gotha (Veit).

*Genista germanica* L.

**M:** Rockhäuser Holz (Wildt); Eichberg bei Klettbach (Wildt).

*Ulex europaeus* L.

**O:** Lochmühle bei Klosterlausnitz (Gräfe).

*Oxytropis pilosa* DC.

**Wfr:** Zwischen Heinrichstein und Luxleite bei Zoppothen (Fröhlich); zwischen Heinrichstein und Lobenstein (Fröhlich).

**M:** Diebskammer und Burg bei Schallenburg (Bradler); Hänge überm Sammtal an der Straße Sömmerda-Weißensee (Bradler); Weißenburg und Kahler Berg bei Tunzenhausen (Bradler); Totenhügel bei Nausiß (Bradler); Bohlen bei Saalfeld (Fröhlich).

*Astragalus excapus* L.

**M:** Totenhügel und Katzenberg bei Nausiß (Bradler).

**N:** Auf einer Trift nördlich Kachstedt bei Artern mit *Adonis vernalis* einzeln (Fröhlich).

*Astragalus danicus* Retz.

**M:** Hänge überm Sammtal an der Straße Sömmerda-Weißensee (Bradler); Totenhügel bei Nausiß (Bradler); Weißenburg bei Tunzenhausen (Bradler); Kahler Berg bei Schallenburg (Bradler).

*Coronilla vaginalis* Lmk.

**H:** Am Stein über Faulungen (Bradler); Schrannfelsen bei Kloster Zella (Bradler).

*Vicia tetrasperma* (L.) Moench ssp. *gracilis* (Loisel.) Hooker (= *Vicia gracilis* Loisel.)

**M:** Trifthänge im Ilmtal bei Öttern (Dr. Walther).

*Vicia pisiformis* L.

**M:** Königstuhl zwischen Riechheimer Berg und Kranichfeld (Wildt).

**N:** Hainleite südlich Seehausen (Wildt).

*Lathyrus silvester* L.

**M:** Königstuhl zwischen Riechheimer Berg und Kranichfeld (Wildt).

**N:** Nacken bei Seehausen (Wildt).

*Linum austriacum* L.

**M:** Goldberg bei Goldbach (Veit).

*Radiola linoides* Roth

**O:** Auf Brachacker und halbkultiviertem Moorgelände westlich Reichenbach bei Hermsdorf (Fröhlich).

*Dictamnus albus* L.

**M:** Am Abhang der Hohen Leeden und im Hirschgrund bei Tautenburg (Fröhlich); im hinteren Sperbergrund am Tautenburger Forst (Fröhlich); Rautal (Fröhlich); der Bogenhardsche Standort; Kunitzberg (Fröhlich).

*Euphorbia palustris* L.

**M:** Gräben der Unstrutwiesen bei Sömmerda (Bradler).

*Euphorbia virgata* Waldst. et Kit.

**M:** An einem Hang nördlich Bad Sulza (Fröhlich).

*Impatiens Noli tangere* L.

**V:** Plothengrund bei Ziegenrück (Branco); Nordhang des Gupfens bei Pottiga (Dr. Walther); Tannenbachgrund bei Töpen (Dr. Walther).

*Impatiens parviflora* DC.

**W:** Jetzt auch im Gebiet der Ohra und Apfelstädt bis Stutzhaus (Veit).

*Lavatera thuringiaca* L.

**M:** Hänge über der Straße Wundersleben-Straußfurt (Bradler); Unstruttal zwischen Nägelstedt und Groß-Vargula (Bradler).

*Hypericum tetrapterum* Fries

**M:** An der Hohenfelder Brunnenstube (Wildt).

*Hypericum humifusum* L.

**M:** Plateau des Rehmberges (Wildt).

*Viola tricolor* ssp. *vulgaris* (Koch) Oborny

**Wfr:** Lehesten und Wurzbach (Branco).

**V:** Zeulenroda (Branco); Greiz (Branco); Umgebung von Blintendorf und Göttengrün (Dr. Walther).

*Viola collina* Besser

**M:** Fuß des Schloßberges bei Buchfart (Branco).

**H:** Plesse bei Wanfried am Turm (Bradler).

*Viola palustris* L.

**M:** Auf Sphagnum im Moor zwischen Naundorf und Hohenfelden (Bradler).

*Myriophyllum spicatum* L.

**M:** Grümpelborn bei Steudnitz (Fröhlich).

*Hippuris vulgaris* L.

**N:** Esperstedter Ried (Wildt).

*Sium latifolium* L.

**W/M:** Im Teiche von Trenks Grund (Branco).

*Bupleurum rotundifolium* L.

**M:** Äcker westlich Zinna (Fröhlich); südlich Frauenpriesnitz nach dem Hirschgrund zu (Fröhlich); Gutendorf (Branco).

*Cicuta virosa* L.

**V:** In einem Teich nördlich von Frießnitz (Branco).

*Chaerophyllum aureum* L.

**V:** Bei Dreba (Branco).

*Oenanthe fistulosa* L.

**M:** Gräben bei Sömmerda (Bradler).

**N:** Esperstedter Ried (Wildt).

*Oenanthe aquatica* (L.) Poiret

**M:** Kleiner Igelsee bei Kettmannshausen (Veit).

*Seseli annuum* L.

**S:** Irmelshäuser Wäldchen südl. Römhild (Wildt).

**O:** Lasur bei Gera (Diebel).

**M:** Bohlen bei Saalfeld (Branco).

**N:** Westlich Udersleben (Branco).

*Seseli Libanotis* (L.) Koch (= *Libanotis montana* Crtz.)

**V:** Mauern der Burg Ranis (Branco).

**M:** Burgberg bei Waltershausen (Veit).

*Cnidium dubium* (Schkuhr) Thellung (= *Cnidium venosum* Koch)

**M:** Südlich der Trift auf dem Großen Seeberg (Wildt); wohl der Rothmalersche Fundort; vgl. Mitt. d. Th. B. V. 37 S. 63).

*Selinum Carvifolia* L.

**V:** Wegränder bei Dreba (Branco).

*Peucedanum officinale* L.

**M:** Liebensteiner Hecken bei Crawinkel (Veit); Burgberg bei Waltershausen (Veit).

**N:** Kohnstein bei Günserode (Hartmann-Oberbösa); Hainleite südl. Seehausen (Wildt).

*Peucedanum Cervaria* (L.) Lapeyr.

**M:** Burgberg bei Waltershausen (Veit); bei Crawinkel (Veit).

*Peucedanum Oreoselinum* (L.) Moench

**M:** Zwischen Kahla und Bibra rechts an den Abhängen (Fröhlich; der Bogenhardsche Standort).

*Tordylium maximum* L.

**N:** Steinklöbe (Branco).

*Laserpitium prutenicum* L.

**M:** Hinter dem Fürstenbrunnen bei Jena mit *Carduus defloratus* (Fröhlich; der Bogenhardsche Standort).

*Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.

**M:** In der Flora von Weimar nicht mehr beobachtet (Branco); Espenfeld (Veit).

*Chimophila umbellata* (L.) DC.

**M:** Hinterer Großer Gleisberg über Jenalöbnitz (Fröhlich); im Wappenholz bei Göttern (Fröhlich).

*Erica Tetralix* L.

**O:** Sümpfe bei Klosterlausnitz (Gräfe); Mohnberg bei Bobeck (Gräfe); Schleifreiser Moor (Gräfe); Am Töpfersberg bei Klosterlausnitz

bei Punkt 321,3 des Meßtischblattes (Fröhlich); in der Nähe des Schleifreiser Moores ein Strauch (Fröhlich).

*Hottonia palustris* L.

**W/M:** Teiche nördlich Ilmenau; ob spontan? (Veit).

*Samolus Valerandi* L.

**M:** Ried zwischen Wachsenburg und Mühlberg (Veit).

*Centunculus minimus* L.

**V:** Lehmgige Äcker nordöstlich der Reichsautobahnbrücke bei Hirschberg/Saale (Dr. Walther).

*Menyanthes trifoliata* L.

**V:** Moor bei Struth in Massen (Branco); Teichränder westlich Schilbach bei Tanna und sumpfige Stellen um Reitzenstein (Dr. Walther).

**O:** An der Bachschleife hinter Podelsatz bei Stadtroda (Fröhlich).

**M:** Wiese südlich vom Sumpf am Sachsenholz zwischen Hayn und Meckfeld (Wildt).

*Gentiana ciliata* L.

**V:** Bei Pöritsch Kreis Schleiz (Voigt).

*Polemonium coeruleum* L.

**Wfr:** Unterhalb der Luxleite bei Zoppothen (Fröhlich).

*Omphalodes verna* Moench

**N:** Im Hotzenberge bei Schernberg nahe dem „Häuschen“ (Engel-Sondershausen).

*Pulmonaria saccharata* Mill.

**M:** Vor einigen Jahren auf dem Kindel zwischen Großenbehringen und Eisenach auf einem wieder angeforsteten Fichtenkahlschlag in zahlreichen Exemplaren (Hockemeyer).

*Nonnea pulla* (L.) DC.

**M:** Roter Berg nach Stotternheim zu (Wildt); zwischen Erfurt und Azmannsdorf (Wildt); Kapellendorf (Branco); Wohlsborn (Branco); Gaberndorf (Branco).

**N:** Schlößchenkopf bei Sangerhausen (Wildt); Nacken bei Seehausen (Wildt).

*Lithospermum officinale* L.

**M:** An der Tafelbuche bei Buchfart (Bornmüller).

**N:** Hainleite östlich Seega (Branco und Hartmann).

*Cerintho minor* L.

**M:** Im Schillertal bei Kleinsöbichau (Fröhlich); im Ziskauer Tal bei Jena (Fröhlich); über den Zinnateichen bei Zinna (Fröhlich); an

Feldrainen am Coppanzer Berg (Fröhlich); am Windknollen bei Jena (Fröhlich); über Zötnitz bei Schlöben nach dem Luftschiff zu (Fröhlich); Schottplatz auf dem Forst bei Jena (Branco).

*Ajuga Chamaepitys* (L.) Schreber

**M:** Östlich von Mertendorf nach dem Wethautal zu auf Äckern (Fröhlich); am Windknollen bei Jena (Fröhlich); am Poxdorfer Berg (Fröhlich); Alter Gleisberg (Branco).

*Teucrium Scordium* L.

**M:** Siebleber Teich bei Gotha (Veit).

*Melittis Melissophyllum* L.

**M:** In einem südlichen Seitental des Leutratales neu aufgefunden (Fröhlich); Hirschgrund bei Tautenburg (Fröhlich); Bogenhard-scher Fundort).

*Stachys germanica* L.

**S:** Erschberg bei Meiningen (Wildt).

**H:** Adolfsburg über Treffurt (Bradler); mehrfach zwischen Creuzburg und Schnellmannshausen (Branco und Wildt).

*Salvia nemorosa* L. (= *Salvia silvestris* Jacquin)

**M:** Auf einer Brache bei Oßmaritz bei Jena in Massen (Fröhlich).

*Limosella aquatica* L.

**V:** 1934 in Massen am Pörmitzer Teich und am Mittelteich bei Plothen (Branco).

**M:** In einer alten Sandgrube östlich der Saale bei Rudolstadt (Fröhlich).

*Elatinoides spuria* (L.) Wettstein

**M:** Felder bei Linkershof nordöstlich Weimar (Dr. Walther).

*Veronica scutellata* L.

**M:** Vordersee bei Obernissa (Wildt).

*Veronica aquatica* Bernh.

**M:** Siebleber Teich bei Gotha; neu für Mitteldeutschland (Veit).

*Veronica verna* L.

**M:** An der Rabenschüssel bei Maua (Fröhlich).

*Digitalis purpurea* L.

**O:** Teufelstal bei Hermsdorf (Gräfe); Zeitgrund am Bahndamm (Gräfe).

**M:** „In der Salzlecke“ bei Laasdorf und im Rotehofbachtal bei Fröhliche Wiederkunft (Fröhlich); alle Fundorte an der Nordgrenze des Vorkommens.

*Digitalis ambigua* Murr.

**W:** Bei Probstzella (Fröhlich); Ebersdorf unweit Ludwigstadt (Fröhlich); bei Steinbach am Wald (Fröhlich).

**V:** Längs der Eisenbahn von Wünschendorf nach Plauen i. V. (Branco).

**O:** Bahndamm zwischen Stadtroda und Hermsdorf-Klosterlausnitz (Branco); Zeitgrund (Fröhlich).

**M:** Unter den Hohen Leeden bei Tautenburg (Fröhlich); über der Tännichtwiese bei Jenapriesnitz (Fröhlich; Bogenhardscher Standort); Kunitzberg († Weise-Kunitz); bei Kleinbreitenbach nahe der Bettelmannsquelle (Schumann); Michelsberg bei Klettbach (Wildt).

*Euphrasia nemorosa* Pers. f. *macilenta* Gremli

**M:** Am Aufstieg zur Tafelbuche bei Buchfart (Bornmüller).

*Euphrasia lutea* L.

**M:** An einem Hang im Rosental bei Cospeda (Fröhlich; Bogenhardscher Fundort).

*Pedicularis silvatica* L.

**M:** Kaiserwiese im Bechstedter Holz (Wildt).

*Melampyrum cristatum* L.

**N:** Nacken bei Seehausen (Wildt); östliche Hainleite (Wildt).

*Asperula tinctoria* L.

**M:** Michelsberg bei Klettbach (Wildt).

*Asperula odorata* L.

**M:** Im Willrodaer Forst zwischen der Goldgruben- und Zeißigwiese (Wildt).

*Adoxa Moschatellina* L.

**W:** Auf oberdevonischem Knotenkalk am Hirtenrangen bei Steinach (Volk); Silbergraben bei Oberhof (Veit); Gehlberger Mühle (Veit); Sembachtal bei Winterstein (Veit).

**O:** Gessental bei Gera (Veit).

**M:** Rodauffer von der Mündung bis Laasdorf (Fröhlich); Raudabach bei Rauda (Fröhlich); hinter Graitschen nach Nausnitz zu (Fröhlich); am Steinbach über Löbstedt bei Jena († Weise-Kunitz).

*Campanula Rapunculus* L.

**M:** Ohrdruf, Landstraße bei der Fabrik von Knippenberg (Veit).

*Legouzia hybrida* (L.) Delarbre (= *Specularia hybrida* A. DC.)

**M:** In einem Getreidefeld über Zinna (Fröhlich).

*Valeriana sambucifolia* Mik.

**Wfr:** An der Oberen Saale verschiedentlich (Branco).

**W:** Friedrichroda (Branco); Lauchgrund bei Cabarz (Branco); Tambach (Branco); Silbergraben und Ensebach bei Oberhof (Veit); Gera und deren Nebenbäche bei Gehlberg (Veit).

*Dipsacus pilosus* L.

**W:** Schweitzerhof bei Friedrichroda (Veit).

**M:** Münchenrodaer Grund bei Jena (Fröhlich); Leinatal bei Cumbach (Veit).

*Campanula Cervicaria* L.

**S:** Irmelshäuser Wäldchen südl. Römheld (Wildt).

*Aster Linosyris* (L.) Bernh.

**M:** Großer Seeberg (Wildt); Mühlberger Leite (Wildt).

**N:** Hainleite südlich Seehausen (Wildt).

*Aster Amellus* L.

**M:** Hecken zwischen Crawinkel und Liebenstein (Veit); auf einem schmalen Ödlandstreifen am Südrand des Hainaer Holzes (Hockemeyer); am Eichberg und Rinkelsholz bei Klettbach (Wildt).

*Achillea nobilis* L.

**N:** Nacken bei Seehausen (Branco).

*Arnica montana* L.

**O:** In der Nähe des Schleifreiser Moores (Fröhlich).

**M:** Im kleinen Rötel bei Zöllnitz unweit Jena (Fröhlich).

*Senecio spathulifolius* (Gmel.) DC.

**M:** Rinkelsholz bei Klettbach (Wildt); Willinger Berg (Branco).

*Senecio campester* (Retz.) DC.

**M:** Bergrücken östlich der Eisenbahn bei Niederwillingen (Bornmüller).

*Helichrysum arenarium* (L.) DC.

**M:** Auf einem Hügel nördlich Großbockedra (Fröhlich).

*Inula germanica* L.

**M:** Hänge an der Straße Wundersleben-Straußfurt (Bradler); über der Burg bei Straußfurt (Bradler).

*Inula hirta* L.

**M:** Bei den Steinbrüchen am Rehmberg (Wildt).

**N:** Nacken bei Seehausen (Wildt).

*Inula salicina* L.

**H:** Auf dem Schrannfelsen bei Kloster Zella (Bradler).

*Pulicaria vulgaris* Gaertn.

**M:** In einer alten Sandgrube östlich der Saale bei Rudolstadt (Fröhlich).

*Arctium nemorosum* Lej. et Court.

**M:** ZeiBigberg im Willrodaer Forst (Wildt); Kaffberg bei Wandersleben (Wildt).

*Cirsium eriophorum* (L.) Scop.

**M:** Links der Straße von Troistedt nach Gutendorf (Fröhlich); Königstuhl bei Kranichfeld (Branco).

**H:** Ebenauer Köpfe bei Creuzburg an der Werra (Branco).

*Cirsium heterophyllum* (L.) All.

**W:** Wiesen zwischen Unterweißbach und Geiersthal (Branco).

*Centaurea montana* L.

**W/M:** Hard bei Wahlwinkel sehr häufig (Veit).

*Centaurea maculosa* Lam. ssp. *rhenana* (Boreau) Gugler (= *C. rhenana* Boreau)

**M:** Hänge überm Sammtal an der Straße Sömmerda-Weißensee (Bradler); Totenhügel bei Nausiß (Bradler); Diebskammer bei Schallenburg (Bradler); Kahler Berg bei Tunzenhausen (Bradler).

*Arnoseris minima* (L.) Schweigger et Koerte

**O:** Nördlich des Schleifreiser Moores an einem Feldrand (Fröhlich).

**M:** Im Steinbruch auf dem Rehmberg (Wildt).

*Lactuca quercina* L. ssp. *stricta* Waldst. et Kit.

**N:** Nacken bei Seehausen (Wildt); Rothenburg (Branco).

*Tragopogon major* Jacq.

**M:** Keupergipshügel bei Weißensee (Branco).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1942

Band/Volume: [NF\\_49](#)

Autor(en)/Author(s): Branco Kurt

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen in Thüringen. 210-228](#)