

Pflanzenliste der Mühlstein-Wildmoos-Exkursion am 30.7.1950

Von Franz Fischer.

Hengstbergfuss-Waldrand: Flattergras (*Milium effusum*), Echte Bergminze (*Satureia calamintha*), Echter Odermennig (*Agrimonia eupatoria*), Waldplatterbse (*Lathyrus silvester*);

Hüttstatthang: Niederliegender Dreizahn (*Sieglingia decumbens*), Gekielter Lauch (*Allium carnatum*), Aufrechter Ziest (*Stachys recta*) und Alpen Ziest (*Stachys alpina*), Grosse Fetthenne (*Sedum maximum*);

Oberleitensattel: Grosser Ehrenpreis (*Veronica teucrium*);

Wildhengut-Hang: Stechpalme (*Ilex aquifolium*), Quirlblütiger Salbei (*Salvia verticillata*), Schwalbenwurzenenzian (*Gentiana asclepiadica*), Gebräuchlicher Ziest (*Stachys officinalis*), Färberginster (*Genista tinctoria*), Adlerfarn (*Pteridium aquilinum*), Doldiges Habichtskraut (*Hieracium umbellatum*);

Farne des Mühlsteinwaldes: Rippenfarn (*Blechnum spicant*), Berg-Wurmfarn (*Nephrodium oreopteris*), Weiblicher Wurmfarn (*Athyrium filix femina*), Männlicher Wurmfarn (*Nephrodium filix mas*), Dornspitziger Wurmfarn (*N. spinulosum*);

Farne der Trockenen Klammen: Hirschzunge (*Scolopendrium vulgare*), Kalkfarn (*Nephrodium Robertianum*), Eichenfarn (*N. dryopteris*), Gelappter Schildfarn (*Polystichum lobatum*), Gemeiner Blasen-farn (*Cystopteris fragilis*), Grüner und Schwarzstieliger Streifenfarn (*Asplenium viride* & *A. trichomanes*), Mauer-Streifenfarn (*Aspl. ruta muraria*), Mondrauten-Farn (*Botrychium lunaria*);

Wildmoos: Torfmoos (*Sphagnum species*), Wald- und Sumpfschachtelhalm (*Equisetum silvaticum* & *E. palustre*), Sumpfbärlapp (*Lycopodium inundatum*), Keulenbärlapp (*L. clavatum*);

Im angrenzenden Walde: Tannenbärlapp (*L. selago*) und sprossen-der Bärlapp (*L. annotinum*), Gemeines Fettkraut (*Pinguicula vulgaris*), Rund- und Langblättriger Sonnentau (*Drosera rotundifolia* & *D. longifolia*), Moosbeere (*Vaccinium myrtillus*), Moorheidelbeere (*Vaccinium uliginosum*), Gemeine Heidelbeere (*V. myrtillus*), Besenheide (*Calluna vulgaris*), Wilder Rosmarin (*Andromeda polifolia*), Studentenröschen (*Parnassia palustris*), Berwöhlverleih (*Arnica montana*), Niederliegende Dotterblume (*Caltha procumbens*), Sumpf-Pippau (*Crepis paludosa*), Alpenhaarbinse (*Trichophorum alpinum*), Scheidiges Wollgras (*Eriophorum vaginatum*), Stachelige Segge (*Carex stellulata*), Hirse-Segge (*Carex panicea*), Gelbe Segge (*C. flava*), Rasige Schmiele (*Deschampsia caespitosa*), Gemeiner Windhalm (*Agrostis tenuis*), Geschecktes Reitgras (*Calamagrostis varia*), Pfeifen- oder Blaugras (*Molinia caerulea*), Moorbirke (*Betula pubescens*), Latsche (*Pinus montana*). Auf den Holzschlägen: Tollkirsche (*Atropa belladonna*), Fuchs Krauskraut (*Senecio Fuchsii*), Gemeine Eibisch (*Chelidonium vulgare*). An der Landstrasse i. Elisabethen: Die "Kornpflanze" Giftlattich (*Lactuca scariola*).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur Salzburg](#)

Jahr/Year: 1951

Band/Volume: [BOT_A1](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Franz

Artikel/Article: [Pflanzenliste der Mühlstein-Wildmoos-Exkursion am 30.7.1950. 26](#)