

Nachtrag: Obiger Beitrag zur Flora von St. Georgen a. S. und Umgebung stellt nur einen kurzen Auszug jener Lokalflora dar, die der Gefertigte 1947 unter dem Titel "Botanische Raritäten um St. Georgen bei Oberndorf" verfasste, aber leider nicht veröffentlichen konnte.

II. Beiträge zur Flora

des Kleinarltales mit dem Jägersee u. Tappenkar.

- Cystopteris regia (L.) Desv. (C. Filix-fragilis subsp. alpina (Wulf.) Hartm.) Von Oberlehrer Fischer am Tappenkaranstieg unter Gestein gefunden. Selten.
- Dryopteris cristata (L.) A. Gray. (Nephrodium cristatum (L.) Michx. In den Waldsümpfen im Stuhlerwald gegen Schiedalpl. Selten.
- Dryopteris Villarsii (Bell.) Woynar (Nephrodium Villarsii (Bell.) Beck. Hofalmgebiet u. oberster Jägerbachgraben; Gamskar. Selten.
- Polystichum Braunii (Spencer) Fée . Im Ployerwald gegen Burglehen und auch im Sailbichl u. Obristwald dort und da.
- Botrychium multifidum (Gmelin) Rupr. Von meinem Bruder Karl Schwaighofer, Pfarrer ind Wald i. Pzg., im vorderen Tappenkar nächst dem sogenannten "Jägerbrünndl" gefunden. Selten.
- B. lunaria (L.) Sw. fand Fischer im Tappenkaranstieg auf Steinen.
- Equisetum hiemale L. Dieser sehr seltene Schachtelhalm ist in der Sponbergschlucht nächst der Schotterschütte bestandbildend.
- Isoetes lacustre L. Diese einst von Hegi, Gams u.a. vom Jägersee angegebene seltene Pflanze ist seit dessen Stauung vollständig verschwunden, bzw. unauffindbar.
- Pinus Mugo Turra (P. montana Mill). Im Gebiet nur forma prostrata Tubeuf.
- var. mughus (Scop.) Zenari hfg. am Wildbühel, Steinkar, Pap-pel.
- var. pumilio (Hänke) Zenari hfg. am Tappenkar, Viehhofriedl.
- Juniperus communis L.
- var. vulgaris Spach. Pfarrerhaitl; Wildbühel.
- var. intermedia (Schur) Sanio; Tappenkaranstieg;
- var. nana (Willd) Loud. Tappenkar; Steinkar; Beisteinpalfen.
- Sparganium minimum (Hartmann) Fries. Einzig in einer Lache sw. des Benkkopfgipfels.

- Potamogeton L. Findet sich als *P. filiformis* Pers. beim Tappenkarsee Ausfluss; als *P. gramineus* forma *stagnalis* Fries u. forma *terrestris* Fries beim Jägersee Elektrowerk; Im Jägersee selbst und zwar die häufigste Pflanze dortselbst ist *P. densus* L. *P. alpinus* Balbis ist vereinzelt in der Steinkarlache u. in der Achenquelle nächst Schwabalm anzutreffen. *P. perfoliatus* L. in gleicher Häufigkeit im Ployermühlgraben.
- Alisma Plantago aquatica L. Nur in den Auwiesen nächst Ployermühle u. bei Rinn gegen die Ache.
- Stipa Calamagrostis (L.) Wahlenb. (*Achnatherum Calamagrostis* (L.) Pal. Beauv.; *Lasiogrostis calamagrostis* (L.) (Link). Beisteinpalven; Rossfeldeck; selten
- Alopecurus aequalis Sobolewsky. In der Jägermais u. Geigerau ziemlich verbreitet.
- Phleum phleoides (L.) Beistein- u. Wirtspalfen; auch Zirmegg u. Pappel; hfg.
- Phleum hirsutum Honckeny (*P. Michellii* All.) Im obersten Jägerbachgraben; Faulkogelanstieg; Hofwand. Selten.
- Agrostis Spica - venti L. (*Apera spica venti* (L.) Pal. Beauv.) Im wasserlosen Achenbett nächst Tappenkaranstieg und auf dem Sagplatz bei Stadlersäge.
- Agrostis canina L. Im Steinkar Verlandungssee und auch in den Sumpfwiesen bei Ployer, Wibm u. Rinn.
- Agrostis Schraderiana Becherer (*Calamagrostis tenella* (Schrad.) Link.) Tappenkar; Mauereck; Hofalm; Viehhofriedl und Murre nächst Schwabalm.
forma *aristata* Koch Tappenkaranstieg; Kreuzeck, Glingspitzanstieg.
- Calamagrostis lanceolata Roth. Spärlich in der Sumpfwiese bei Wibmmühle; im Achenufergebüsch bei Ployermühle und Gebüsch bei Einöd.
- Calamagrostis varia (Schrad.) Host. Tappenkar; Geigerau; Ployer u. Sailbichlwaldränder; Wildbühel.
- Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. Im Gebüsch am Weg nach Hirschleiten; Brandstättnmais; selten.
- Calamagrostis villosa (Chaix) Gmelin. Im obersten Kesselgrabengebiet (Kitzsteinalm); Wildbühel; Tappenkar.
- Calamagrostis Epigeios (L.) Roth. In den Rossstreuwiesen bei Ployer u. Wibm; an der Ache, Kreuzsalgraben; Jägersee W Ufer.
- Calamagrostis Pseudophragmites (Hallerf.) Koeler. Im wasserlosen Achenbett nächst Tappenkaranstieg.
- Holcus mollis L. Im Hannes- u. Ployergrabengebüsch; Auch Kreuzsalgraben u. am Weg nach Mönchsberg (adv).
- Avena fatua L. Auf Feldern verbreitet; auch Sagplatz.

Avena orientalis Schreber. Unter der Hafersaat vereinzelt feststellbar (Ployer, Beistein).

Avena Parlatoarei (Woods) Beck. (Helictotrichon Parlatoarei (Woods) Pilger; Avenastrum Parlatoarei (Woods) Beck.) Geigerau am Jägerbachufer; Faulkogelanstieg.

Avena alpina Sm. (Helictotrichon alpinum (Sm) Henrard; Avenastrum alpinum (Sm.) Fritsch). Kitzstein-Gabbelgebiet; auch. Rossfeldeck am Gratweg.

Avena pratensis L. (Helictotrichon pratense (L.) Pilger; Avenastrum pratense (L.) Jess.) Hirschleiten (Hochmahdl) u. Reitlehen gegen Kitzsteinalm.

Trisetum flavescens (L.) P.B.

subsp. alpestre (Host) Aschers. et Graebn. Geigerau; Viehhofriedl; Tappenkar; Hofalmgebiet.

Trisetum distichophyllum (Vill) Pal. Beauv. Gamskar im Tappenkar; Wildkarhöhe; Faulkogelanstieg vom Jägerbachgraben.

Phragmites communis Trin. Jägersee S Ufer und Viehhofwiese gegen Säge bei Koglershsl; spärlich.

Melica uniflora Retz. Geigerau verbreitet neben M. nutans L. das sich auch in der Jägermais u. im Kreuzsal- u. Jägerbachgraben findet.

Koeleria cristata (L.) Pers. (K. pyramidata (Lam) Dom).

Maierkopfanstieg; Kardeiskopf.

subsp. pyramidata Dom. Jägerbachgraben; Liebeseckanstieg;

vergl. subsp. montana (Hausm.) Dom. Tappenkar gegen Gittenstein.

subsp. gracilis (Pers.) A. & G. Wildbühel; Pappel; Hofwand auf Fels.

Poa alpina L. Wildbühel; Moosereck; Steinkar; Ennskraxn; Hofalm; Tappenkar. Hier häufig auch mit vergrüntem Ährchen u. als monstr. vivipara. Öfters auch Kiesschwemmpflanze!

vergl. Poa bulbosa L. Zirmegriedl; Benkkopfgebiet; Rossfeldeck (als vivipara); Tappenkar.

Poa hybrida Gaudin. Kerschbaumgraben, Jägerbachgraben; Kesselgraben gegen Angerhaus.

Poa caesia Sm. In der Schutthalde zwischen Wildkarhöhe u. Röthorn. selten.

Poa palustris L. Jägerseegebiet u. Weg zur Schwabalm.

Poa violacea Bell. In den Wildmähdern des Liebeseckes gegen Jägerbachgraben.

Poa cerisia All. Vereinzelt im Gamskar, Wildkar und Tappenkar.

Catabrosa aquatica (L.) P.B. Jägerseeleiten; Ployermühlbachl; Mühlbachl v. Schwab bis Wibm; Rinnmühle.

Glyceria maxima (Hartmann) Holmberg. (G. aquatica (L.) Wahlbg. Jägerseegebiet.

Festuca pulchella Schrader Geigerau; Jägerseeleiten; Tappenkar (Achen-Mündungsgebiet!)

- Festuca altissima All. (F. silvatica (Poll) Vill.).
Hirschleiten-Sailbichl-Öbrist u. Dürnwald.
- Festuca alpina (Suter) Hack.
Tappenkar, Draugstein-Gründeck.
var. Suteri (Suter) Yves. Benkkopfgrat (Fischer).
- Festuca pseudodura Steud. (F. dura Host).
Äusseres Tappenkar gegen Gamskar. selten.
- Festuca norica (Hack.) Richt.
Rothorn; Stierkarkogel; Wildkarhöhe. selten.
- Festuca subalpina Hack. (F. arundinacea Schreb. var. subalpina Hack.)
Jägerbachgrabenende gegen Faulkogelanstieg;
Tappenkaranstieg.
- vergl. Festuca violacea Gaud.
var. genuina Hck. Kraxenzug (am Fuss v. Steinkarbrünndl aus);
Faulkogel-u. Liebeseckanstieg; Blauer See (Steinkar).
- vergl. Festuca heterophylla Lam.
Jägermais; Schwabalmgebiet; Tappenkaranstieg; zerstreut.
- vergl. Festuca ovina L. s. str. (F. ovina var. vulgaris Koch)
Jägerbachgraben; Jägermais; Hofalm mit Viehhofriedl; Geigerau und Kraxenzug (sv. formula Hack).
- vergl. Festuca sulcata Nym. (F. ovina ssp. sulcata var. genuina Hack)
Kardeiskopf über Draugsteintörl zum Scheiben- und Maierkopf. selten.
- Festuca violacea Gaud. subsp. picta Hackel (F. picta Kit) wurde
merkwürdigerweise im Kalkgebiet nicht aufgefunden, kommt
aber in den Radstädter Tauern vor u. ebenso in Gastein.
- Bromus sterilis L.
Am Strassenrand beim Botenwirtshaus u. Achenböschung bei
Feuersang.
- Bromus inermis Leyder.
Achenufergebüsch bei Einöd u. Ployermühle; Beisteinzaun.
- Bromus arvensis L.
In der Baumschule beim Forsthaus u. Postautogaragenplatz.
- Bromus commutatus Schrader.
Sagplatz der Stadlersäge.
- Lolium temulentum L. In der Hafersaat nicht selten; adv. Sagplatz.
- Lolium remotum Schrank.
Auf Leinfeldern bei Viehhof u. Schwab. Nicht hg.
- Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Scirpus Trichophorum Aschers.
et Graebn.) Steinkarlache; Schwabalm gegen Hirschfutterstadl
- Trichophorum caespitosum (L.) Hartman. (Scirpus caespitosus L.;
Trichophorum austriacum Palla)
var. austriacum Aschers. et Graebn. Steinkar Verlandungssee;
Neukarsee; Jägersee W Ufer.
- Isolepis setacea (L.) R. Br. (Scirpus setaceus L.; Schoenoplectu
setaceus (L.) Palla. An der Ache bei Öbristbrücke u. Kreuzsalmühle. Jägermais.

- Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmelin)Palla (Scirpus Tabernaemontani Gmel.) Stellenweise am Jägersee u. Jägersee Ausfluss.
- Schoenoplectus triquetrus (L.)Palla. (Scirpus triquetrus L.) An Sumpfstellen am Weg von Fischegg über Bichlalpe zur Unterhofalm.
- Kobresia bipartita (Bell.)D.T.(K.caricina Willd.) Innerster Jägerbachgraben; Tappenkar (Mündungsbereich der Ache).
- Carex rupestris Bell. Faulkogel, Ennskraxenzug an mehreren Stellen.
- Carex muricata L. subsp. Leersii (F.Schultz) Aschers.et Graebn-Öbristwald; Sailbichlwald; von Hochstein nach Holleregg. subsp. Pairaei (F.Schultz)Aschers.et Graebn. Jägermais (bei Kohlstatt); Kerschbachgraben; Geigerau.
- Carex diandra Schrank (C.teretiuscula Good.) Jägersee W Seite u. Sumpfstellen im Stuhlerwald.
- Carex Lachenalii Schkur. Tappenkar Schneetälchen nächst Jägerbründl; Tappenkar-scharte.
- Carex tomentosa L. Ployerwiesen, Rinn, Stöckl Holzplatz; Jägersee W Seite.
- Carex ericetorum Pollich. Geigerau; Steineggalm; Steinkar gegen Ennskraxenfuss; Viehhofriedl. subsp. approximata (All.)Richter. Äusseres Tappenkar vor Brücke.
- Carex pendula Hudson. Im feuchten Wald von Burglehen gegen Hannes u. Aulehen (Buchen).
- Carex magellanica Lam. Im Sumpf westl. Jägersee; Steinkar Verlandungssee; Blauer See; auch innerster Jägerbachgraben.
- Carex ornithopodioides Hausmann (C.ornithopoda var.ornithopodioides (Hausm.)Garcke. Im Ennskraxenzug (Hahnkrah u. Bärnkarkogel); Rothorn; Stierkarkogel.
- Carex fuliginosa Schkur Ennskraxenfuss beim Blauen See; Tappenkar beim Quellgebiet zwischen Almhütte u. Schutzhaus (W.Hänge!)
- Carex distans L. Sumpfwiesen auf Jägersee W Seite; Ployerauwiesen.
- Carex lasiocarpa Ehrh. Im Mündungsgebiet der Ache in den Jägersee; Steinkarmoor. Auch vom Schidalpl gegen Pappelscheisskirchl u. Wildbühel.

vgl. Carex bicolor Bell.

Tappenkar Mündungsgebiet der Ache in den See auf Bachkies.

vgl. Carex humilis Leysser

Im Picetum der Geigerau u. Tappenkarseeböschung nächst Alm.

vgl. Carex riparia Curtis

Am Achenufer bei Prähaus, Einöd; Mündung des Kreuzsalbaches; Schmiedbrücke; Angerwirt u. Ployerau.

vgl. Carex divulsa Stokes

Steinegg halt gegen Alm; Weg v. Burnsteiner Alm zur Pappel.

Juncus castaneus Sm.

Am Weg zum Tappenkar gleich nach Jägersee Ende u. späteren Quellstellen.

Juncus acutiflorus Ehrh.

Geigerau; Kreuzsal- u. Jägerbachgraben.

Luzula sudetica (Willd.) DC.

var. alpina (Hoppe) Aschers. et Graebn. Jägerbachgraben; Steinegg Alm; Steinkar; Unterhofalmgebiet; Zirmegg gegen Biechalm; Glingspitze-Riffl.

Colchicum autumnale L. Im Gebiete fehlend.

Orchis palustris Jacq. Jägerseegebiet.

Herminium Monorchis (L.) R.Br. Jägerbachgraben.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Achroanthes monophyllos (L.)

Greene. Jägermais neben Weg (Fischer); Glingspitz u. Jägerbachgraben.

Corallorhiza trifida Chatelain.

Teublwald, Saibichlwald; Öbristwald. Im Fichtenwald am Beginn des Tappenkaranstieges. Sehr selten!

Salix hastata L. Tappenkaranstieg; Jägerbachgraben und in den Sammelgräben des westlich vom Jägersee herabkommenden Mauereckgrabens.

Salix Mielichhoferi Sauter. Tappenkaranstieg Loosbichl, Jägerbachgrabenursprung; Jägersee.

Salix viminalis L. Jägersee W Seite (kultiviert) Ployerau.

Populus balsamifera L.

Im Obstgarten bei Beisteinlehen.

Cornus Avellana L.

Im Gebiet sehr selten, nur auf dem Höhenweg nach Anderbichl; im Brandstättgraben u. an der Strasse gegen Wagrain

Fagus silvatica L.

Nur Ployerwald unterhalb Burglehen; unterhalb Anderbichl gegen Mitterau, nächst Teubl-Kresl-Lehen u. Tappenkaranstieg.

Quercus Robur L.

Zwei gepflanzte Kümmerexemplare am Jägersee.

Thesium rostratum Mert. et Koch.

In Ennskraxenzug (Liebeseck). Selten.

Thesium pyrenaicum Pourr. (Th. pratense Ehrh.) Hirschleitenabhang; Anstieg zur Gabel durch Rinne vom Saualpl.

Rumex nivalis Hegetschw. Diese seltene, ostalpine, kalkliebende Art wurde für Salzburg von Mielichhofer am Nassfeldertauern entdeckt. In der Tracht *Oxyria digyna* u. kleinen Stücken von *Rumex scutatus* nicht unähnlich (was schon mehrfach zu Verwechslungen führte), siedelt *R. nivalis* im Gegensatz zu den genannten Arten steinige Wiesen u. Schutthänge und findet sich vereinzelt im Tappenkaranstieg u. i.d. Scharte, dann auch noch auf Glingspitze, im Rothornanstieg durch die Fliegerrinne u. vereinzelt im Ennskraxenzug.

Rumex scutatus L.

Tappenkaranstieg; Hofalm gegen Faulkogel; Rothornanstieg von Hofalm aus.

Rumex arifolius All.

Tappenkar; Ennskraxenzug; Jägermais; Kitzsteingebiet.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Rothorn (Fliegerrinne); Glingspitze; Rossfeldeck Schutthalde.

Chenopodium hybridum L.

Sagplatz; Arlerwirtsgarten. zerstreut.

Chenopodium glaucum L.

Bei Unterfloss u. Saghs; Öbrist u. Schwab am Hausrand; Ladenplatz bei Säge u. Botenwirt.

Chenopodium urticum L.

Bei Botenwirt u. Kreuzsal am Hausrand; Friedhofunkraut.

Chenopodium murale L.

Beistein u. Botenwirt; Friedhofmauer hinter Sakristei.

Montia rivularis Gmelin.

In einem Waldsumpf im Stuhlerwald gegen Schidalpl.

Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb.

Tappenkargebiet; Anstieg zur Hofalm; Gamskarl.

Melandrium diurnum (Sibth.) Fries. (*M. silvestre* Röhling)

Sehr selten. Nur weissblütig am Achendamm bei Lehenhofkurve.

Melandrium album (Miller) Garcke.

Auf Egartwiesen meist rotblütig nach der Heumahd.

Melandrium noctiflorum (L.) Fries.

Sagplatz; Botenwirt; an Wegrainen u. auf Äckern, doch nicht hfg.

Gypsophila muralis L.

Bei Kreuzsalmühle am Mühlbachl; Geigerau; Jägermais.

Dianthus silvester (Wulfen) Rouy & Fouc.

mit feinstem Wohlgeruch; in der Sattelmulde zwischen Hahnkrah u. Bärnkarkogel im Ennskraxenzug. Bei der Angabe Mielichhofers lt. Hinterhuber, dürfte Verwechslung mit *D. gratianopolitanus* Vill. (*D. caesius* Sm) vorliegen.

Stellaria holostea L.

Feuchtstellen am Zirmeggriedl; Rossfeld-Unterrain-u.
Kerschbachgraben; zerstreut.

Cerastium alpinum L.

Gittenstein-Kreuzeck-Glingspitze; auch Rossfeldeck.

Cerastium arvense L.

ssp. commune Gaud. Geigerau u. Jägermai;
var. hirtum Neilr. Wirtspalfen; auf Fels ober Schwab;
var. latifolium Frl. Jägerbachgraben; Viehhofriedl;
var. angustifolium
(Scop.) Fzl. Wildbühel; Moosereck; Liebeseck
ssp. strictum (Hänke) Gaudin Ennskraxen; Tappenkaranstieg.

Cerastium uniflorum Clairv.

Faulkogelgipfel; (Nordgipfel); Wildkarhöhe.

Holosteum umbellatum L.

Vereinzelt an Feldrändern (Schwab, Öbrist, Sailbichl; Ober-
rain).

Minuartia aretioides (Somerauer) Sch. & Thell.

ssp. cherlerioides (Schrad) Mattf. Faulkogel; Stierkar-
kogel; Gamskarspitze; Rothorn u. Ennskraxen (Kraxenkopf).

Minuartia rupestris (Scop.) Sch. & Tell.

Rothorn (Liegerrinne); Ennskraxenzug (zwischen Kraxen-
kogel und Hahnkrah).

Minuartia sedoides (L.) Hiern.

Wildkarkopf; Tappenkar; Ennskraxenzug (Liebeseck) Faul-
kogel.

Minuartia verna (L.) Hiern, (M. Gerardi (Willd.) Hay.

Tappenkar gegen Gamskar u. Wildkar; Faulkogelanstieg;
Ennskraxenzug zwischen Bärnkarkogel u. Liebeseck-

Spergularia rubra (L.) Presl.

Kohlstatt unter Hofwand in der Jägermais. Selten.

Herniaria glabra L.

Rossfeldschwammkogel gegen Jägersee. Im Gebiet sehr selten.

Ceratophyllum demersum L.

Nur Jägersee SW Ufer.

Caltha palustris L.

ssp. genuina Hegi An der Ache; am Schwab- u. Rinnmühlbachl
ssp. laeta (Schott) Hegi. Steineggalmgebiet; bei Feuersang;
Rinn- u. Ployermühle.
ssp. alpestris (Schott) Beck.

Jägerbachgraben; Kitzsteinalmgebiet; am Tappenkarsee;
Schwabalm u. Steinkar Verlandungssee.

Helleborus niger L.

Jägerseeleiten (sö des Sees), Jägermais; Hofalm; Kersch-
bachgraben.

Delphinium Ajacis L.

Adv. im Arlerwirtsgarten gegen Ache.

Aconitum Lycoctonum L.

Jägermais; Jägerbachgraben; unter Burglehen; Kesselbachleiten von Reitlehen bis Kitzsteinalm.

Aconitum Napellus L.

ssp. tauricum Wulf. Kitzstein (Fischer); Gabel; Benkkopf bis Mauereck.

forma Koelleianum Rchb. Im Schafweidegebiet der Ennskraxen.

var. pygmaeum Vest. Gipfel von Hahnkrah; Bärnkarkogel und Liebeseck.

forma taurericum Rchb. Hofalmgebiet u. Viehhofriedl.

Aconitum paniculatum Lam.

f. Matthiolo Rchb. Jägerbachgraben.

Aconitum variegatum L.

Tappenkar; Malerkopf u. Scheibenkopf.

f. macranthum Rchb. Jägerbach- u. Kerschbachgraben.

Anemone baldensis Turra

Rothornanstieg von Hofalm; Faulkogelanstieg bei Neukarscharte.

Pulsatilla alpina (L.) Schrank

Benkkopf-Draugstein; Wildbühel, Tappenkar, Zirmeggriedl.

ssp. Burseriana P.B.

Jägerbachgraben gegen Liebeseckanstieg u. gegen Hofalm.

Pulsatilla vernalis (L.) Miller.

Kitzsteingebiet (auch nach Gabel vom Saualpl aus).

Ranunculus glacialis L.

Faulkogelanstieg; Rothorn (Fliegerrinne); Gamskarspitze.

Ranunculus alpestris L.

Tappenkar, Hofalm gegen Rothornanstieg; Jägerbachgraben; Ennskraxen, Steinkar (Blauer See), Benkkopf u. Rossfeld-eck.

var. angustisectus Kov. Wildkarkopf u. Stierkarkogel.

Ranunculus hybridus Biria

Stierkarkogel; Scheibenkopf; Draugstein; Gamskögel; Nebeleck.

Ranunculus Lingua L.

Nur Jägersee S Ufer.

Ranunculus arvensis L.

Auf Ackern beim Schwab, Beistein, Stockham u. Pauss.

Ranunculus sceleratus L.

Im Ployermühl- u. Kreuzsalmühlbereich; Wibm Mühle; Jägersee W.

Ranunculus auricomus L.

Diese neuerdings in zahlreiche Kleinarten aufgelöste Art findet sich am Weg zur Schwabalm und von letzterer gegen Hirschfutterhütte.

Ranunculus montanus Willd.

Steinkar; Tappenkar; Hofalm; auch Wildbühel u. Burnsteineralm.

Ranunculus bulbosus L.

Jägerbachgraben; Hofalmanstieg von Jägermais.

Ranunculus sardous Crantz.

Am Weg von Hannes nach Burglehen; Kreuzsal- u. Rossfeldgraben.

Ranunculus flaccidus Pers. (R. trichophyllum Chaix)

Jägersee Ausfluss bei Elektrowerk.

Ranunculus aquatilis L.

Jägersee Ausfluss bei Elektrowerk (Land-u. Wasserform).

Thalictrum alpinum L.

Tappenkaranstieg; Faulkogelanstieg vom Jägerbachgraben.

Thalictrum minus L.

Tappenkaranstieg; Hofalmanstieg.

ssp. saxatile (DC.) Sch. & K. Jägermais u. Tappenkar.

Thalictrum simplex L.

f. galioides Nestler Jägerbachgraben u. Viehhofriedl.

Papaver pyrenaicum (L.) Kern. (P. rhaeticum Ler)

ssp. Sendtneri (Kern.) Fedde (P. Sendtneri Kern).

Am markierten Weg vom Mosermandl zum Neukarsee.

Thlaspi perfoliatum L.

Ployergrabenende gegen Ache; Kreuzsalau.

Sisymbrium dentatum All.

Pfarrhofgarten nächst Sommerhsl. u. Beergarten. Eingeschl.

Sisymbrium Sophia L.

Sagplatz und am Achenufer bei Botenwirts Achenbrücke.

Hutchinsia alpina (L.) R. Br.

Tappenkar; Maier- u. Scheibenkopf; (oft herabgeschwemmt (so auf Achenschotterbänken in der Jägermais u. in den Dryashorsten nach der Schwabalm); Rothorn; Wildkar; Ennskraxenanstieg.

Hornungia petraea (L.) Rchb. (Hutchinsia petraea R. Br.)

Tappenkarseeböschung gegen Almhütte.

Neslia paniculata (L.) Desv.

Auf Feldern häufig; auch Sagplatz u. Ployerhalt.

Neslia apiculata Fischer & Meyer (N. thracica Velen)

Ablagerungsstelle an der Ache nächst Pfarrhofbrunnen.

Draba aizoides L.

Ennskraxen (Kraxenkopf u. Hahnkrah); Faulkogel; Rothorn, Scheibenkopf gegen Draugstein.

Draba Hoppeana Rchb.

Windischscharte; Neukarscharte, Faulkogel; Wildkarkopf; Rothorn; Stierkarkogel; vereinzelt auch Ennskraxenzug.

Draba tomentosa Clairv.

Faulkogel; Rothorn; Wildkarhöhe; Stierkarkogel.

Draba dubia Suter.

Stierkarkogel u. Gamskarspitze (oft x tomentosa!)

- Draba carinthiaca Hoppe (Dr. siliquosa M.B.)
Tappenkar; Gamskarspitze; Gittenstein; Kreuzeck; Gling-
spitze.
- Draba Sauteri Hoppe.
Rothorn; Faulkogel; Ennskraxenzug.
- Draba Spitzelii Hoppe.
Rothornanstieg von Hofalm; Faulkogelanstieg zur Neukarsch.
- Arabis arenosa (L.) Scop. (Cardaminopsis arenosa (L.) Hay
Rossfeldgraben.
- Sedum villosum L.
An Sumpfstellen am Weg zur Schwabalm und Steinkarsee.
- Sedum alpestre Vill.
Tappenkar Schneetälchen; Gamskar; vereinzelt Wildkar.
- Sedum acre L.
An der Ache nächst Kreuzsalmühle; Steinkar (Blauer See);
Jägermais; Geigerau und Jägerbachgraben.
- ssp. Wettsteinii Freyn. Geröllhalde nach Schwabalm.
- Sempervivum arenarium Koch.
Tappenkar; Wildkarhöhe.
- Sempervivum Noricum Hajek.
Am Gratweg Wildbühel - Moosereck.
- Saxifraga mutata L.
Tappenkaranstieg; Rothorn; Wildkar; Jägerbachgraben.
- Saxifraga cuneifolia L.
Hofalmanstieg; Teublwald gegen Kraxenabfall; Trinkergraben.
- Saxifraga ascendens L.
Tappenkaranstieg; Jägerbachgraben gegen Faulkogel.
- Saxifraga aphylla Sternb.
Hofalm gegen Faulkogelanstieg; (und gegen Rothornanstieg!)
Stierkarkogel; Gamskarspitze; Glingspitze; Kreuzeck; Gittenst.
- Saxifraga sedoides L.
Tappenkar; Wildkar, hfg. auch Achenufersand (var. typica Engl
et Irmsch.).
- Saxifraga aspera L.
ssp. bryoides (L.) Gaudin. Rossfeldgraben und Rossfeldeck.
- Saxifraga Burseriana L.
Jägerbachgraben; Stierkarkogel; Tappenkar.
- Ribes alpinum L.
Jägerseeleiten beim Schneerosengebiet.
- Ribes petraeum L.
Nur im Jägerbachgraben zerstreut.
- Sorbus Chamaespilus (L.) Crantz.
Geigerau; Jägerbachgraben.
- Sorbus torminalis (L.) Crantz
Beim Pfarrhof und in der Pfarrerau an der Ache u.a.
- Sorbus Aria (L.) Crantz f. incisa Hedl.
Jägerbachgraben.

Rubus saxatilis L.

Geigerau; Jägerbachgraben, Jägermais bis nach Schwabalm.

Rubus nessensis W.Hall (R.suberectus Anders.)

Ployermais und ober Bärmoos.

Potentilla Crantzii (Crantz) Beck.

Beisteinpaifen, Wirtspalfen; Hirschleiten; Jägerbachgraben.

Potentilla Clusiana Jacq.

Ennskraxenzug; Jägerbachgraben; Viehhofriedl; Faulkogel.

Potentilla Brauneana Hoppe ex Nestl.

Faulkogel; Rothorn; Wildkarkopf; Stierkarkogel; Tappenkar.
Auch Draugstein und Ennskraxenzug (Ennskraxen und Kraxenkopf).

Alchemilla vulgaris L.s.lat.

In den verschiedensten Formen im Gebiet verbreitet (n.Höfler)

Alchemilla anisiaca Wettst.

(A.conjuncta Babingt.em.Becherer) Vereinzelt am Grat Loosbichl - Maderkopf - Rossfeldeck; A. alpina L.s.lat. wurde im Gebiet dagegen nicht angetroffen.

Rosa micrantha Sm.

Stuhlleiten u. Kreuzsalhalt.

Rosa agrestis Savi (R.Haringiana (H.Br.) Fritsch.

Stuhlleiten; Pfarrerhaitl; Hochstein - Holleregg.

Rosa glauca Pourret non Vill (R.rubrifolia Vill.)

Kreuzsalgraben; Stuhl; Mönchsberg, Brandstatt, Jägersee
O Ufer.

Rosa tomentosa Sm. Geigerau.

Rosa obtusifolia Desv. (R.tomentella Léman)

ssp. tomentella (Lem) F.Hermann. Trinker- und Schwabhalt;
Kreuzsalhalt.

vgl. Trifolium alpestre L.

Steinkar unter Gebüsch; Steineggalmgebiet; Hochstein; Wildbühel.

Anthyllis Vulneraria L.

var.vulgaris Koch (A.vulgaris)(Koch) Kerner.

Ployerau, Mitterauböschung gegen Ache; Brandstattleiten;

var.Kernerii Sag.

Geigerau; Jägermais und Jägerbachgraben.

var. affinis (Britt.) Wohlf.

Steineggalt; Stuhl; Mitterauböschung; Ployerau.

var. alpestris Kit. (A.alpestris Rchb.)

Jägermais; Tappenkar; Maier- und Scheibenkopf.

Lotus uliginosus Schkuhr.

Jägersee W Ufergebiet; Stöcklbrücke.

Astragalus alpinus L.

Ennskraxenzug; Faulkogelanstieg; Steinkar (Blauer See);
Rothorn; Stierkarkogel; Glingspitze.

Astragalus australis (L.) Lam.

Kraxenkopf; Faulkogel gegen Neukar; Wildkarhöhe.

Astragalus oroboides Hornem.

Hofalm gegen Rothorn, Tappenkar; Jägerbachgraben.

Phaca alpina L. (Astragalus penduliflorus Lam).

Ennskraxenzug (Hahnkrah u. Liebeseck); Viehhofriedl; Faul-
kogelanstieg vor Neukarscharte; Rothornscharte.

Phaca frigida L. (Astragalus frigidus A. Gray).

Tappenkaranstieg; Jägerbach- und Kerschbachgraben; Hofwand,

Oxytropis campestris (L.) DC.

Vereinzelt in den Matten von Kreuzeck - Gittenstein gegen
Tappenkarseehütte.

Oxytropis Halleri Bunge (O. sericea (Lam) Simonk. non Nutt).

Im Kamm Glingspitze - Riffl und gegen Klettentörl.

Oxytropis montana (L.) DC.

Tappenkar (im Aufstieg zum Wildkar und Wildkarhöhe.).

vgl. Oxytropis tirolensis (Sieb.) Fritsch

Faulkogel (Neukarscharte); Wildkarkopf; Rothorn; Stier-
karkogel.

Lathyrus silvester L.

Viehhofhalt; Weg von Viehhof gegen Mönchsberg; selten.

Geranium pyrenaicum Burm.

Ployergraben; Hannesgraben (zwischen Bärmoos und Burg-
lehen).

Geranium pratense L.

An Zäunen und in Gebüsch, vereinzelt Egartwiesen; hfg.

Geranium columbinum L.

Kreuzsalhalt; Beistein- und Stockhamhalt; Aulehenhalt.

Geranium dissectum L. Stuhlleiten; Mönchsberg.

Erodium cicutarium (L.) L-Hérit.

Sagplatz; Wirtspalten; bei Viehhof und Beistein auf Feldern.

Linum alpinum Jacq.

ssp. montanum Aschers. et Graebn. (L. laeve Scop.)

Ennskraxenzug; Tappenkar; vereinzelt auch Steinkar-Mooser-
eck.

Polygala Chamaebuxus L. (Chamaebuxus alpestris Spach.).

f. leucoptera Brügg. Schwab - Hollereg; Mönchsberg-Stuhl.

f. rhodoptera Brügg. Geigerau; Jägerseegebiet; Jägermais.

Polygala amara L. s. lat.

ssp. amarella (Chodat) Crantz. Jägermais; Jägerbachgraben.

ssp. subamara Fritsch Tappenkaranstieg; Gamskar.

Polygala alpina (DC.) Steudel.

Ennskraxen; Tappenkar.

Polygala alpestris Rchb.

Wildbühel-Moosereck; Ennskraxen; Tappenkar; Maierkopf;
Jägerbachgraben; Hofalmgebiet.

Polygala vulgaris L.

ssp.eu-vulgaris Syme Ployer- u. Kreuzsalau; Steinegg halt.
ssp.comosa (Schkuhr) Chodat. Steinkar (Köpfl u. Blauer See u.
Zirmegriedl.

Callitriche verna L. em. Lönnroth.

f.minima Hoppe . Im Steinkarsattel in Lachen (Fischer).

Callitriche polymorpha Lönnr.

In Lache südl. des Benkkopfgipfels u. in Lachen am Moosereck.

Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. (*H.italicum* (L.) Pers. subsp.
alpestre (Jacq.) Beger.

Wildbühel - Steinkar; Geigerau; Viehhofriedl; Jägerbachgra-
ben; Ennskraxenzug; Kerschbachgraben; Dürnkaralm.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

ssp.nummularium (L.) Schinz et Thell. Weg nach Steinegg und
Mönchsberg; von Hinterstuhl gegen Burnstein; Bärmoos.

ssp.ovatum (Viv.) Schinz et Thell. Steineggalm zum Kraxenfuss;
Kerschbachgraben; Geigerau und Viehhofriedl.

ssp.glabrum (Koch) Wilczek. Tappenkar; Abstieg in den Kersch-
bachgraben zwischen Scheibenkopf und Draugstein; Dürnkar-
und Hofalmgebiet.

vergl. Helianthemum grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. und in
Bezug auf absteigend büschelhaarigen Kelch ovatum bzw. tomen-
tosum (Scop.) Spr. Hofalm gegen Rothornanstieg und Viehhof-
riedl gegen Hofalmabstieg.

Viola collina Besser

Geigerau; Jägerbachgraben; nicht hfg.

Viola palustris L.

Wibm; Ployerau; bei Viehhofkapellenzaun; (auf Kalk!)

Viola montana L. (*V.canina* ssp.montana (L.) Fries.

Am Weg von Viehhof nach Mönchsberg; Ployerauwald; Stuhl-
leiten.

ssp. Schultzii (Billot) Kirschleg. (*V.montana* f. *Einseliana*
(F.Schultz) W.Becker.) Hirschleiten- und Mönchsbergabhang.

Epilobium obscurum Schreber.

Vereinzelt im Graben von Brandstattbrücke bis Einödbrücke.

Epilobium tetragonum L. (*E.adnatum* Griseb.)

Bei Prähaus neben Ache und zerstreut gegen Wagrain.

Epilobium alpinum L. (*E.anagallidifolium* Lam).

Tappenkaranstieg; Rossfeldgraben und Kreuzsalgraben.

Chaerophyllum aureum L.

Im Gebüsch nächst Einöd und Wibm und im Jägerbachgraben.

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.

ssp. silvestris (L.) Grelli. In Wiesen und Wiesenrändern besonders bei Taxen, Teubl, Kresl und Beisteinpalfen.

ssp. alpestris (Wimmer & Grab). (*A. nitida* (Wahlenb.) Garcke).
Nächst Geigerlehen; Geigerau; Jägerseewald; Jägerbachgraben; Tappenkaranstieg; Hofalmanstieg.

Myrrhis odorata (L.) Scop.

Von Gutsverwalter Josef Haitzmann, Jägerssee beim Hirschfütterstadl nächst Schwabalm gefunden. det. Fischer.

Torilis japonica (Houttuyn) DC. (*T. Anthriscus* Gmel.)

Geigerau; Jägerbach- und Kerschbachgraben. Selten.

Conium maculatum L.

Sagplatz; am Hausrand bei Botenwirt; Viehhof; Ployer; nächst Autogarage und vorübergehend auch unter Pfarrhofstiege.

Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.

Jägerseegebiet; Jägermais (Hofwandnähe); Hofalm- und Tappenkaranstieg.

Seseli Libanotis (L.) Koch. (*Libanotis montana* Cr.)

ssp. eulibanotis Thell. Hofalm; Tappenkar; Dürnkar.

Seseli annuum L.

Geigerau; Jägermais; Jägerbach-Rossfeld- und Kreuzsalgraben.

Athamanta cretensis L.

Faulkogelanstieg im Schutt; Ennskraxenanstieg; Hofalmgebiet.

Meum athamanticum Jacq.

Tappenkar, Hofalm; Viehhofriedl; Draugstein - Benkkopf; zerstr.

Heracleum Sphondylium L.

ssp. australe (Härtman) Neuman. Auf Wiesen bei Schwab u.a. hfg.

ssp. montanum (Schleich) Briq. Burnsteineralm; Weisshofalm; Wildbühel; Hirschleiten (Hochmahdl) u.a. Hfg.

Heracleum austriacum L.

Hofalmgebiet, Steineggalm; Liebeseck.

Laserpitium Siler L.

Jägermais nächst Kohlstatt; Jägerbachgraben, Tappenkaranstieg.

Monotropa Hypopitys L. (*M. hypophegea* Wallr.)

Vereinzelte Kreuzsalmals gegen Weissenhofalm; zwischen Stuhlermühle und Mönchsberg; Weg von Fischegg zu den Mauer-eckalmen; Öbristwald gegen Rossfeldeck und Sailbichlwald (*var. glabra* Roth).

Empetrum nigrum L.

Weissenhofalm (im Sattel zwischen Wildbühel und Moosereck) u. Zirmegriedl.

Rhododendron intermedium Tausch.

Jägerbachgraben; Maierkopf; Tappenkaranstieg (Mittelstück) und Abstieg vom Dürnkarkessel durch Kerschbachgraben zur Schwabalm.

Arctostaphylos Uva - ursi (L.) Sprengel.

Geigerau; Kerschbachgraben; Rossfeldeck; Bärnkarkogel (Ennskraxen.)

Arctostaphylos alpina (L.) Spr. (*Arctous alpina* L.)

Geigerau; Jägerbachgraben; Steinkar; Hofalm; Tappenkar.

Androsace lactea L.

Ennskraxenanstieg von Steinkar (auf Felsblöcken) selten.

Androsace obtusifolia All.

Faulkogel; Rothorn; Wildkarkopf; Stierkarkogel; Tappenkar; Kreuzeck und Glingspitze.

Soldanella pusilla Baumg.

Auf Borstwiesen um Hirschleiten und Beisteinpaifen; S Abfall des Zirmeggriedls.

f. *calvicola* Vierh. In feuchten Gesteinfluren am Wildbühel u. unter dem Pappelscheisskirchl.

Soldanella minima Hoppe.

Glingspitze unter Riffel; (gegen Haselloch); ssp. *austriaca* Vierh. Lüdi.

Soldanella montana Willd.

Aufstieg zur Ennskraxn durch Steineggwald (ssp. *eumontana* Lüdi).

Armeria alpina (DC.) Willd.

var. *alpina* (Willd) Mansf. Bärnkarkogel; Rothornanstieg von Hofalm; Tappenkar gegen Draugsteintörl.

Menyanthes trifoliata L.

Wibm - und Ployerauwiesen; nächst Koglerhsl.

Gentiana Crucjata L.

Jägermais nächst Kohlstatt, Hofalm; Jägerbachgraben.

Gentiana prostrata Haenke.

Ennskraxenzug; Gamskarspitze; Glingspitze.

Gentiana utriculosa L.

Rothornscharte; Faulkogelanstieg bei Jägerbachursprung u. im gesamten Ennskraxenzug (Ennskraxen-Kraxenkopf-Hahnkrah-Bärnkarkogel-Liebeseck).

Lappula echinata Gilib. (*L. Myosotis* Moench).

Sagplatz bei Stadlersäge.

Myosotis collina Hoffm.

Pausshalt gegen Mönchsberg im Gebüsch; Ployergrabenbrücke gegen Hirschleiten im Gebüsch.

Scutellaria galericulata L.

Vereinzelt am Jägersee (W Seite) sowie Ployermühlbereich; Prähaus.

Satureia Acinos (L.) Scheele.

Nur Jägerbachgraben.

vgl. Thymus praecox Opitz Weg über Stuhl nach Burnstein Wildbühel - Moosereck.

Physalis Alkekengi L.

Von Sauter u. Hinterhuber für das Gebiet angeführt; jedoch heute verschwunden.

Verbascum austriacum Schott.

Jägermais; Rossfeldgraben; auch am Mönchsberg.

Veronica verna L.

Wirts- und Viehhofpflanzen.

Veronica polita Fries.

Hinterkleinarler Felder.

Veronica agrestis L.

Sagplatz bei Stadlersäge; Viehhof - Felder; um Angerhaus.

Veronica opaca Fries.

Sagplatz bei Stadlersäge (selten); Arlerwirthshof.

Euphrasia brevipila Burnat & Gremli.

ssp. *brevipila* (Burn. et Gremli) Schwarz. Mauereck und Unterhofalm; Rossfeldeckgebiet.

Euphrasia officinalis L. em. Hayne. (E. stricta Host).

Wie vorige, dazu nach Zirmeggriedl; Gründeck und Maderkopf.

Euphrasia drosocalyx Freyn.

Tappenkar; Draugsteintörl.

Euphrasia versicolor Kerner.

Vereinzelt Rossfeldeckgebiet.

Euphrasia minima Jacq.

f. *bicolor* Gremli Tappenkar W Seite gegen Gittenstein; Rossfeldgraben, Zirmeggriedl (oft *grandiflora*); im Steinkar (Scharte gegen Moosereck) *parviflora*.

f. *flava* Gremli Weg zur Hofalm und Sailbichlschlag gegen Zirmegg.

Euphrasia salisburgensis (Hoppe) Funck.

Geigerau nächst Hirschfütterstadtl; Jägermais Schwabalmgebiet; Jägerbachgraben und Hofalm, Schafweide am Liebeseck (hier *forma subalpina* Gren.)

Euphrasia pulchella Kerner.

Am Weg von den Mauereckalmen über die Scharte zwischen Loosbichl und Nebeleck zur Achter- und Filzmoosalm.

Rhinanthus minor L. s. s. (Alectorolophus cristagalli (L.) M. B.)

Viehhofhalt; Stöcklholzplatz; Ployerwiesen.

ssp. *stenophyllus* (Schur) Druce. Achenau von Ployerwiesen bis Aulehen und Kreuzsalgraben.

Rhinanthus Alectorolophus (Scop.) Pollich

s. str. (*Alectorolophus hirsutus* (Lam) All.

ssp. *medius* (Rchb.) Schinz et Thell. Auf Wiesen bei Rinn; Prähaus.

ssp. *Arvensis* (Sempl.) Schinz et Thell. Unter Getreide bei Schwab, Trinker, Oberfloss, Viehhof und Beistein hfg. (auch f. *ellipticus* Hauskn)

- ssp. *buccalis* (Wallr.) Schinz et Thell. Auf Feldern hfg.
Rhinanthus glaber Lam. s.str. (*Alectorolophus major* (Ehrh.)
Rchb. Nächst Wibmmühle; um Rinn ssp. *eumajor* (Stern)
Schw.
ssp. *serotinus* (Schönheit) Oborny. (A. major, ssp. *montanus*
(Saut) Hay, Viehhof- und Wirtspaisengebiet.
Rhinanthus subalpinus (Sterneck) Schinz et Thell.
(*Alectorolophus angustifolius* Gmel. ssp. *subalpinus* Wettst.)
Stuhl, Brandstattleiten, Paussleiten.
Rhinanthus angustifolius (Gmelin) Schwarz.
ssp. *angustifolius* (Gmelin) Schwarz Geigerau; Jägerbach-
graben.
ssp. *lanceolatus* (Kovats) Briq. et Cavill. Steinkar; Liebes-
eck, Viehhofriedl; Mauereckalmen; Biechlalpl; Zirmeggriedl.
Pedicularis Portenschlagii Sauter.
Ennskraxenzug (Hahnkrah), Gittenstein-Tappenkar.
Pedicularis verticillata L.
In feuchten Grasfluren auf dem sogenannten "Wagrainer Spa-
ziergang" d.i. von Steinkar über Moosereck, Wildbühel,
Brandstätt - Ahornkar. Saukar- und Frauenkopf zum Gries-
kareck. Zerstreut bis hfg.
Pedicularis foliosa L.
Im Schafweidegebiet zwischen Bärnkarkogel und Liebeseck.
Pedicularis rosea Wulfen.
Faulkogel; Röthorn; Wildkarkopf; Stierkarkogel; Gamskar;
Glingspitze.
Pedicularis aspleniifolia Flörke.
Tappenkar gegen Gittenstein und Kreuzeck - Riffel.
Die Arten *recutita* L; *rostrato-spicata* Crantz; *rostrato-*
capitata Crantz; und *palustris* L. ebenfalls im Gebiet.
Orobanche lucorum A.Br.
In der Geigerau vereinzelt auf *Berberis vulg.*
Orobanche major L.
Im Jägerseegebiet u.z.T. im Jägerbachgraben auf *Centaurea*
Scabiosa.
Plantago alpina L.
Tappenkar gegen Draugsteintörl und Rossfeldeckgebiet.
Selten.
Galium Aparine L.
Viehhoffelder nächst Kapelle.
ssp. *spurium* (L.) Hartmann. In Feldern bei Viehhof und
Stockham.
Galium pumilum Murray.
f. *pubescens* (Schrad) Hayek Tappenkaranstieg, Schwabalmge-
biet.
f. *glabrum* (Schrad) Hayek. Geigerau, Jägerbach- und Ross-
feldgraben.

var. austriacum (Jacq.) Beck. Hofalmgebiet.

Galium baldense Sprenger. Ennskraxenzug; Wildkarhöhe; Faulkogelanstieg, Rothornfuss; Stierkar; Tappenkar u.a.

Sambucus Ebulus L.

Nur im Waldschlag am Weg von Viehhof nach Mönchsberg.

Valeriana supina Ard.

Schutthalden unter Faulkogel gegen Hofalm; Rothorn (Fliegerinne).

Knautia intermedia Pernh, et Wettst.

Jägerbach- und Kerschbachgraben.

Campanula thyrsoides L.

1945 zwischen Maderkopf und Loosbichl in 1 Exemplar gefunden.

Campanula Scheuchzeri Vill.

ssp. Scheuchzeri (Vill.) Hay. Zimmerschlag gegen Wildbühel und Ennskraxenzug (Liebeseck).

vgl. var. hirta (Hausman) Tappenkar; Jägermais, Hofalm; Jägerbachgraben.

Erigeron atticus Vill.

Von Hofalm gegen Faulkogel in den Schutthalden.

Im Gebiet auch E. acer L. ssp. typicus u. angulosus u. E. alpinus L.

ssp. alpinus (auch f. gracilis) u. ssp. glabratus sowie E. uniflorus.

Inula salicina L.

Vereinzelte Jägermais und Jägerbachgraben.

Artemisia campestris L.

vgl. ssp. alpina (DC) Hegi Viehhofriedl gegen Faulkogelfuss.

Dorona-cum grandiflorum Lam.

Tappenkaranstieg nächst Latschengürtel.

Senecio subalpinus Koch.

Um Burnsteineralm gegen Weissenhofalm und Schidalpl.

Senecio Doronicum L.

Neben S. cineraria DC im Friedhof kultiviert.

Senecio capitatus (Wahlenb.) Steudel (S. integrifolius (L.)

Clairv. em. Cufod. ssp. capitatus (Wahlenb.) Cufod)

Am Liebeseck gegen Jägerbachquellgebiet.

Senecio abrotanifolius Loisel.

Hofalmgebiet und Kohlstatt in der Jägermais unter Hofwand.

Senecio viscosus L.

Sagplatz bei Stadlersäge und bei Botenwirtsbrücke a.d. Ache.

Senecio rupester Waldst. et Kitt. (S. nebrodensis DC)

Kitzsteingrat; Gabelgipfel und im Ennskraxenzug auf dem von Schafen beweideten Gratkamm - Hahnkrah - Bärnkarkogel.

Carlina longifolia Rechb.

Jägerbachgraben, vorderes Tappenkar gegen Wildkar.

Carduus acanthoides L.

Beisteinpalfengebiet; Viehhof- und Wirtspalfen; Kreuzsal- und Steineggalm; Stuhlerleiten gegen Kreuzsalgraben; Trinkergraben u.a.

Carduus crispus L.

Brandstattau; Pausshalt; Angerhaushalt bei Elektrowerk.

Cirsium helenoides (L.) Hill (C. heterophyllum (L.)

Hill, Vereinzelt Tappenkar und Hofalmanstieg und Kerschbachgraben gegen Dürnkaralm.

Cirsium spinosissimum (L.) Scop.

Wildbühelgebiet; Viehhofriedl; Tappenkar; Loosbichl-Achteralm-Filzmoosalm.

Centaurea Scabiosa (L.) Hay.

ssp. Scabiosa (L.) Hay. Jägermais nächst Kohlstätte.

ssp. alpina (Gaud.) Briq. (C. alpestris Hegetschw.) Schwabalm gegen Hirschfutterstadl.

Centaurea pseudophrygia C.A. Meyer (C. phrygia L. ssp. pseudo-

phrygia (C.A. Mey.) Gugl. Geigeraurand gegen Jägersee (nächst demolierter Jägerhütte).

Aposeris foetida (L.) Less.

Nur Ployerau und Kreuzsalau.

Hypochochoeris uniflora Vill.

Tappenkar gegen Gittenstein und Weissgrubenscharte. Selten.

Leontodon helveticus Mérat em. Widder (L. pyrenaicus Gouan)

Am Loosbichl gegen Mauereckalmen.

Leontodon montanus Lam.

f. melanotrichus Vierh. Tappenkar, ziemlich hfg.

Leontodon incanus (L.) Schrank.

Liebeseckabstieg in den Jägerbachgraben; Hofalmgebiet und Wildbühel-Moosreck-Steinkar.

Willemetia stipitata (Jacq.) Cass.

In der Jägermais auf Achenschotterbänken; Ployerau und Wibmau auf versumpften Wiesen, ebenso Viehhofhalt und Stuhlleiten.

Taraxacum officinale Weber

vgl. ssp. levigatum (Willd.) Kotula Am Schwabmühlbachl u. am Achenrain zwischen Stadlerhaus und Botenwirtsbrücke.

ssp. palustre (Lyons) Hartmann. Jägersee W Seite; Steineggalm.

ssp. alpinum (Hoppe) Chenev.

Tappenkar beim Anstieg und im Sattel bei Quellen; Zirmeggriedlabfall gegen Bichlalm; Kesselfallgrabenursprung im Hubalmgebiet; Vorderes Steinkar bei Bründl.

Cicerbita alpina (L.) Wallroth.

Vereinzelt Jägermais u. Hofalmanstieg von Jägermais aus.

Crepis terglouensis (Hacquet) Kerner.

Faulkogelanstieg; Wildkarkopf; Stierkarkogel.

Crepis montana (L.) D.T. (Cr. montana (L.) Tausch.

Vereinzelt Liebeseck im Abstieg zum Jägerbachgraben.

Crepis alpestris (Jacq.) Tausch.

Faulkogelanstieg gegen Neukarscharte; Viehhofriedl; Wildmähder am Liebeseck; Steinkarsattel gegen Moosereck auf Fels.

Crepis praemorsa (L.) Tausch.

Im Augebiet Ployer-Aulken; Hirschleitenabhang gegen Ployergraben und Zirmeggriedlabhang zur Hubalm. Vereinzelt.

Crepis conyzifolia (Gouan) D.T.

Am Gratweg Rossfeldeck-Gründeck-Maderkopf; vereinzelt.

Crepis blattarioides (L.) Vill.

Tappenkar; Hofalm; Jägerbachgraben. Selten

Hieracium staticifolium All.

Im wasserleeren Achenbett w Tappenkaranstieg; Geröllhalde nach Schwabalm und vereinzelt am Jägerbach im Jägerbachgraben.

Hieracium pilosella L.

ssp. vulgare Nägeli-Peter. Kreuzsalau, Geigerau, Jägermais, Schabalmgebiet incl. Kerschbachgraben.

var. subvulgare N.P. Steinkar am Kraxenfuss; Hofalm am Rothornfuss (Bl. spitzlich, Schuppen grau).

ssp. inalpestre N.P. Viehhofriedl; westlich Tappenkar unter Wandabfall, wo die Ache verschwindet (um erst kanpp vor der Schabalmbrücke neuerdings auszutreten).

ssp. subcaulescens N.P. Brandstattmais, Burnsteineralmgebiet; und im Stuhlerwald am Weg dorthin.

ssp. subvirescens N.P. Tappenkaranstieg nach Wasserfallbrücke; Faulkogelanstieg bei Jägerbachursprung.

Hieracium auricula L. em. DC.

ssp. typicum Zahn (auricula N.P.) Von Hinterstuhl zur Burnsteineralm; Mauereckalmgebiet; Steineggwald zum Kraxenanstieg; Jägerbachgraben; Zirmeggriedl; von Fischegg zur Unterhofalm.

var. melaneilema N.P. Ober Bärmoos u. von Zirmegg im Aufstieg zum Riedl; Saualplgebiet.

var. amaureilema N.P. Im ärarischen Schlag oder Stuhl; von Steineggshlerrn zum Kraxenfuss.

var. trichellema N.P. Weissenhofalmgebiet.

Hieracium glaciale Reynier.

ssp. pullum N.P. Jägerbachgraben zum Viehhofriedl u. zum Jgdhaus auf demselben.

Hieracium niphobium N.P. Jägerbachgraben.

vgl. Hieracium Schultesii F.Sch.

Faulkogelanstieg vom Jägerbachursprung zur Neukarscharte u. vereinzelt auch Liebeseckabstieg zum Jägerbachquellgebiet.

Hieracium aurantiacum L.

Nur im Friedhof gepflanzt und daraus verwildernd im Pfarrhofgarten und Kreuzsalfeld an der südl. Friedhofmauer.

Hieracium villosum L.

ssp. eu-villosum Z. Tappenkar nächst Almhütte u.a. (Dr. Reiter)

var. glaucifrons N.P. Im obersten Viehhofgraben gegen Wildmähder am Liebeseck; Gamskarspitze.

Hieracium Morisianum Rchb. (H. villosiceps N.P.)

Tappenkar gegen Maierkopf u. Draugsteintörl u. vom Schutzhaus über den Hag gegen Gittenstein (hier f. calvum N.P.)

Hieracium glaucum All.

Tappenkar gegen Almhütte und Gamskarspitze.

Hieracium bupleuroides Gmelin.

ssp. Schenkii N.P. Tappenkar (f. glabrifolium N.P.); Auf den zum See aufragenden Felsen des Maierkopfes.

Hieracium glabratum Hoppe

Tappenkar, Faulkogelanstieg; Rothorn.

Hieracium valdepilosum Vill.

ssp. Willdenowianum Zahn. Tappenkar (Dr. Reiter).

Hieracium dentatum Hoppe

ssp. subexpallens Z. Viehhofriedl gegen Faulkogelanstieg.

Hieracium bifidum Kit. u. Murorum L. em Huds

Vorbemerkung: Sammelt man das Gebiet incl. der ganzen Radstätter Tauern ab, so findet man, dass sich fast alles um den Formenkreis subbifidifolium Zahn (zu dem noch perviride, Pseudograndidens, lacerisectum, calvifrons u. von H. bifidum die Formen caesiiflorum, cardiobasis, subcaesiceps mit den den 3 letzteren analogen lanzettlichen Formen incisifolium (syn. sinuisifrons Zahn), basicuneatum u. basicuneatifolium gehören) gruppiert.

Am Wege Jägersee zum Tappenkar im Walde der Jägermais die grossen, goldgelben Sterne von H. bifidum Kit.

ssp. subcaesiiceps Zahn (man kann sie auch, da Blätter stark verkahlen, zu cardiobasis Zahn stellen), die ihre Herkunft von H. murorum ssp. semisilvaticiforme nicht leugnen können, die sicherlich auch dort wäre. Auf den Matten um den Tappenkarsee verbreitet bis hfg. (Dr. Reiter): var. senile Kerner mit vereinzelter var. oreites At während ssp. caesiiflorum Almq. f. alpigenum Zahn sehr spärlich ist. ssp. incisifolium Zahn findet sich zerstreut im Jägerbachgraben.

- Hieracium incisum Hoppe
Tappenkar in den Hängen gegen Gittenstein und zur Weissgrubenscharte.
- Hieracium humile Jacq.
Rothorn (Fliegerrinne), Rothornscharte; Stierkarkogel; Gamskarspitz.
- Hieracium Kernerii Ausserd.
Tappenkar (Dr.Reiter).
- Hieracium alpinum (L.) Zahn.
ssp. Halleri (Vill) Zahn. Mauereckalmgebiet, Loosbichl und ober der Tappenkar Almhütte am Weg zum Draugsteintörl.
ssp. melanocephalum Z. Bärnkarkogel im Ennskraxenzug.
- Hieracium nigrescens (Willd.) Zahn.
ssp. pseudo-Halleri Z.
Rossfeldalm, Bichlalm, Zirmeggalm.
- Hieracium atratum (Fr.) Zahn.
ssp. dolichaetum (Arvet-Touv.)
Loosbichl gegen Mauereckalmen.
- Hieracium amplexicaule L.
Jägerbachgraben; Viehhofriedl, Kerschbachgraben, Jägersteig zum Scheibenkopf und Draugstein.
ssp. pulmonarioides (Vill) Zahn.
Viehhofriedl; Jägerbachgraben.
- Hieracium intybaceum All.
Nur Zirmeggriedl und am Gratweg Rossfeldeck zum Gründeck.
- Hieracium pallidiflorum Jord.
var. Huteri (Hausman) Glingspitze gegen Haselloch-Tappenkar.
- Hieracium prenanthoides Vill.
Glingspitze Südseite aber auch im Hang unter Riffel zum Tappenkar und Hänge Gittenstein-Tappenkar und Gamskarspitz-Tappenkar.
- Hieracium umbellatum L.
An den Waldrändern bei Mitterau, Einöd, am Beistein- und Stockhampalven; Ployerau und Kreuzsalau. f. putatum Z. an Waldrändern hfg.
var. monticola Jord. Am Hang zwischen Einöd- und Brandstättbrücke gegen Bibelforschertempel.
- Hieracium laevigatum Willd.
Pausshaltgebüsch; Waldrand zwischen Ployer und Aulehen. Kreuzsalau und Hang von Hinterstuhl gegen Kreuzsalgraben.
- Hieracium murorum L. em. Hudson.
var. gypsophyllum Z. und sv. vergleiche Vorbemerkung. Im Waldschlag gegen Zirmegg; in den Wäldern um Steinegg,

Hirschleiten, Sailbichl, Öbrist, Deubl; Jägermais, Geiger-
au, Hofalm- und Tappenkaranstieg u.z.T. auch noch Tappen-
karanstieg u.z.T. auch noch Tappenkarscharte.

vgl. var. *Wulfenii* Z. Rossfeldgraben.

Hieracium maculatum Sm.

Steineggwald gegen Kraxenanstieg und Ployerwald gegen Zirm-
eggalmen.

Hieracium Lachenalii Gmelin (H. *vulgatum* Fries.)

ssp. *irriguum* (Fr.) Zahn. Tappenkar im Alpenrosenhang;

Schwabalm nächst Hirschfutterhütte; Weg durch Ployerwald
zum Zirmegg.

vgl. ssp. *anfractum* (Fr.) Zahn. f. *alpestre* Uechtr.

Bei demolierter Unterviehhofalm im Jägerbachgraben.

Nachtrag: Obige Beiträge zur Flora des Kleinarltales mit
dem Jägersee und Tappenkar stellen nur einen kurzen Auszug
der Lokalmonographie dar, die der Gefertigte 1951 unter dem
Titel "F l o r a d e s K l e i n a r l t a l e s" mit
besonderer Berücksichtigung der Naturschutzgebiete Jägersee
mit Geigerau und Tappenkar mit Jägermais verfasste, aber
leider nicht veröffentlichen konnte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur Salzburg](#)

Jahr/Year: 1952

Band/Volume: [BOT_A2](#)

Autor(en)/Author(s): Schwaighofer Matthias

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Landes Salzburg. II. Beiträge zur Flora des Kleinarltales mit dem Jägersee u. Tappenkar. 11-34](#)