

lezent

MITTEILUNGEN

der Münchner Entomologischen Gesellschaft, e. V.

4. Jahrgang 1913. München, März u. April. Nummer 3 u. 4.

Ausgegeben am 20. April 1913.

(Nachdruck verboten.)

**Bericht über die im Sommer und Herbst 1912
und Januar 1913 von meiner Frau und mir gezüchteten
Lepidopteren-Arten.**

1. *Papil. v. Feisthamelii*. Aus Cuenca, Castilien, Juli 1912. Von Mandelbäumen.
2. *Thaïsrumina*. Aus Andalusien. In Anzahl von *Aristolochia* gezogen.
3. *Zegris v. meridionalis*. In Castilien von Cruciferen (*Sinapis*) eine kleine Anzahl gezogen.
4. *Euchloë belemia* und *gen. aest. glauca*. In Andalusien (*Chiclana*) von *Sinapis*-Arten gezogen.
5. *Euchloë tagis*. Die Raupen auf weißen Cruciferen (*Iberis*) in *Chiclana* (April 1912) gezogen.
6. *Euchloë belia* und *gen. aest. ausonia*. Von *Sinapis* in Andalusien mehrfach gezogen.
7. *Euchloë euphenoides*. Die Raupen in Anzahl bei *Chiclana* (Andalusien) (April 1912) auf *Capsella* gefunden und die Falter Februar 1913 in schönen ♂ ♀ Exemplaren aus den überwinterten Puppen erhalten.
8. *Lampides boeticus*. Die Raupen in den Schoten einer großen Papilionacee in Mehrzahl gefunden (April bis Mai, — Andalusien) und im Mai eine große Anzahl schöner großer Stücke gezogen.
9. *Lampidestelicanus*. Ebenfalls aus Schoten einer großen *Vicia* gezogen. Mai 1912.
10. *Thestorballus*. Von denselben Schoten mit *boeticus* eine Anzahl Puppen gezogen.
11. *Deilephila livornica*. Die Raupen im Mai in größerer Anzahl bei *Chiclana* in den Weinplantagen gefunden und aus Puppen im Juni die Falter erhalten.

12. *Chaerocampa celerio*. Bei Chiclana (Andalusien) einzeln die Raupe im Mai gefunden und mehrere schöne Stücke im Juni aus den Puppen gezogen.
13. *Orgya splendida*. Die Raupen in Castilien mehrfach auf *Ulex* gefunden und im Juli Falter erhalten.
14. *Epicnaptera suberifolia*. Im Juni die Raupen auf Steineichen bei Cuenca (Castilien) gefunden und im Juli eine Anzahl prächtiger Exemplare nebst der Var. *rubra* aus Puppen gezogen.
15. *Taragama repanda*. Im ersten Frühjahr (März und April) 1912 bei Cadix die Raupen auf *Retama* gefunden und auch die Gespinnte der Puppen und eine Anzahl sehr großer prächtiger Exemplare gezogen (Mai).
16. *Lasiocampa trifolii* v. *retamae*. An gleichen Stellen mit *repanda* die Raupen gefunden und im Oktober eine Anzahl variierender Stücke aus den Puppen gezogen.
17. *Lemonia philopalus*. Ein einziges prachtvolles ♂ dieser höchst seltenen Art aus einer Puppe im Dezember 1912 gezogen. Die Raupe bei Chiclana im April gefunden.
18. *Graellsia Isabellae*. Von einer größeren Anzahl Raupen, die wir im Juli 1912 in den Pinien-Wäldern Hoch-Castiliens fanden, erzogen wir große, kräftige Puppen.
19. *Trichiura ilicis*. Nur wenige Puppen erhielten wir von Raupen, die wir bei Chiclana einzeln auf *Quercus coccifera* im April 1912 fanden.
20. *Cucullia scrophulariphila*. Auf einer großen *Scrophularia* die Raupe in Mehrzahl bei Chiclana gefunden. Im November und wieder im Januar 1913 eine Anzahl Falter gezogen.
21. *Ocnogyna zoraida*. Von dieser seltenen Arctiide fanden wir in Castilien (Cuenca) im Juli 1912 die Raupen an *Ulex astragalus* und erzogen eine Anzahl Puppen, aus denen im Februar schon mehrere Exemplare ♂♂ und ♀♀ schlüpften.
22. *Arctica villica* v. *Konewkai*. Aus einem bei Chiclana (Andalusien) im März gefundenen ♀ erzogen wir eine Anzahl Raupen, die den ganzen Sommer bis in den späten Herbst hinein langsam wachsend sich endlich im November verpuppten und nach einigen Wochen die Falter lieferten.

Max Korb.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [004](#)

Autor(en)/Author(s): Korb Max

Artikel/Article: [Bericht über die im Sommer und Herbst 1912 und Januar 1913 von meiner Fau und mir gezüchteten Lepidopteren-Arten. 17-18](#)