nchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentr

Waldlichtung bei Forstkasten eine verdunkelte ab. *thalia* Hb. von *Argynnis selene* Schiff.

Am 10. Juli 1912 endlich erbeutete ich das beifolgend abgebildete Exemplar von *Phalera bucephala* L. Dasselbe ist sehr kräftig gezeichnet und fällt durch eine besonders dunkle, W-förmige Mittelbinde der Hinterflügel auf, weshalb ich das Stück in meiner Sammlung als ab. *fasciata* bezeichnet habe, ohne aber damit eine neue Benennung beanspruchen zu wollen.

Dabei muß ich bemerken, daß ich die einheimischen Schmetterlinge schon seit Jahren nicht mehr intensiv sammle, sondern eigentlich nur das nehme, was mir gerade in den Weg fliegt. Ich bin deshalb überzeugt, daß andere Sammler noch viel mehr Aberrationen aus den beiden heißen Jahren beibringen können, zu deren Veröffentlichung ich hiermit eine Anregung geben möchte.

Nachtrag zum Köderfang im Schleißheimer und Dachauer Moor 1912,

4. Jahrgang 1913 und 6. Jahrgang 1915.

Von Martin Best.

Diphtera alpium Osb.	17. VI. 15
Colocasia coryli L.	27. V. 15
Euxoa nigricans L.	10. VII. 15
Harmodia rivularis F.	20. V. 16
Monima gothica L.	30. III. 15
„ *incerta* Hufn. ab. *subcarnea* Warr.	30. III. 15
„ „ „ „ *fuscatus* Haw.	30. III. 15
„ *pulverulenta* Esp. ab. *rufa* Tutt	30. III. 15
„ *stabilis* View.	5. IV. 15
„ *gracilis* F.	7. IV. 18
„ *opima* Hbn.	15. IV. 15
Lithophane furcifera Hufn.	2. VIII. 15, 7. X. 15
Oligia bicoloria Vill.	25. VII. 17, 10. VIII. 16, 16. VIII. 16
„ „ ab. *vinctuncula* Hbn. .	12. VIII. 17

nchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentr

Crymodes furva Hbn. . . . . 24. V. 15
Phytometra confusa Steph. . . . . 8. VIII. 16
Conistra vaccinii L. ab. *ochrea* Tutt . . 22. X. 16
„ „ „ *mixta* Stgr. . . 22. X. 16
„ „ „ *glabroides* Fuchs 22. X. 16
„ „ „ *spadicea* Hbn. . 22. X. 16
Apamea nictitans Bkh. ab. *auricula* Haw. . 20. IX. 15
„ „ „*erythrostigma* Haw. 20. IX. 15
„ „ „ *obscura* Tutt . . 20. IX. 15
mit vielen Übergängen und Aberrationen.
Xanthoecia flavago Esp. . . . . 13. IX. 16, 7. X. 16
Hydroecia micacea Esp. . . . . 10. VIII. 15, 19. VIII. 15
Phragmatiphila typhae Thnbg. . . . . 10. VIII. 16
Rhizedra lutosa Hbn. ab. *rufescens* Tutt . 26. IX. 15 } Lichtfang
„ „ „ *crassicornis* Haw. 26. IX. 15 } am Schilf.
Chloridea ononis F. ab. *intensiva* Warr. 5. VIII. 17
Eustratia olivana Schiff, Juli häufig, Birkenschlag, bei Tag erbeutet.
Panemeria tenebrata Sc. 15. V. 18
bei Tag erbeutet.
Catocala nupta L. trans. ab. *rubridens* Warr. 15. IX. 12
der keilförmige Zahn längs Ader 2 nicht ganz so spitz und tief vorspringend wie Abb. Seitz Tafel Bd. III Seite 55 a, während der Hufeisenfleck auf Ader 1 vorhanden ist.
Catocala fraxini L. . . . . 12. IX. 18
nur einmal am Köder beobachtet.

Schriftleitung: Max Korb, München, Akademiestraße 23.
Druck der G. Franz'schen Buchdruckerei (G. Emil Mayer) München.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 009

Autor(en)/Author(s): Best Martin

Artikel/Article: Nachtrag zum Köderfang im Schleissheimer und Dachauer Moor 1912. 15-16