nchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentr

Tagfalter, Spinner und Schwärmer
aus dem Schleißheimer-Dachauer Moos.

Von Martin Best.

Papilio machaon L.	Mai-Juni	Konnte erst nach langen Jahren feststellen, daß *machaon* in diesem Moor bestimmt vorkommt, da ich erst im August 1917 die Raupe (6 Stück) gefunden habe nicht häufig
Aporia crataegi L.	Mai-Juni	nicht häufig
Pieris brassicae L.	Mai-Juni	
„ *rapae L.*	Juni	im Schwarzhölzl häufig
„ *ab flavescens ♀ Röb.*	Juli	
„ *ab immaculata Ckll.*	Juli	
„ *napi L.*	Mai-Juni	im ganzen Moor nicht häufig
„ *ab nana ♀ Röb.*		
Anthocharis cardamines L.	Mai-Juni	häufig
„ *ab. hesperides ♀ Newnham*		
„ *ab. Alberti Hoffm.*		
„ *ab. quadripunctata Fuchs*		
Gonopterix rhamni L.	Juni-Juli	nicht häufig
Colias hyale L.	Mai-Septbr.	nicht häufig
Erebia medusa F.	Mai-Juni	häufig
„ *ab. psodea Hbn.*		Augenzahl ändert sich bis
„ *ab. pherusa Schultz*		Vorderflügel 2, Hinterflügel 1 Auge
Melanargia galathea F.	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
Satyrus dryas Scop.	Juli-August	häufig, Richtg. Schleißheim
„ *semele L.*	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
Pararge maera L.	Mai-Juni	häufig, Schwarzhölzl
Aphantopus hyperantus L.	Juli-August	häufig, Schwarzhölzl
Epinephele jurtina L.	Juli-August	häufig
Coenonympha hero L.	Juni	häufig im Schwarzhölzl
„ *iphis W.V.*	Juli	einzeln, Schwarzhölzl
„ *pamphilus L.*	Mai-Septbr.	einzeln
„ *tiphon Rott.*	Juni	Kanal, selten
Pyrameis atalanta L.	Mai-Septbr.	Birkenschlag und Schwarzhölzl, nicht häufig

nchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentr

Pyrameis cardui L.	August	nicht häufig
Vanessa io L.	Juni-Juli	nicht häufig
„ *urticae L.*	Juni-Juli	häufig
„ *antiopa L.*	Juli	vereinzelt, Birkenschlag
Polygonia c-album L.	Juli-August	vereinzelt, Schwarzhölzl
Araschnia levana L.	Mai-Juni	vereinzelt, Birkenschlag
Melitaea aurinia Rott.	Mai-Juni	häufig
ab. artemis F.		1 Paar mit fast ganz verdunkelten Vorder- und Hinterflügeln
ab. ochrea Tutt		
ab. virgatta Tutt		
ab. obscurata Krul.		
„ *cinxia L.*	Juli	nicht häufig
„ *phoebe Knoch*	Juli-August	nicht häufig
„ *dictynna Esp.*	Juli-August	allgem. häufiger, Schwarzh.
Argynnis selene Schiff	Mai	häufig, Birkenschlag, Schwarzhölzl
ab. selenia Frr.	September	häufig
„ *euphrosyne L.*	Mai-Juni	häufig, Schwarzhölzl, mit schönen, verdunk. Stücken
„ *dia L.*	April-Mai August-Sept.	häufig
ab. vittata Spuler		1 ♂ mit fast ganz verdunkelten Vorder- und Hinterflügeln
ab. nigrostriata		
und Übergänge		
„ *ino Rott.*	Mai-Juni	häufig
„ *lathonia L.*	Juli	vereinzelt
„ *aglaja L.*	Juli	nicht häufig
„ *adippe L.*	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
„ *paphia L.*	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
Nemeobius lucina L.	Mai-Juni	vereinzelt, Schwarzhölzl
Callophrys rubi L.	Mai	Schwarzhölzl und Kanal
ab. immaculata Fuchs		
ab. punctata Tutt		
Thecla pruni L.	Juli	vereinzelt, Kanal
Chrysophanus virgaureae L.	Juni-Juli	nicht häufig
„ *hippothoë L.*	Mai	nicht häufig
„ *dorilis Hufn.*	Mai	nicht häufig
v. albicans Fuchs		
ab. strandi Schultz		
„ *phlaeas L.*	Mai-Septbr.	nicht häufig
ab. Schmidtii Gerh.		

nchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentr

Everes argiades Pall	Mai	vereinzelt
Lycaena bellargus Rott.	Juni-Juli	häufig
coridon Poda	Juli	nicht häufig, bes. am Kanal
baton Bgstr.	Juli	vereinzelt, zwischen Dachau und Schleißheim auf Wiesen
Cyaniris argiolus L.	Mai-Juni	vereinzelt, Schwarzhölzl
Hesperia malvae L.	Mai-Juli	häufig
ab. taras Bgstr.		
ab. alveus Hbn.	Juli	einzeln
Thanaos tages L.	Mai-Juli	nicht häufig
Pamphila palaemon Pall.	Mai	häufig
Augiades thaumas Hufn.	Mai	nicht häufig
Erynnis comma L.	Juli	nicht häufig

Procris statices L.	Juni	Schwarzhölzl, häufig
„ *globulariae Hbn.*	„	auf Wiesen nicht selten
Zygaena purpuralis Brünnich	Juli	Kanal, nicht häufig
„ *achilleae Esp.*	„	häufig
„ *meliloti Esp.*	„	selten, nur an einem kleinen Platz vor dem Schwarzhölzl (Richtung Kanal)
Miltochrista miniata Forst.	„	Birkenschlag, Kanal, vereinzelt
Gnophria rubricollis L.	Juli	Birkenschlag, vereinzelt
Phragmatobia fuliginosa L.	Mai-Juni	nicht häufig
Parasemia plantaginis L.	Juni-Juli	häufig
Spilosoma menthastri Esp.	Juli-August	nicht häufig
Diacrisia sannio L.	Juni-Juli	häufig
Arctia caja L.	„	nicht häufig
Hipocrita jacobaeae L.	Juni	nicht häufig
Dasychira fascelina L.	Juli	selten
Dasychira pudibunda L.	Mai-Juni	nicht häufig, Birkenschlag
Orgia antiqua L.	Juli-August	nicht häufig, Birkenschlag
Malacosoma neustria L.	Juni-Juli	am Kanal, nicht häufig
Lasiocampa quercus L.	Juli	nicht häufig
„ *trifolii Esp.*	Juli-August	nicht häufig
Macrothylacia rubi L.	Juli	nicht häufig

nchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentr

Cosmotriche potatoria L.	August	nicht häufig, Birkenschlag
Dendrolimus pini L.	Juli	nicht häufig, Schwarzhölzl
Endromis versicolora L.	April	nur 1 ♂ im Flug beobachtet
Drepana falcataria L.	Mai	am Kanal, nicht häufig
„ *lacertinaria L.*	Juli	Birkenschlag, nicht häufig
Cilix glaucata Scop.	„	Birkenschlag, nicht häufig
Eudia pavonia L.	Mai	nicht häufig
Sphinx pinastri L.	Juni	nicht häufig, Schwarzhölzl
Mimas tiliae L.	Mai	„ „ Birk., Schwarzh.
Smerinthus ocellata L.	Juni	vereinzelt, Birkenschlag
Amorpha populi L.	„	vereinzelt, Birkenschlag
Haemorrhagia fuciformis L.	Juni-Juli	häufig, Birkenschlag vereinzelt, Schwarzhölzl
Macroglossum stellatarum L.	Juli-August	nicht häufig
Pergesa elpenor L.	Juni	nicht häufig, Birkenschlag
„ *porcellus L.*	„	häufig, Birkenschlag
Cerura bicuspis Bkh.	Mai	selten, Birkenschlag
„ *furcula Clerck.*		
Dicranura vinula L.	Juni	nicht häufig
Pheosia dictaeoides Esp.	„	nicht häufig
Notodonta dromedarius L.	April	nicht häufig
„ *ziczac L.*	Juni	nicht häufig
Leucodonta bicoloria Schiff.	„	selten, Birkenschlag
Lophopteryx camelina L.	Juli	nicht häufig, Birkenschlag
Pterostoma palpina L.	„	vereinzelt
Phalera bucephala L.	Juni	nicht häufig
Pygaera pigra Hufn.	Mai	einzeln
Thyatira batis L.	Juli	Kanal, selten
Palimpsestis duplaris L.	„	häufig, Birkenschlag
Polyploca flavicornis L.	Mai	nicht häufig, Birkenschlag
Cossus cossus L.	Juli	selten
Phragmataecia castaneae Hbn.	„	selten, Falter durchweg kleiner und dunkler bestäubt als diejenigen aus der Frankfurter Gegend
Hepialus hecta L.	Juni	häufig

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 009

Autor(en)/Author(s): Best Martin

Artikel/Article: Tagfalter, Spinner und Schwärmer aus dem Schleißheimer-Dachauer Moos. 69-72