

Tagfalter, Spinner und Schwärmer aus dem Schleißheimer-Dachauer Moos.

Von Martin Best.

<i>Papilio machaon</i> L.	Mai-Juni	Konnte erst nach langen Jahren feststellen, daß <i>machaon</i> in diesem Moor bestimmt vorkommt, da ich erst im August 1917 die Raupe (6 Stück) gefunden habe nicht häufig
<i>Aporia crataegi</i> L.	Mai-Juni	nicht häufig
<i>Pieris brassicae</i> L.	Mai-Juni	
„ <i>rapae</i> L.	Juni	im Schwarzhölzl häufig
„ <i>ab flavescens</i> ♀ Rüb.	Juli	
„ <i>ab immaculata</i> Ckll.	Juli	
„ <i>napi</i> L.	Mai-Juni	im ganzen Moor nicht häufig
„ <i>ab nana</i> ♀ Rüb.		
<i>Anthocharis cardamines</i> L.	Mai-Juni	häufig
„ <i>ab. hesperides</i> ♀ Newnham		
„ <i>ab. Alberti Hoffm.</i>		
„ <i>ab. quadripunctata</i> Fuchs		
<i>Gonopteryx rhamni</i> L.	Juni-Juli	nicht häufig
<i>Colias hyale</i> L.	Mai-Septbr.	nicht häufig
<i>Erebia medusa</i> F.	Mai-Juni	häufig
„ <i>ab. psodea</i> Hbn.		Augenzahl ändert sich bis Vorderflügel 2, Hinterflügel 1 Auge
„ <i>ab. pherusa</i> Schultz		
<i>Melanargia galathea</i> F.	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
<i>Satyrus dryas</i> Scop.	Juli-August	häufig, Richtg. Schleißheim
„ <i>semele</i> L.	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
<i>Pararge maera</i> L.	Mai-Juni	häufig, Schwarzhölzl
<i>Aphantopus hyperantus</i> L.	Juli-August	häufig, Schwarzhölzl
<i>Epinephele jurtina</i> L.	Juli-August	häufig
<i>Coenonympha hero</i> L.	Juni	häufig im Schwarzhölzl
„ <i>iphis</i> W.V.	Juli	einzel, Schwarzhölzl
„ <i>pamphilus</i> L.	Mai-Septbr.	einzel
„ <i>tiphon</i> Rott.	Juni	Kanal, selten
<i>Pyrameis atalanta</i> L.	Mai-Septbr.	Birkenschlag und Schwarzhölzl, nicht häufig

<i>Pyrameis cardui</i> L.	August	nicht häufig
<i>Vanessa io</i> L.	Juni-Juli	nicht häufig
„ <i>urticae</i> L.	Juni-Juli	häufig
„ <i>antiopa</i> L.	Juli	vereinzelt, Birkenschlag
<i>Polygonia c-album</i> L.	Juli-August	vereinzelt, Schwarzhölzl
<i>Araschnia levana</i> L.	Mai-Juni	vereinzelt, Birkenschlag
<i>Melitaea aurinia</i> Rott.	Mai-Juni	häufig
<i>ab. artemis</i> F.		1 Paar mit fast ganz verdunkelten Vorder- und Hinterflügeln
<i>ab. ochrea</i> Tutt		
<i>ab. virgatta</i> Tutt		
<i>ab. obscurata</i> Krul.		
„ <i>cinxia</i> L.	Juli	nicht häufig
„ <i>phoebe</i> Knoch	Juli-August	nicht häufig
„ <i>dictynna</i> Esp.	Juli-August	allgem. häufiger, Schwarzh.
<i>Argynnis selene</i> Schiff	Mai	häufig, Birkenschlag, Schwarzhölzl
<i>ab. selenia</i> Frr.	September	häufig
„ <i>euphrosyne</i> L.	Mai-Juni	häufig, Schwarzhölzl, mit schönen, verdunk. Stücken
„ <i>dia</i> L.	April-Mai August-Sept.	häufig
<i>ab. vittata</i> Spuler		1 ♂ mit fast ganz verdunkelten Vorder- und Hinterflügeln
<i>ab. nigrostriata</i> und Übergänge		
„ <i>ino</i> Rott.	Mai-Juni	häufig
„ <i>lathonia</i> L.	Juli	vereinzelt
„ <i>aglaja</i> L.	Juli	nicht häufig
„ <i>adippe</i> L.	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
„ <i>paphia</i> L.	Juli	vereinzelt, Schwarzhölzl
<i>Nemeobius lucina</i> L.	Mai-Juni	vereinzelt, Schwarzhölzl
<i>Callophrys rubi</i> L.	Mai	Schwarzhölzl und Kanal
<i>ab. immaculata</i> Fuchs		
<i>ab. punctata</i> Tutt		
<i>Thecla pruni</i> L.	Juli	vereinzelt, Kanal
<i>Chrysophanus virgaureae</i> L.	Juni-Juli	nicht häufig
„ <i>hippotoë</i> L.	Mai	nicht häufig
„ <i>dorilis</i> Hufn.	Mai	nicht häufig
<i>v. albicans</i> Fuchs		
<i>ab. strandi</i> Schultz		
„ <i>phlaeas</i> L.	Mai-Septbr.	nicht häufig
<i>ab. Schmidtii</i> Gerh.		

<i>Everes argiades</i> Pall	Mai	vereinzelt
<i>Lycaena bellargus</i> Rott.	Juni-Juli	häufig
<i>coridon</i> Poda	Juli	nicht häufig, bes. am Kanal
<i>baton</i> Bgstr.	Juli	vereinzelt, zwischen Dachau und Schleißheim auf Wiesen
<i>Cyaniris argiolus</i> L.	Mai-Juni	vereinzelt, Schwarzhölzl
<i>Hesperia malvae</i> L.	Mai-Juli	häufig
<i>ab. taras</i> Bgstr.		
<i>ab. alveus</i> Hbn.	Juli	einzel
<i>Thanaos tages</i> L.	Mai-Juli	nicht häufig
<i>Pamphila palaemon</i> Pall.	Mai	häufig
<i>Augiades thaumas</i> Hufn.	Mai	nicht häufig
<i>Erynnis comma</i> L.	Juli	nicht häufig
<hr/>		
<i>Procris statices</i> L.	Juni	Schwarzhölzl, häufig
„ <i>globulariae</i> Hbn.	„	auf Wiesen nicht selten
<i>Zygaena purpuralis</i>		
<i>Brünnich</i>	Juli	Kanal, nicht häufig
„ <i>achilleae</i> Esp.	„	häufig
„ <i>meliloti</i> Esp.	„	selten, nur an einem kleinen Platz vor dem Schwarzhölzl (Richtung Kanal)
<i>Miltochrista miniata</i> Forst.	„	Birkenschlag, Kanal, vereinzelt
<i>Gnophria rubricollis</i> L.	Juli	Birkenschlag, vereinzelt
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> L.	Mai-Juni	nicht häufig
<i>Parasemia plantaginis</i> L.	Juni-Juli	häufig
<i>Spilosoma menthastri</i>		
<i>Esp.</i>	Juli-August	nicht häufig
<i>Diacrisia sannio</i> L.	Juni-Juli	häufig
<i>Arctia caja</i> L.	„	nicht häufig
<i>Hipocrita jacobaeae</i> L.	Juni	nicht häufig
<i>Dasychira fascelina</i> L.	Juli	selten
<i>Dasychira pudibunda</i> L.	Mai-Juni	nicht häufig, Birkenschlag
<i>Orgia antiqua</i> L.	Juli-August	nicht häufig, Birkenschlag
<i>Malacosoma neustria</i> L.	Juni-Juli	am Kanal, nicht häufig
<i>Lasiocampa quercus</i> L.	Juli	nicht häufig
„ <i>trifolii</i> Esp.	Juli-August	nicht häufig
<i>Macrothylacia rubi</i> L.	Juli	nicht häufig

<i>Cosmotriche potatoria</i> L.	August	nicht häufig, Birkenschlag
<i>Dendrolimus pini</i> L.	Juli	nicht häufig, Schwarzhölzl
<i>Endromis versicolora</i> L.	April	nur 1 ♂ im Flug beobachtet
<i>Drepana falcataria</i> L.	Mai	am Kanal, nicht häufig
„ <i>lacertinaria</i> L.	Juli	Birkenschlag, nicht häufig
<i>Cilix glaucata</i> Scop.	„	Birkenschlag, nicht häufig
<i>Eudia pavonia</i> L.	Mai	nicht häufig
<i>Sphinx pinastri</i> L.	Juni	nicht häufig, Schwarzhölzl
<i>Mimas tiliae</i> L.	Mai	„ „ Birk., Schwarzh.
<i>Smerinthus ocellata</i> L.	Juni	vereinzelt, Birkenschlag
<i>Amorpha populi</i> L.	„	vereinzelt, Birkenschlag
<i>Haemorrhagia fuci-</i> <i>formis</i> L.	Juni-Juli	häufig, Birkenschlag ver-
<i>Macroglossum stella-</i> <i>tarum</i> L.	Juli-August	vereinzelt, Schwarzhölzl
<i>Pergesa elpenor</i> L.	Juni	nicht häufig
„ <i>porcellus</i> L.	„	nicht häufig, Birkenschlag
<i>Cerura bicuspis</i> Bkh.	Mai	häufig, Birkenschlag
„ <i>furcula</i> Clerck.		selten, Birkenschlag
<i>Dicranura vinula</i> L.	Juni	nicht häufig
<i>Pheosia dictaeoides</i> Esp.	„	nicht häufig
<i>Notodonta dromedarius</i> L.	April	nicht häufig
„ <i>ziczac</i> L.	Juni	nicht häufig
<i>Leucodonta bicoloria</i> Schiff.	„	selten, Birkenschlag
<i>Lophopteryx camelina</i> L.	Juli	nicht häufig, Birkenschlag
<i>Pterostoma palpina</i> L.	„	vereinzelt
<i>Phalera bucephala</i> L.	Juni	nicht häufig
<i>Pygaera pigra</i> Hufn.	Mai	einzelne
<i>Thyatira batis</i> L.	Juli	Kanal, selten
<i>Palimpsestis duplaris</i> L.	„	häufig, Birkenschlag
<i>Polyploca flavicornis</i> L.	Mai	nicht häufig, Birkenschlag
<i>Cossus cossus</i> L.	Juli	selten
<i>Phragmataecia casta-</i> <i>neae</i> Hbn.	„	selten, Falter durchweg kleiner und dunkler be- stäubt als diejenigen aus der Frankfurter Gegend
<i>Hepialus hecta</i> L.	Juni	häufig