

Meine großen Serien Apollos von anderen Fluggebieten Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz enthalten nur einige schwache Uebergänge zu dieser Aberration. Während die zwei ♂♂ vom Königsee typische *bartholomaeus* darstellen, zeigt der ♂ vom Petersberg auch sonst auffallende Abweichungen.

Die Submarginale ist vom Glassaum breit getrennt, sehr dunkel und kräftig entwickelt und scheint mehr nach der Flügelmitte gerückt; sie reicht bis zum Hinterrand. Die Umrahmung der Hinterflügel-Ocellen ist sehr breit schwarz, das Rot matt dunkel und stark reduziert. Basalfärbung und Analflecken sind tief schwarz.

P. S. Anfang Mai dieses Jahres schlüpfte auch ein prächtiges *nigrodivisa* ♂ der Karwendelform *claudius* Bell. Es war der erste Ankömmling aus einer von G. Hansum, München, mit gutem Erfolg durchgeführten Eizucht.

F. Boegl.

## Spannerartige Nachtfalter

aus dem Schleißheimer-Dachauer Moos.

Von Martin Best.

|  |             |                          |
|--|-------------|--------------------------|
| <i>Brephos parthenias</i> L.           | Mai         | häufig, Birkenschlag     |
| „ <i>notha</i> Hb.                     | „           | vereinzelt, Birkenschlag |
| <i>Alsophila aescularia</i><br>Schiff. | „           | vereinzelt, Birkenschlag |
| <i>Odezia atrata</i> L.                | Juni-Juli   | häufig                   |
| <i>Hipparchus papilionaria</i> L.      | Juli-August | vereinzelt, Birkenschlag |
| <i>Jodis lactearia</i> L.              | Juni        | vereinzelt, Birkenschlag |
| <i>Timandra amata</i> L.               | August      | vereinzelt, Birkenschlag |
| <i>Acidalia immorata</i> L.            | Juni        | häufig                   |
| „ <i>nemoraria</i> Hbn.                | Juni-Juli   | häufig                   |
| „ <i>ornata</i> Scop.                  | „           | vereinzelt, Birkenschlag |
| <i>Ptychopoda serpentata</i><br>Hufn.  | Juni        | nicht häufig             |

|                                      |           |   |
|--------------------------------------|-----------|---|
| <i>Ptychopoda humiliata</i>          |           |   |
| <i>Hufn.</i>                         | Juli      | nicht häufig  |
| „ <i>emarginata</i> L.               | „         | nicht häufig  |
| „ <i>muricata</i> <i>Hufn.</i>       | „         | einzeln   |
| <i>Cosymbia pendularia</i>           |           |   |
| <i>Cl.</i>                           | „         | häufig, Birkenschlag  |
| „ <i>punctaria</i> L.                | Juni      | nicht häufig  |
| <i>Ortholitha moeniata</i>           |           |   |
| <i>Scop.</i>                         | Juli      | häufig  |
| <i>Mesotype virgata</i> <i>Hufn.</i> | Mai       | häufig  |
| <i>Nothopteryx carpinata</i>         |           |   |
| <i>Bkh.</i>                          | April-Mai | nicht häufig  |
| <i>Operophtera brumata</i> L.        | Oktober   | häufig  |
| <i>Oporinia autumnata</i>            |           |   |
| <i>Bkh.</i>                          | „         | häufig, Birkenschlag<br>(wurde mit vielen <i>ab.</i> gefangen, welche später noch bekannt gegeben werden) |
| <i>Triphosa dubitata</i> L.          | August    | einzeln   |
| <i>Calocalpe undulata</i> L.         | September | einzeln, Birkenschlag   |
| <i>Lygris testata</i> L.             | August    | nicht häufig  |
| <i>Cidaria ocellata</i> L.           | Juli      | nicht häufig  |
| „ <i>variata</i> Schiff.             | „         | nicht häufig, Schwarzhölzl  |
| „ <i>truncata</i> <i>Hufn.</i>       | Juni-Juli | Birkenschlag  |
| „ <i>fluctuata</i> L.                | „         | häufig, Birkenschlag  |
| „ <i>ferrugata</i> <i>Cl.</i>        | „         | häufig, Birkenschlag  |
| <i>ab unidentaria</i>                |           |   |
| <i>Haw.</i>                          |           |   |
| „ <i>quadrifasciata</i>              |           |   |
| <i>Cl.</i>                           | Juli      | nicht häufig  |
| „ <i>bilineata</i> L.                | „         | nicht häufig  |
| „ <i>corylata</i> <i>Thnbg.</i>      | Mai       | nicht häufig  |
| „ <i>hastata</i> L.                  | Mai-Juni  | häufig, Birkenschlag  |
| <i>ab. laxata</i> <i>Krulik</i>      |           |   |
| „ <i>tristata</i> L.                 | „         | häufig  |
| „ <i>alternata</i> <i>Mill.</i>      | „         | häufig  |
| „ <i>coerulata</i> F.                | Juli      | nicht häufig, Birkenschlag  |
| <i>Pelurga comitata</i> L.           | „         | nicht häufig, Birkenschlag  |
| <i>Hydrelia flammeolaria</i>         |           |   |
| <i>Hufn.</i>                         | Mai-Juni  | nicht häufig  |
| <i>Abraxas sylvata</i> <i>Scop.</i>  | „         | nicht häufig, Birkenschlag  |

*Lomaspilis marginata*

L.

Mai-Juni Kanal, häufig

*ab. nigro fasciata*

Schöyen

*ab. pollutaria*

Hbn.

ferner eine *ab.*  
wie *pollutaria*,  
hat aber auch  
ein schwarzes  
Saumband, die  
V.-Flügel bin-  
denartig geteilt.

*Bapta bimaculata* F.

„

vereinzelt, Birkenschlag

*Ellopia fasciaria* L.

Juli

nicht häufig, Schwarzhölzl

*Ennomos autumnaria*

Wrnbg.

September

nicht häufig, Birkenschlag

„ *erosaria* Schiff.

Oktober

Birkenschlag

*Selenia tetralunaria*

Hufn.

Juli

vereinzelt, Birkenschlag

*Colotois pennaria* L.

Sept.-Okt.

nicht häufig, Birkenschlag

*Epione repandaria*

Hufn.

August

nicht häufig, Birkenschlag

*Cepphis advenaria* Hbn.

Juni

nicht häufig, Birkenschlag

*Macaria notata* L.

Juni

nicht häufig, Birkenschlag

„ *alternaria* Hbn.

„

nicht häufig, Birkenschlag

„ *signaria* Hbn.

„

nicht häufig, Birkenschlag

*Erannis marginaria* F.

April

nicht häufig, Birkenschlag

*ab. denigraria*

Uffeln

„ *defoliaria* Cl.

Oktober

nicht häufig, Birkenschlag

*Phigalia pedaria* F.

April

nicht häufig, Birkenschlag

*Biston strataria* Hufn.

„

nicht häufig, Birkenschlag

„ *betularia* L.

Mai

nicht häufig, Birkenschlag

*Boarmia cinctaria*

Schiff.

„

nicht häufig, Birkenschlag

„ *repandata* L.

Juli

nicht häufig, Birkenschlag

„ *roboraria* Schiff.

Juni

nicht häufig, Birkenschlag

*ab infuscata*

Stgr.

„

nicht häufig, Birkenschlag

„ *crepuscularia*

Hbn.

Juni-Juli

häufig

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| <i>Ematurga atomaria</i> L.  | Juni-Juli | häufig                     |
| <i>Bupalus piniaria</i> L.   | Mai       | häufig, Schwarzhölzl       |
| ab: 1 Zwitter.               |           |                            |
| <i>Diastictis artesiaria</i> |           |                            |
| Schiff.                      | Juli      | nicht häufig, Birkenschlag |
| <i>Chiasma clathrata</i> L.  | Juni      | häufig                     |

## Antheraea episcopalis Kaiser.

### Berichtigung.

Die von mir im 8. Jahrgange 1917 dieser Mitteilungen als *Antheraea episcopalis* beschriebene *Saturniide* gehört dem Genus *Salassa* an, worauf ich schon bald nach dem Erscheinen meiner Mitteilung von Niepelt aufmerksam gemacht wurde. Erst neuerdings, nachdem der internationale Verkehr wieder auflebt, wurde mir durch Jordan bekannt gegeben, daß die *Salassa episcopalis* identisch sei mit der von ihm bereits im Jahre 1910 benannten *Salassa mesosa*. Eine ähnliche Art ist die gleichfalls von ihm benannte *S. iris*.

Infolgedessen erkenne ich gern an, daß das Recht der Priorität Jordan gebührt. Es ist demnach die beschriebene Art als *Salassa mesosa* Jordan (1910) zu bezeichnen.

Gleichzeitig spreche ich Herrn K. Jordan meinen besten Dank für die Aufklärung aus.

Dr. Otto Kaiser.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [010](#)

Autor(en)/Author(s): Best Martin

Artikel/Article: [Spannerartige Nachtfalter aus dem Schleißheimer-Dachauer Moos. 27-30](#)