Ematurga atomaria L. Bupalus piniaria L.	Juni-Juli Mai	häufig häufig, Schwarzhölzl
ab: 1 Zwitter. Diastictis artesiaria		
	Iuli	nicht häufig, Birkenschlag
Schiff.	9	9,
Chiasma clathrata L.	Juni	häufig

inchner Ent. Ges., Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentro

Antheraea episcopalis Kaiser.

Berichtigung.

Die von mir im 8. Jahrgange 1917 dieser Mitteilungen als Antheraea episcopalis beschriebene Saturniide gehört dem Genus Salassa an, worauf ich schon bald nach dem Erscheinen meiner Mitteilung von Niepelt aufmerksam gemacht wurde. Erst neuerdings, nachdem der internationale Verkehr wieder auflebt, wurde mir durch Jordan bekannt gegeben, daß die Salassa episcopalis identisch sei mit der von ihm bereits im Jahre 1910 benannten Salassa mesosa. Eine ähnliche Art ist die gleichfalls von ihm benannte S. iris.

Infolgedessen erkenne ich gern an, daß das Recht der Priorität Jordan gebührt. Es ist demnach die beschriebene Art als Salassa mesosa Jordan (1910) zu bezeichnen.

Gleichzeitig spreche ich Herrn K. Jordan meinen besten Dank für die Aufklärung aus.

Dr. Otto Kaiser.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Münchner Entomologischen

Gesellschaft

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: 010

Autor(en)/Author(s): Kaiser Otto

Artikel/Article: Antheraea episcopalis Kaiser - Berichtigung. 30