

**Die Lepidopteren  
der Deutschen Gran-Chaco-Expedition 1925/26  
mit Berücksichtigung  
der Sammelergebnisse von Professor Hosseus  
in der Sierra de Córdoba.**

---

IV.

SYNTOMIDAE, ARCTIIDAE und DIOPTIDAE.

Von Dr. H. Zerny, Wien.

SYNTOMIDAE.

1. **Phoenicoprocta teda** Wlk.

Argentinien: Tapikioló XII.—I. 1 ♀ (Lindner).

Bekannte Verbreitung: Ost- und Süd-Brasilien (Espírito Santo bis Santa Catharina), Paraguay, Misiones.

2. **Cosmosoma auge** L.

Bolivia: Chimea bei Villamontes, 2. V. 1 ♀;

Argentinien: S. José, X. 1 ♀ (Lindner); Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 1 ♀ (Hosseus).

Bekannte Verbreitung: Antillen, Mexico bis Peru, Bolivia, Argentinien und Uruguay.

3. **Eurota hermione** Burm.

Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 3 ♂ 8 ♀ (Hosseus).

Nach Jörgensen (Zeitschr. wiss. Insektenbiol. 9 -1913- p. 34) soll *paraguayensis* Schrottky, die als Varietät von *hermione* beschrieben wurde, von dieser spezifisch verschieden sein. Nach dem mir vorliegenden ziemlich reichen Material beider Formen, muß ich jedoch feststellen, daß die von Jörgensen angegebenen Unterscheidungsmerkmale keineswegs durchgreifend sind; so fehlen z. B. bei einem Teil der Stücke vom oben angegebenen Fundort die für typische *hermione* von Jörgensen als charakteristisch angegebenen roten Seitenflecke der Abdominalsegmente 2 bis 5, ferner haben fast alle

Stücke der genannten Serie gelbe Seitenflecke des Abdomens, während diese bei *hermione* nach Jörgensen weiß und bindenförmig verlängert sein sollen, etc.<sup>1)</sup>

Bekannte Verbreitung: Argentinien, Uruguay; var. *paraguayensis*: Misiones, Paraguay, Südbrasilien (Paraná).

4. **Eurota selva** H. S.

Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 2♂ (Hosseus).

Bekannte Verbreitung: Paraguay, Uruguay, Argentinien.

5. **Eurota hilaris** Zerny nom. nov. („*Herricki*“ Hmps. Cat. Lep. Phal. I. p. 287 -1898-, *Herrickii* Orfila Rev. Soc. Ent. Argent. 3 p. 190, t. 1, f. 1 -1931-, nec *Herrichii* Butl. Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12 -1876- p. 366).

Argentinien: Tapiokolé, I., 1 ♂ (Lindner).

Butler hat (l. c.) der *Glaucopis sericaria* H. S. Außereurop. Schmett. f. 229 -1854- den neuen Namen **Herrichii** gegeben mit der Begründung, daß diese von *sericaria* Perty verschieden sei. Wie aber ein Vergleich von Herrich-Schäffers Abbildung mit Perty's Abbild. und Beschreibung lehrt, kann von einer Verschiedenheit keine Rede sein; *Herrichii* Btl. ist somit ein Synonym von *sericaria* Perty. Die von Hampson (Cat. Lep. Phal. I. p. 287) als „*Herricki*“ (Verballhornung von *Herrichii*) beschriebene, von *sericaria* Perty, H. S. u. a. durch das Fehlen eines gelblich-weißen Kostalstriches der Vorderflügel verschiedene Art muß daher einen neuen Namen bekommen, wofür ich **hilaris** vorschlage.

Bekannte Verbreitung: Süd-Brasilien (Rio Grande do Sul), Paraguay, Argentinien.

6. **Eurota nigricincta** Hmps. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 19 p. 226 -1907-; Cat. Lep. Phal. Suppl. I. p. 193, t. 10, f. 16 -1914- (syn.: *Spegazzinii* Jörgensen Zeitschr. wiss. Insektenbiol. 9, p. 36, f. 3, 4 -1913-).

Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 3♂ (Hosseus).

Wie aus einem Vergleich der Beschreibungen u. Abbildungen von *E. nigricincta* Hmps. und *E. Spegazzinii* Jörgensen hervorgeht, sind beide zweifellos identisch.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Nach Orfila (Rev. Soc. Ent. Argent. 3 p. 197 -1931-) ist die von Jörgensen (l. c.) für *paraguayensis* Schrottky gehaltene Form nicht diese, sondern eine von *hermione* verschiedene Art, die er (l. c., t. 2, f. 1) **Jörgenseni** benennt.

<sup>2)</sup> Diese Synonymie wurde schon von Orfila (Rev. Soc. Ent. Argent. 3 p. 200 -1931-) veröffentlicht.

Nur aus Argentinien bekannt.

7. **Eurota histrio** Guér.

Bolivia: S. Fermín, Chiquitos, X. 1 ♂, Pozo del Tigre, 1. IX.  
1 ♀ (Lindner).

Bekannte Verbreitung: Bolivia, Matto Grosso, São Paulo, Paraguay, Misiones.

8. **Eurota igniventris** Burm.

Bolivia: Fortín Esteros, III. 1 ♂; Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 4 ♂ 4 ♀ (Hosseus).

War bisher aus Argentinien und Paraguay bekannt.

9. **Eurota patagiata** Burm.

Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 4 ♂ 3 ♀ (Hosseus).

Nur aus Argentinien bekannt.

10. **Eurota marcia Zerny nov. nom.** (*strigiventris* Hmps. Cat. Lep. Phal. Suppl. I, p. 291, nec Guér.).

Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 14 ♂ 10 ♀ (Hosseus).

*E. strigiventris* Guér. und *E. helena* H. S., beide aus Südbrasilien beschrieben, sind, wie ein Vergleich der Abbildungen und die Beschreibung ersterer Art (von letzterer existiert keine Beschreibung) lehrt, zweifellos identisch. Die von Hampson (Cat. Lep. Phal. I, p. 291) als *helena* beschriebene Art mit durchgehenden gelben Hinterleibsbinden hat daher *strigiventris* Guér. zu heißen, die von Hampson (l. c.) und Orfila (Rev. Soc. Ent. Argent. 3 p. 198, t 2, f. 3—6 -1931-) als *strigiventris* beschriebene Art mit unterbrochenen Hinterleibsbinden muß daher einen neuen Namen bekommen, als welchen ich **marcia** vorschlage.

Bekannte Verbreitung: Paraguay, Argentinien.

11. **Dycladia lucetius** Stoll.

Bolivia: Santa Cruz de la Sierra, VII.—VIII. 1 ♂ 1 ♀ (Lindner); Nord-Argentinien: San José, X., 1 ♀ (Lindner).

Bekannte Verbreitung: Columbien, Bolivien, Guyana, Brasilien von Pará bis Santa Catharina, Paraguay.

12. **Macrocneme leucostigma** Perty (*lades* auct. nec. Cr.).

Nord-Argentinien: San José, X. 2 ♂ 1 ♀ (Lindner).

Bekannte Verbreitung: Mexico bis Peru und Argentinien.

13. **Napata (Philoros) laura** Hmps.  
Bolivia: Oberer Pilcamayo, V. 1 ♂ (Lindner).  
Unterscheidet sich von der sehr nahestehenden *N. lena* Schaus. nur durch den ganz schmal weißen Apex der Vorderflügel (siehe auch Zerny, Iris 45 -1931- p. 19).  
Nur aus Bolivia bekannt.
14. **Eupyra consors** Schaus.  
Bolivia: Cordillere von Buena Vista, 10. VII. 1 ♀.  
Bekannte Verbreitung: Peru, Bolivia.
15. **Cyanopepla Girardi** Dogn. Ann. Soc. Ent. Belg. 46 p. 229 (1902); Hmps. Cat. Lep. Phal. Suppl. I. p. 275, t. 15, f. 15 (1914).  
Argentinien: Cerro Uritoico, 1850 m, Prov. Córdoba, 2 ♀ auf *Sisyrinchium setaceum* (Hosseus).  
War bisher nur von Tucuman bekannt. Die Fundortangabe „Colombia“ bei Hampson (l. c.) ist irrtümlich.
16. **Aclytia heber** Cr.  
Bolivia: Villa Montes, 4.—7. V. 2 ♂ 1 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Cuba, Mexico bis Argentinien.
17. **Eucereon quadricolor** Wlk.  
Nord-Argentinien: San José, X. 1 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Ost- und Süd-Brasilien von Rio de Janeiro bis Rio Grande do Sul.
18. **Ctenucha Reimoseri** Zerny. Iris 26, p. 124 (1912); Hampson Cat. Lep. Phal. Suppl. I, p. 374, t. 21, f. 20 (1914); Gaede Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, p. 135.  
Bolivia: Villa Montes, V. 1 ♂ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Paraguay (San Luis, Villarrica, San Bernardino).
19. **Philoros affinis** Rothsch. Nov. Zool. 19, p. 185 (1912); Hampson Cat. Lep. Phal. Suppl. I, p. 379, t. 22, f. 2 (1914).  
Bolivia: Lapango (Pilcomayo), IX. 1 ♂ (Lindner);  
Paraguay: Trinidad bei Asuncion, VIII. 1 ♂ 1 ♀;  
Argentinien: Tapikiolé, XII. bis I. 1 ♀ (Lindner),  
Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 1 ♂ (Hosseus).  
Bekannte Verbreitung: Peru, Bolivia, Ost- und Süd-Brasilien von Rio de Janeiro bis Rio Grande do Sul, Paraguay, Uruguay, Argentinien.



## ARCTIIDAE.

### Lithosiinae.

1. **Ardonea morio** Wlk.  
Argentinien: Aguarai, XI. 1 ♂ 2 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Mexico bis Columbien und Venezuela.
2. **Cisthene argentinensis** Rothsch. Nov. Zool. 19 p. 230 (1912);  
Hmps. Cat. Lep. Phal. Suppl. I. p. 548, t. 29, f. 20 (1914).  
Argentinien: Sierra Ventana, 17. XI. 2 ♂ 3 ♀, Capilla del Monte, Prov. Córdoba 6 ♂ (Hosseus).  
Bekannte Verbreitung: Argentinien.
3. **Illice calochroma** Snell.  
Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 1 ♀ (Hosseus); Misiones, Tacaagl , XI. 1 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Argentinien.
4. **Paraprepia ruficollis** Schaus.  
Argentinien: Misiones, Tacaagl , XI. 1 ♂ 1 ♀ (Lindner), Las Garzas, n rdl. Chaco v. Santa F , 1 ♀ (Br der Wagner, Mus. Wien).  
Bekannte Verbreitung: S dost-Brasilien (S o Paulo, Paran ).

### Arctiinae.

5. **Thysanoprymna acuminata** Wlk.  
Argentinien (Misiones): Tacaagl , XI. 1 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: S dost-Brasilien (S o Paulo bis Rio Grande do Sul).
6. **Halisidota lineata** Schaus.  
Bolivia: Buena Vista, VIII. 1 ♂ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: S dost-Brasilien (S o Paulo, Paran ), Paraguay.
7. **Halisidota annulosa** Wlk.  
Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 1 ♀ (Hosseus).  
Bekannte Verbreitung: Mexico bis Peru, Bolivia und Ost-Brasilien.
8. **Agoraea rectilinea** Burm.  
Argentinien: Capilla del Monte, Prov. Córdoba, 1 ♂ 1 ♀ (Hosseus).  
Bekannte Verbreitung: S dost-Brasilien (S o Paulo, Paran ), Paraguay, Argentinien.

9. **Spilosoma alcumena** Berg.  
Bolivia: San José de Chiquitos, X. 1 ♂ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Argentinien, Matto Grosso.
10. **Ecpantheria mus** Obthr.  
Argentinien: Tapikiolé, XII.—I, 1 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Bolivia, Südost-Brasilien (Rio de Janeiro bis Paraná), Paraguay.
11. **Ecpantheria oblecta** Dogn. Ann. Soc. Ent. Belg. 51, p. 228 (1907); Hmps. Cat. Lep. Phal. Suppl. II, p. 449, t. 63, f. 4 (1920) [♂]; Forbes Ann. Ent. Soc. Amer. 22, p. 327, 330 (1929); *flavopunctata* Schaus Insec. Insc. Menstr. 9, p. 171 (1921) [♀].  
Nord-Argentinien: San José, X. 1 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Argentinien, Paraguay.
12. **Mazaeras conferta** Wlk.  
Rio Paraguay, 13. XII. 1 ♂ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Bolivia, Brasilien von Espírito Santo bis Matto-Grosso und Santa Catharina.
13. **Antarctia multifarior** Burm.  
Argentinien: San José, X. 1 ♀; Misiones, Tacaaglè XI. 1 ♀; Paraguay: Trinidad e. l. IX. 1 ♀, Rio Paraguay, 13. XI. 2 ♀ (Lindner).  
Die Stücke variieren in der Färbung von Rötlichbraun bis Graubraun und in der Deutlichkeit der subterminalen Querbinde der Fl. oberseite, dürften aber doch alle derselben Art angehören.  
Bekannte Verbreitung: Argentinien.
14. **Antarctia paula** Schaus.  
Rio Paraguay, 13. XI. 1 ♀, Santos 23. XII. 1 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Südost-Brasilien (Paraná).
15. **Utetheisa ornatix** L.  
Nord-Argentinien: San José, X. 2 ♂ 2 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Tropisches Amerika.

## DIOPTIDAE.

1. **Josia megaera** Hb.  
Bolivia: San José, Chiquitos, 10. IX. 2 ♀ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Mexico bis Bolivia u. Ost-Brasilien (Bahia).
2. **Scea angustimargo** Warr.  
Bolivia: Villa Montes, V. 2 ♂ (Lindner).  
Bekannte Verbreitung: Peru, Bolivia, Paraguay.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1937

Band/Volume: [027](#)

Autor(en)/Author(s): Zerny Hans

Artikel/Article: [Die Lepidopteren der Deutschen Gran-Chaco-Expedition 1925/26. 11-16](#)