

Rutelinen.

Von Dr. F. Ohaus, Mainz.

1. **Pelidnota chlorana** Er. 1 ♀. Bolivia: Chiquitos, Paquio. X. 26 (Lindner S.).
Die Art ist am Ostabhang der Cordilleren von Columbien bis Südbolivien häufig.
2. **P. fulva** Blanch. 1 ♂, 1 ♀ Nord-Argentinien: S. José, X. 25. 1 ♂ Bolivia: Villa Montes, V. 26 (Lindner S.).
Die Art ist im ganzen Chaco-Gebiet, im Sertaõ von Matogrosso und Goyaz bis in den Kamp von S. Paulo und Parana sehr häufig.
3. **P. Sancti Jacobi** Ohs. 2 ♂♂ Argentina: Tapikiolé, XII. 25 bis I. 26. (Lindner S.).
Beschrieben von Santiago del Estero und im ganzen Salzgebiet von Nord-Argentinien nicht selten.
4. **Rutela lineola** L. In Südamerika von Columbien bis zum mittleren Argentinien, in Guayana und Brasilien häufig.
5. **Anomala testaceipennis** Blanch. 2 ♂♂ N. Argentina: S. José, X. 25 (Lindner S.).
Wie *P. chlorana* Er. am Ostabhang der Cordilleren von Columbien bis Nord-Argentinien und Paraguay eine der häufigsten Arten.
6. **Strigoderma sulcipennis** Burm. v. **sumtuosa** Burm. 1 ♀ Bolivia: Villa Montes, V. 26 (Lindner S.).
Von Mexiko bis Bolivien verbreitet und sehr variabel in der Färbung und Sculptur des Halsschildes.
7. **Geniates impressicollis** Ohs. 1 ♀ Mis. Tacaaglê XI. 25. Beschrieben aus Paraguay und in den angrenzenden Provinzen von Argentinien und Brasilien nicht selten.
8. **Leucothyreus semipruinosus** Ohs. 1 ♂ Paraguay: Trinidad bei Asuncion, VIII. 25.
In Paraguay, im Kampgebiet und Sertaõ von Brasilien (S. Paulo, Goyaz und Matogrosso) nicht selten.
9. **L. dorsalis** Blanch. 1 ♂ Argentina: Tapikiolé, XII. 25 bis I. 26. (Lindner S.).
Verbreitung und Häufigkeit wie bei der vorhergehenden Art.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1941

Band/Volume: [031](#)

Autor(en)/Author(s): Ohaus Friedrich

Artikel/Article: [Rutelinen. 1063](#)