

Interessante und neue Scolytiden und Platypodiden aus der austral. Region.

Von Dr. K. E. Schedl, Hann.-Münden.

(Mitt. Münchn. Entom. Gesellsch. XXXII. 1942)

Berichtigung.

Seite 163 Zeile 12 von oben	Palmseeds statt Palmseeds.
" 163 " 13 von unten	<i>decipiens</i> statt <i>decipienus</i> .
" 164 " 21 von oben	Kieta statt Kiete.
" 165 " 17 von oben	Kerawat statt Kerawatt.
" 165 " 21 von oben	Kieta statt Kida.
" 167 " 11 von unten	38:27 statt 32:27.
" 167 " 6 von unten	41:38 statt 31:38.
" 174 " 18 von oben	statt „besetzt“ lüge ein: „gewölbt, zunächst sehr locker mit kleinen Schuppenhöckern besetzt“.
" 174 " 17 von unten	abgewölbt statt angewölbt.
" 179 " 13 von unten	unmerklich statt merklich
" 180 " 11 von unten	Zwischenraumpunkte statt Zwischenpunkte.
" 181 " 1 von unten	„zur Naht breit“ statt „zur Nath“
" 183 " 8 von unten	Absturzrand statt Absturz
" 190 " 2 von oben	<i>procerissimus</i> statt <i>procerrissimus</i> .
" 193 " 1 von oben	Bewehrung statt Bewerbung.
" 194 " 16 von unten	4,6 statt 4,8.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1943

Band/Volume: [033](#)

Autor(en)/Author(s): Schedl Karl Eduard

Artikel/Article: [Interessante und neue Scolytiden und Platypodiden aus der australischen Region. 397](#)